


Verzeichniß
der Gewächse
nebst Plan

*des Groß. botanischen Gartens
zu*

CARLSRUHE.



2 + 4

INOMITE GARDINIER

oder

Wiederherstellung

der

Botanischen Gärten

in

den botanischen Gärten

werden

mit dem

GESCHICHTLICHEN

DER

BOTANISCHEN UND KUSTGÄRTEN

von 1530 — 1825

und einem

Verzeichnisse der Pflanzen

in den Gärten

in

herausgegeben

Gartenhistorische

Verzeichnisse

von den Gärten

HORTUS CARLSRUHANUS

oder:

Verzeichniss

sämmtlicher

Gewächse

welche

in dem großherzoglichen botanischen Garten zu
Carlsruhe cultivirt werden

nebst dem

GESCHICHTLICHEN

DER

BOTANISCHEN UND LUSTGÄRTEN

von 1530 — 1825.

und einem

Situationsplan im Grund- und Aufriss und
im Durchschnitt von sämmtlichen
Gewächshäusern.

Herausgegeben

von

Garteninspector Martweg.

Carlsruhe,

gedruckt bei P. MACHLOT,

Nahe und fern entsprießt auf Höhen und unten im Thale,
 Dort an wärmendem Licht, und hier im kühlenden
 Schatten,

Mutter Natur die blühende Schaar von fröhlichen Kindern.

Aber sie sammelt und pflegt in wohlverwahrenen Räumen
 Emsig des Gärtners Hand, und reiht sie kunstreich nach
 Classen.

Auch was die Sonne des Süds, was unter des Nordens
 Eisrinde

Da so üppig entblüht, und dort so kümmerlich weilet,

Jedem ward, wie sich gebührt, hier seine gedeihliche
 Stelle.

Möge des Forschers Aug gern unter den Pfleglingen weilen,

Möge der Freund der Natur unserer Blüthen sich freun!

V o r r e d e.

Der bedeutende Zuwachs von Pflanzen, welche der hiesige Garten seit 12 Jahren erhalten hat, machte das Verzeichniß vom Jahr 1811 ungenügend, und die Fertigung eines Neuen, wozu ich den speciellen Auftrag von meiner hohen Behörde, dem Hofverwaltungs-Rath, erhielt, nöthig.

Ueber die Einrichtung dieses Verzeichnisses sei es mir erlaubt einige Worte zu sagen.

Weil sich Badens erhabenste Fürsten seit den frühesten Zeiten für das Naturhistorische, und besonders für die Gärten interessirt haben; so glaube ich es sei hier der Ort, einiges Geschichtliche über die badischen botanischen und Lust-

gärten, so weit es mir möglich war Notizen darüber zu bekommen, voran gehen zu lassen.

Um sich aber einen kurzen Begriff von der Beschaffenheit und Gröfse des jetzigen botanischen Gartens machen zu können, fand ich für nöthig den Plan davon nebst der Beschreibung des Gartens und der schönen zweckmäfsig eingerichteten Gewächshäuser diesem Verzeichnifs beizufügen.

Ueber die Cultur der Pflanzen, so wie über die Mischungen der Erde-Arten habe ich nur so viel erwähnt, als es der Zweck und der Raum dieses Werkchens gestattet.

Vielleicht erlauben es meine Geschäfte über diesen Gegenstand, der bis jetzt noch in keinem neuern Werk ausführlich behandelt ist, und doch einem tiefgefühlten Bedürfnifs entspricht, weil manche seltene Pflanze deswegen als Opfer unterliegen muß, meine auf vieljährige Erfahrungen gegründete Ansicht an einem andern Orte auszusprechen.

Eben so zweckmäfsig fand ich es, um Verglei-

che mit andern Orten und etwaige Versuche wegen Acclimatisirung mit Pflanzen anstellen zu können, eine meteorologische Tabelle beizufügen, worin der Länge und Breite Grad, die Höhe über dem Meer, die größte Hitze und Kälte etc. erwähnt wird.

Um nicht durch die Synonymen und den öftern Namenswechsel verleitet zu werden, Pflanzen sich kommen zu lassen, die man schon im Ueberflufs besitzt, habe ich zu den allgemein angenommenen systematischen Namen in *Cursivschrift* deren Synonyme nebst ihren Autoren beigesetzt.

Obgleich die deutschen Namen bei dem Botaniker durchaus keinen Werth haben, so fand ich es doch dem häufig geäußerten Wunsch vieler Pflanzen-Liebhaber angemessen, solche nach Willdenows species plantarum beizusetzen. Die neuern aber, und solche die ich nirgends verdeutscht auffinden konnte, suchte ich so viel wie möglich durch Herleitung dem botanischen Pflanzen-Namen nahe zu bringen.

Möchte ich mit dieser Arbeit dem Bedürfnisse
und Wunsch der Liebhaber und Freunde der Pflan-
zenkunde entsprochen haben!

Carlsruhe im März 1825.

K u r z e G e s c h i c h t e
der botanischen und Lustgärten der Durchlauch-
tigsten Fürsten des Hauses Baden bis auf
unsere Zeiten.

Von den frühesten Zeiten haben sich Badens erhabenste Fürsten für die Naturwissenschaft interessirt, Sie hielten sich überzeugt, daß die Benutzung des vaterländischen Bodens, und seiner mannigfaltigen natürlichen Erzeugnisse auf Naturwissenschaft gegründet sei.

Sie legten Lust- und botanische Gärten an, um darin zugleich Versuche im Kleinen anzustellen, wovon einstens für den Forstmann, den Oeconomen, den Techniker etc. und somit für das ganze Land Nutzen zu erwarten war.

Ich konnte zwar trotz allem Nachsuchen nicht finden, wo und von wem unter Badens Fürsten, der erste Lust- und botanische Garten angelegt worden sei.

Der weiße Markgraf Ernst residirte bekanntlich anfangs in Sulzburg, wo er ein Schloß erbaute und einen Garten anlegte, die Zeit fällt in die 1530er Jahre. *)

*) Siehe geheimen Hofrath Gmelins Einfluß über die Naturwissenschaft auf das gesammte Staatswohl pag. 362.

Markgraf Carl II. der Nachfolger Ernsts, erbaute das schöne Schloß Carlsburg zu Durlach, und legte einen Lust- und botanischen Garten im Jahr 1565 daselbst an. Auf ihn folgte Markgraf Ernst Friedrich, der den Garten zu Durlach verschönerte und bereicherte. Vom Jahr 1595 bis 1622 vermehrte Markgraf Georg Friedrich die botanischen Gärten zu Sulzburg und Durlach, welche von dem damals lebenden größten Pflanzenkenner Dr. und Professor Caspar Bauhin von Basel, dem Leib- arzte Georg Friedrichs, sehr oft besucht und bewundert wurden. *)

*) Caspar Bauhin, in der Zueignungsschrift des von ihm herausgegebenen Kräuterbuchs von Dr. Jacob Theodor genannt Tabernaemontanus.

(Nach der Sitte des Jahrhunderts änderte er seinen Namen nach seinem Geburtsort Berg-zabern im Zweybrükschen) jetzt durch Hieronymus Bauhin, Dr. und Professor zu Basel herausgegeben, gedruckt zu Basel durch Jacob Werenfels in Verlegung Ioh. Königs 1664 in Folio.

In der Caspar Bauhinischen Dedication, an die Durchlauchtigste Fürstin Iuliana Ursula Marggrävin zu Baden etc. der Gemahlin des Marggraven Georgs Friedrichs, heisst es: dieweil mir wohl bewußt ist, daß Ihr Gemahl zu botanischen- und Lustgärten eine sondere Lust- und Zuneigung tragen, wie dann beide Gärten zu Durlach und Sulzburg das genugsam erwiesen, wie auch die fürstliche Apotheke, aus welcher man nach J. F. G. gnädigen Befehl, vielen Armen, wie ich dann oftmalen selber zu Sulzburg gesehen, zu Hülfe kombt, bin ich verursacht worden, gegenwärtiges neu und vollkommenes Kräuterbuch, welches hiebevorn von dem hochgelehrten Herrn Iacobo Theodoro Tabernaemontano mit höchstem Fleiß und Mühe, aus langwieriger Erfahrung auch den allervortreflichsten neuen und alten Scribenten beschrieben, und darin vast unzählige vortrefliche, hochbewährte Experimenten etc. Datum Basel den 1. Hornung 1613

Markgraf Friedrich V. begünstigte, trotz dem 30jährigen Kriege, in Seiner Regierung von 1622 bis in die 1650er Jahre die botanischen- und Lustgärten zu Durlach. Markgraf Friedrich VI. war bekanntlich Kenner, und Beschützer alles Schönen, liebte Natur- und Kunstwerke, die er so viel möglich selbst sammelte, und vermehrte den botanischen- und Lustgarten zu Durlach mit vielen sowohl inn- als ausländischen Gewächsen, die Hieronymus Bauhin, Dr. und Professor zu Basel bewunderte. *)

Markgraf Friedrich Magnus, ob er gleich in einer für seine Lande äusserst unglücklichen und traurigen Zeit lebte, blieb dennoch standhaft, schützte und schätzte Wissenschaften und Künste, trotz den alles verzehrenden Flammen des Kriegs, wodurch alle seine Schlösser zu Grunde giengen, erschienen die Lust- und botanischen Gärten zu Durlach in einer erneuerten Gestalt. **)

*) Siehe am andern Ort die Dedication desselben von Dr. Joh. Tabernaemontanus Kräuterbuch an Sr. Hochfürstliche Durchlaucht den Markgrafen Friedrich zu Baden vom 18. März 1664, wo er sagt: Ich habe die schönen und köstlichen Lustgärten, welche zu Durlach in Eurer Hochfürstlichen Durchlaucht Residenz sind, mit höchster Verwunderung gesehen, und daraus schliessen können, dass Ew. H. D. nicht einen geringen Lust zu allerhand einheimischen und fremden Gewächsen tragen, und hierinnen, gleichwie in übrigen Hochfürstlichen Tugenden, dero-selben großmüthigsten Voreltern in nichts nachlassen; u. s. w.

**) Bekanntlich wurde am 6. August 1689 die Stadt Durlach nebst vielen andern Städten und Dörfern im Land, so wie in der Pfalz von den Franzosen unter General Melac mit Feuer und Schwert zerstört.

Dafs die Gärten in einem bedeutenden Flor gestanden haben, ist ausser Zweifel. *) Die alten ehrwürdigen Roth und Weifstannen, die Kastanien-Alle und eine vorzüglich schöne Esche *Fraxinus excelsior* Lin. deuten alle auf ein ziemlich hohes Alter. An der eben erwähnten schönen schlanken Esche, welche gegen 140 Fufs hoch und 19 Fufs im Umkreise misst, steht eine auf weifsem Blech mit römischen Buchstaben geschriebene Inschrift

Mein dritt Jahrhundert sieht mich grün,
Stets sah ich Baden wieder blühn.

1 8 0 2.

Auch die Kastanien-Allee *Aesculus Hippocastanum* Lin. mufs sehr alt sein, und gehört unstreitig zu den Aeltesten in Deutschland und Frankreich. Die noch vorhandenen grössten Bäume sind zum Theil hohl, ge-

*) Siehe Leben, Regierung, Großthaten und Absterben, der Durchleuchtigsten Fürsten und Marggrafen von Baden pag. 80 dort wird von den Gärten in Durlach erwähnt: Sie seyen lustig und wohl geziert.

Eben daselbst pag. 64 heisst es: das Schloß und die Stadt Baden haben am 24. August 1689 dasselbe Schicksal, wie Durlach gehabt.

Am 18. zuvor, während ein Courier an den König von Frankreich abgesandt war, um Schonung einzuholen, sandte der Commandant von Fort-Louis 15 Wagen Wein, und alle schöne Pomeranzen-Stöcke und Pflanzen aus dem Schloß abzuholen: der Wein zwar wurde flugs ausgefolget, die Pomeranzen-Stöck und Pflanzen aber belangend, schickte Ibro Durchläucht, die Frau Marggräfin P. Hypolitum an den Officier dieser Convoy, sich über diese böse Treu und Glauben, so man Ihr hielte, zu beschwehren, mit Vermelden, man thäte groß Unrecht, Ihro Durchläucht fünff lebendige Salvagardien zuzugeben, deren jede des Tages eine Dublone kostete, und eine Besatzung einlegte, die nicht mehr thäte, als dafs sie ein

gen 120 Fufs hoch, und mehrere messen 15 Fufs rheinisch im Umkreis. Ich finde sie weit stärker, als jene im K. K. Augarten bei Wien. Diese sind, wie ich vermuthe, von der zweiten Generation, ob sie gleich nach einer bis jetzt noch geltenden Tradition für die Ersten angenommen werden, die von Constantinopel aus nach Wien gekommen seien. *)

Seit dem Jahr 1809 wird auf den Garten in Durlach nichts mehr verwendet.

Vom Carl Wilhelm dem grossen Pflanze- und sorgfältigen Beschützer botanischer und Lustgärten, wurde am 17. Juny im Jahr 1715 in Gegenwart des ganzen Hofstaates mit eigener Hand der Grundstein zu einem Lust- und Jagdschloß gelegt, und ihm der Namen Carlsruhe gegeben.

augenscheinlicher Zeug sey, aller Ueberlast, die sie erdulden müßte; Ihro Durchläucht könnten es nicht verschmerzen, Stadt und Schloß mit eignen Augen, vor Zurückkunft der Königlichen Antwort plündern zu sehen, und dafs, wenn ja das Zorn-Feuer Ihro Majestät Stadt und Schloß Baden verzehren würde, hielten sie nicht dafür, dafs solches auch die Fürstlichen Schloß und Lustgärten ergreifen sollte, es wäre dann die Sach zu hoch getrieben, dafs man sich mit der Ausmärglung des ganzen Landes nicht begnügen, sondern auch alle unschuldige Lustbarkeiten ihres Hofes verwüsten wollte; worauf dieser Officier die Vollführung seines Regiments auf eine bequemere Zeit aussetzte.

*) Die ersten Früchte dieses Baumes kamen ums Jahr 1550 durch Clusius aus dem nördlichen Asien nach Constantinopel, von da nach Wien 1588, und nach Paris 1615.

Im Königl. Französ. Cabinette befindet sich eine Platte von einem im Jahr 1656 gepflanzten, und im Jahr 1767 abgestorbenen Kastanien-Baum, wovon der Durchmesser $4 \frac{1}{2}$ Spannen, oder 36 Zoll hält. Siehe Duroi Harbke-sche wilde Baumzucht. I. Bd. pag. 64.

Schon im Jahr 1717 wurde der Garten vor dem Schloß nach dem damaligen Französischen Geschmack durch den Gärtner Berceon angelegt, nämlich das Blumen-Parterre mit farbigem Sand, zerstoßenem Glas, Porzellan, Muscheln und dergleichen bunten Sachen bestreut, die Hauptwege aber mit Bux, Tax und Haynbuchen-Hecken in allerhand Formen bepflanzt. *)

Im Jahr 1722 wurde die Regierung hieher nach Carlsruhe verlegt. Seit 1530 bis jetzt blieben die Gärten der badischen Fürsten, trotz aller fürchterlicher älterer und neuerer Kriege, denen diese Länder so oft ausgesetzt waren, trotz dem Wechsel der Zeiten, gegen 300 Jahre lang im Flor, und erreichten unter der beglückenden Regierung Carl Friedrichs in einem Zeitraum von 65 Jahren einen seltenen Grad von Vollkommenheit.

Das vorige und der Anfang dieses Jahrhunderts hatte drei Hauptperioden für Badens botanische- und Lustgärten. Die erste fällt in die Lebzeiten des Markgrafen Carl Wilhelms, des Erbauers der Stadt Carlsruhe, der mit hoher Milde die botanischen- und Lustgärten dahier gründete. Die zweite beginnt im Jahr 1787, und endigt mit 1806. Die dritte beginnt im Jahr 1807.

Die erste Periode erhebt den botanischen Garten dahier zu den Vorzüglichsten. Markgraf Carl Wilhelm bemühte sich seinen botanischen und Blumengärten und seinen prachtvollen grossen und reichen Orangerien die möglichste Vollkommenheit zu verschaffen.

Er sendete den damaligen Hofgärtner Christian Thran mit dem Dr. und Professor Ioh. Ernst Hebenstreit von Leipzig, der durch den König von Polen und Kurfürsten von Sachsen Friedrich August unterstützt

*) Le Notre, welcher zur Zeit Ludwigs des 14. lebte war der Urheber dieses Ungeschmacks.

wurde, im Jahr 1731 nach Afrika, um alles Neue, Schöne und Wichtige, was aus diesem heißen Lande an Pflanzen zu haben war, seinen Gärten dahier einzuverleiben. Thran kam glücklich mit botanischen Schätzen 1733 nach Karlsruhe zurück.

Bald darauf kam das erste Verzeichniss der sämtlichen in den Fürstlichen botanischen Gärten zu Karlsruhe vorhandenen Pflanzen zum Druck. *)

In diesem Verzeichniss, worinn die Pflanzen nach Caspar Bauhin und Tournefort genannt sind, sieht man, daß damals in den Gärten dahier mit Innbegriff der Abarten die Anzahl derselben bis auf 2000 Species ange-

*) Index plantarum Horti Carollsruhani tripartitus, cujus prima pars numerat plantas exoticas perennes, quae ad hibernacula transferenda sunt, altera perennes, frigora sive hiemem perferentes, et tertia, quae quotannis serendae sunt et rursus pereunt. Bei diesem Verzeichniss, das nun unter die Seltenheiten gehört, steht weder Jahrszahl noch Druckort. Es wurde zuverlässig im Jahr 1733 gedruckt, und von Dr. Ioh. Friedrich Eichrodt und Christian Thran in Ordnung gebracht. Siehe Halleri Bibliothecam Botanicam Tom. II. pag. 266.

Im Jahr 1737 schreibt der Ritter von Linné in der Dedication seines von ihm verfaßten Horti Cliffortiani pag. 3.

Magni nominis et immortalis nobis memoriae sunt omnes, qui maximos sumtus, summam curam, assiduumque laborem impenderunt, ut plantas undique colligerent, collectas colerent, cultas describerent, descriptas per orbem botanicum distribuerent, adeoque publico unice inservirent. Proin et Princeps Baden Durlacensis illustrissimus Carolus quantum ex ipsis plantis oblectamentum ceperit, quanti Botanice fecerit delebitur nunquam dum exstet Horti Principalis Carlsruhae culti Catalogus, Eichrodtii manu conscriptus!

wachsen war. Nebst der Botanik suchte Markgraf Carl Wilhelm dem dahier damals in seiner Art einzigen Blumenflor, womit alle Quartiere des vordern Schloßgartens prangten, den zahllosen kostbaren und prachtvollen Tulpen, Narcissen, Jonquillen, Tuberosen, Anemonen, Ranunkeln, Grasblumen, Aurikeln, Primeln, Rosen, Levcojen etc. etc. die größte Vollkommenheit zu verschaffen. Er ließ die ausgezeichnetsten, seltensten und schönsten Pflanzen und Blumen nach der Natur abzeichnen und coloriren. So entstand die in ihrer Art einzige Sammlung, welche aus vielen starken Folianten besteht, in welchen, über sechstausend verschiedene Pflanzen nach der Natur, und zwar größtentheils trefflich u. musterhaft abgezeichnet sind. *)

Markgraf Carl Wilhelm wollte die schönsten Pflanzen in Kupfer stechen und coloriren lassen. Schon waren die Künstler dazu bestellt, und mehrere der schönsten Tulpen gestochen, als Er der Welt entrissen, und an diesem Unternehmen gehemmt wurde.

Nach dem Ableben des Markgrafen Carl Wilhelms wurde vom Jahr 1738 bis 1746 unter der weisen Landes-Administration der Markgräfin Magdalena Wilhelmine (Grosmutter des Großherzogs Carl Friederich) und des

*) Siehe *plantae selectae quarum imagines ad exemplaria naturalia manu artificiosa doctaque pinxit Georgius Dionysius Ehret, germanus, collegit et publico usui dicavit Dr. Christophorus Jacobus Trew. in aes incidit, et vivis coloribus repraesentavit Johann Jacob Haid. Decuria I. An. 1750. pag. 1.*

Obiger G. D. Ehret lernte bei dem damaligen Garteninspector August Wilhelm Sievert dahier die Gärtnerei, von welchen beiden ein großer Theil von Pflanzen und Tulpen nach der Natur gezeichnet sind.

Markgrafen Carl August die sämmtlichen botanischen- und Lustgärten nicht nur im besten Stand erhalten, sondern wesentlich vermehrt, wie ein im Jahr 1747 im Druck erschienenenes Verzeichniss der Pflanzen in den Carlsruher Orangerien, Gewächshäusern und Gärten deutlich zeigt. *)

Nach demselben hatten die botanischen Gärten dahier damals über zweitausend verschiedene Pflanzen, ohne die vielen Abarten, aufzuweisen.

Zu den seltenen in jenem Verzeichniss vorkommenden Pflanzen gehörten: *Adansonia digitata* L. (A. Baobab Gaert.) mehrere grosse Campferbäume, *Laurus Camphora* L., *Cassia fistula* L. *Coccoloba uvifera* L. *Psidium pomiferum* L. *Theobroma Guazuma* L. *Cocos nucifera* L. *Caryca Papaya* L. *Dioscorea bulbifera* L. *Bixa orellana* L. *Tournefortia cymosa* L. und mehrere andere für die damaligen Zeiten äusserst seltene Pflanzen, welche nach und nach zu Grunde giengen.

Ob die Schuld davon an den nicht ganz zuträglichen Gewächshäusern, oder an der Versetzung des Garteninspectors Thran nach Durlach, (1757) und der Besetzung seiner verlassenen Stelle, durch einen nicht so thätigen und der Sache weniger gewachsenen Mann lag, konnte ich nicht auffinden. 1757 wurde der Garten hinter dem Schloß nach dem damaligen Geschmack, mit geraden Alleen, Hecken, Trillage, etc. etc. durch den Obergärtner Saul angelegt. 1783 wurde die Parthie beim Chinesischen Häufchen, durch Hofgärtner Müller hergestellt.

*) *Serenissimi Marchionis et Principis Bada-Durlacensis Hortus Carlsruhanus in tres ordines digestus, exhibens Nomina plantarum exoticarum, perennium et annuarum quae aluntur per Christianum Thran horti praefectum. Accedit Aurantiorum, Citreorum, Limonumque malorum Catalogus auctore Iosua Rislero pharmacopoeo. Loeraci literis Samuelis Augusti de la Carrière. 1747.*

Im Jahr 1768 wurde der berühmte Dr. Koelreuter als Botaniker dahier angestellt, und ihm aufgetragen, sämtliche Pflanzen zu bestimmen, und nach dem Linnischen System zu ordnen. Eingetretene Mißhelligkeiten mit dem damaligen Obergärtner Saul 1769 veranlaßten ihn, seine Versuche mit Bastardpflanzen auf seinen Privatgarten zu beschränken.

Am 6. April 1783 starb die erste Gemahlin Carl Friedrichs Carolina Louisa geborne Prinzessin von Hessen Darmstadt, die Erlauchte Mutter unsers geliebten jetzt regierenden Großherzogs.

Diese erhabene Fürstin verband mit den schönsten weiblichen Tugenden, mit denen Sie auf alle Ihre Umgebungen segnend wirkte, eine seltene Wissenschaftliche Bildung, und Ihre ausgezeichneten Kenntnisse in der Naturgeschichte dürfen hier nicht still übergangen werden, denn Ihrer Mitwirkung verdankt die hiesige Pflanzen-Cultur viel.

Ihr Verdienst für die Botanik lebt in der Pflanze *Carolinea Princeps* fort, welche Ihr Linné dedicirte.. *)

Im Jahr 1784 erhielt geheime Hofrath Gmelin ad interim die Lehrstelle eines Professors der Naturgeschichte und Pflanzenkunde am hiesigen Lyceum und zugleich den speciellen Auftrag, den botanischen Garten zu untersuchen, und den Erfund zu berichten.

Nach der damaligen Aufnahme, welche im Beisein eines beauftragten Commissairs geschah, belief sich die

*) Im Nachtrag zur 6ten Ausgabe der Gattungen der Pflanzen von Linné aus dem Lateinischen übersetzt von Planer pag. 78 heisst es: Zum Andenken der Durchlauchtigsten Fürstin und Frau Carolina Louisa Markgräfin von Baden, welche wegen der Neigung zu Pflanzen und deren Kenntniss sehr berühmt ist, und deren Namen allen, die Kenntniss der Pflanzen betreiben und lieben ehrwürdig seyn wird.

Anzahl sämmtlicher Pflanzen auf 1294 Species, wie aus dem Bericht vom 28. März 1787 ad Extract. F. R. H. Protoc. Nro. 3357. zu ersehen ist.

Nach dem Tod des Garteninspectors Müller fiel die Leitung des Gartens in die Hände des nachmaligen Garteninspectors Schweyckert, der aus England zurückgerufen wurde; ein äusserst thätiger Mann der sich durch Kenntnisse und Geschmack überhaupt ausgezeichnet, und sich in den Garten-Anlagen eines Theils des Schlossgartens, des Parks der Frau Markgräfin Amalia Hoheit, der Favorite u. m. a. sein Andenken, so wie das des geschmackvollen Sinnes Carl Friedrichs auch für diesen Zweig der Cultur gesichert hat.

Von 1787 bis 1795 tritt eine günstigere Periode für die botanischen und Lustgärten dahier ein. Die entstandenen Lücken, sowohl in den Gewächshäusern als im freyen Land wurden durch rege Correspondenz, durch die von Garteninspector Schweyckert aus England mitgebrachten Pflanzen und Saamen, und endlich durch die von dem geheimen Hofrath Gmelin unternommenen naturhistorischen Reisen in das südliche Frankreich u. Spanien, welche viele schöne und seltene Pflanzen und Sämereien, besonders in Gräsern einbrachten, ausgefüllt, und die Sammlung bedeutend vermehrt, wie aus dem 1791. herausgegebenen Pflanzen-Catalog „Catalogus plantarum Horti botanici Carlsruhani secundum systematis vegetabilium Caroli a Linné editionem decimam quartam“ zu ersehen, wornach der Garten damals 4000 Species aufzuweisen hatte. Später, nämlich nach dem Druck obigen Catalogs, kamen gegen 1000 hinzu, so dafs im Jahr 1795 gegen 5000 Species vorhanden waren.

Die Gartenländer für die ein und zweijährigen und perennierenden Pflanzen, so wie die Gewächshäuser waren schon damals zu beengt, um alles gehörig plaziren zu können. Markgraf Carl Friedrich ein Kenner und

Beschützer der Botanik, besuchte öfters mit Liebe den Garten, und überzeugte sich vollkommen, daß das Locale für die vielen Pflanzen zu klein, die Pflanzenhäuser durchgängig zu beengt und ohnehin baufällig seien.

Es wurde hierauf beschlossen, ohne weiteren Verzug dem Garten ein angemesseneres Locale zu geben, und neue, den Zeiten und dem Reichthum der Pflanzen angemessene Gewächshäuser zu erbauen.

Leider mußte dieser gnädigste Befehl, wegen der ausgebrochenen französischen Revolution, die allen Instituten des Friedens gefährlich zu werden schien, auf bessere und ruhigere Zeiten ausgesetzt bleiben.

Eine Reihe unglücklicher Ereignisse folgten nacheinander, im Frühjahr 1796. flüchtete der Hof bei Annäherung der Franzosen, ins Anspachische.

Während der Invasion der französischen Truppen trat die nothwendig gewordene größte Ersparniß ein, die leider auch die Gärten sehr hart traf, indem die nöthigsten Bedürfnisse versagt, oder nur halb und zur Unzeit gereicht wurden, wodurch die Sammlung von Jahr zu Jahr zurück kam.

Im April 1806 starb Garteninspector Schweyckert, worauf mir dessen Funktion huldreichst übertragen wurde. — Nach der damaligen genauen Aufnahme hatte der Garten zusammen gegen 3000 Species, meist Gehölz, Stauden und einjährige Gewächse; von seltenen Hauspflanzen war fast nichts vorhanden. Vom Jahr 1806 tritt für die botanische und Lustgärten dahier eine neue Epoche ein.

Kurz nach meiner Dienstanstellung erhielt ich auf gemachten Vortrag bei Sr. königl. Hoheit dem Großherzog Carl Friedrich, die Erlaubniß einen Transport von seltenen neu Holländer-Pflanzen, wovon der Garten ausser einigen *Metrosideros* keine aufzuweisen hatte, verschreiben zu dürfen, worunter die jetzt hier zu Riesen

herangewachsene Eucalypten, Metrosideros, Melaleucen, Leptospermen, Acacien, (Mimosen) Hakeen, Banksien, Casuarinen, u. d. m. von Pflanzen, die alle in deutschen Gärten noch selten waren, gehören.

Durch diesen schönen Transport wurde der Garten in kurzem bei glücklicher Vermehrung in den Stand gesetzt, mit andern Gärten sich in Tausch einzulassen, wodurch die Sammlung schnell empor kam.

Im Jahr 1807 wurde von höchster Behörde beschlossen, das große Zirkel-Orangerie-Gebäude, die auffällige Gewächshäuser, nebst dem jenes Quadrat fassenden Gartenplazes zu veräußern, und den Erlös zum Bau der neuen Pflanzen-Häuser zu verwenden.

Im Frühling 1808 wurden die neuen Baulichkeiten für die Botanik in ihrem jetzigen Locale angefangen, jedoch nur zwei Linien-Häuser vollendet.

Im Winter 1808. auf 1809. legte ich den jetzigen botanischen Garten an, preparirte das Erdreich, und brachte mit dem Beginnen des Frühlings die seit einem Jahr nur nothdürftig untergebrachten, ein und zweijährigen und die Staudengewächse, nach Classen geordnet, an den Ort ihrer Bestimmung.

Zu gleicher Zeit wurde die dritte Linie Häuser angefangen, so daß mit dem Herbst 1809. drei Linien-Häuser und die Garten-Anlagen vollendet waren; durch unermüdetes Bestreben, durch Nachziehen und Tausch mit den vorzüglichsten Gärten Deutschlands und Frankreichs, erhielt der hiesige Garten von 1806 bis im Sommer 1810, 1466 Species an Gehölz, Stauden und Hauspflanzen.

Im Herbst 1810 brachte Geheime Hofrath Gmelin 133. Species meist Tropische, Cap- und Neuholländer Pflanzen von Paris zurück. Durch die Naturhistorischen Reisen, welche derselbe öfters nach allen Richtungen

im Lande gemacht hatte, erhielt der Garten die vorzüglichsten inländischen Pflanzen und Saamen.

Im Februar 1811 erhielt ich von Sr. königl. Hoheit dem Großherzog Carl Friedrich den gnädigsten Befehl, unverweilt nach Paris zu reisen, um alles Schöne und Seltene von Pflanzen, die zu haben wären, mitzubringen.

Aus dem französischen Jardin des plantes und petite Trianon erhielt ich durch die Directoren Thouin und Bosc viele und seltene Pflanzen, die ich im Handel bei den dortigen Handelsgärtner für Geld nicht haben konnte.

Durch diesen reichen Transport erhielt der Garten einen neuen Zuwachs von 588 Species, ohne die Menge Sämereien, die ich von da mitbrachte.

Leider hatte dieser für Künste und Wissenschaften so thätige Fürst, dem die hiesige Garten-Cultur und die wissenschaftliche Botanik ihre Begründung und ihren ersten Flor dankt, nicht mehr lange das Glück seine neue Schöpfung zu genießsen; denn Er starb am 10. Juni 1811, nachdem er 65 Jahre ein Vater seines Volks und ein Gegenstand der Verehrung für alle, die sein Wirken kannten, regiert hatte.

Ein sonderbares Zusammentreffen mit einigen blühenden Agave (Aloe) verdient hier erwähnt zu werden. Bei dem Regierungsantritt des Höchstseligen Carl Friedrichs blühte nach dem Zeugniß der damaligen Botaniker zum erstenmal dahier Agave lurida Jacq, welche früher noch in keinem europäischen Garten zur Blüthe gebracht war, und in dem Jahr als Ihm Großherzog Carl 1811 in der Regierung folgte, blühte dasselbe Species wieder. *)

*) Siehe darüber Josua Rissler in seiner Vorrede pag. 3. und geh. Hofrath Gmelin in seiner Vorrede im Hortus Carlsruhanus pag. 3.

So wie alles dem Wechsel der Zeit und der Mode unterworfen ist, hörte auch die Tulipomanie auf, welche dem frühern holländischen Geschmack lange zusagte, und wozu hier die ehemaligen 4 Vertiefungen im vordern Schloßgarten ausgegraben wurden, um die Zwiebeln, ihrem natürlichen Standort angemessen, dem Horizontal-Wasser näher zu bringen, worinn sie ungemein schön vegetirten. Von diesen Vertiefungen hatten zwei Glashäuser und jede umfaßte ungefähr einen Flächenraum von 1. Morgen und lag 10 Fufs tief.

Obgleich nun dieser Garten den Foderungen des guten Geschmacks nicht entsprechend war, so hatte er doch durch seine Vertiefungen den eigenen Vorzug, daß in demselben manche Pflanze vor den rauhen Winden Schutz fand und gedieh, die sonst nicht so gut fortgekommen wäre.

Im Jahr 1811 und 1812 wurden jene Vertiefungen wieder ausgefüllt, der ganze vordere Garten von seinen Bux, Tax und Haynbuchen-Hecken, welche nahe an hundert Jahre gestanden waren, gereinigt. Ein schöner zur Schloßwache und dem Schlosse führender Raum von 275 Fufs Breite und 550 Fufs Länge in der Mitte frei gelassen, und die beiden Hälften links und rechts mit vierfachen Linden-Alleen im Jahr 1817 durch den Garten-Baudirector Zeyher und Hofbaumeister Dycerhoff angelegt und bepflanzt. Der innere Raum besteht aus Rasen, in der Mitte auf jeder Seite ist ein, 86. Fufs im Durchschnitt haltendes, Bassin angelegt, aus deren Mitte sich eine Felsengruppe erhebt, worauf 3 Najaden eine Muschel tragen, aus der das Wasser hervorquillt.

Um diese Bassins, so wie um die Rasen-Einfassung sind die Orangenbäume des Sommers gestellt.

Der Aufwand, den die Theilnahme an dem Krieg in Spanien und Rußland verursachte, erlaubten nicht

den Plan des Ober-Baudirectors Weinbrenner, einen grossen Festsaal mit der Botanik zu verbinden, in Ausführung zu bringen. Es wurde dagegen, weil es immer an Raum gebrach, das in der Vertiefung gestandene Gewächshaus 1811 ad interim an die Gränzmauer des neuen botanischen Gartens translocirt, um die Menge schnell herangewachsener Pflanzen unterzubringen.

Um nun eine genaue Uebersicht alles dessen, was der Garten aufzuweisen hatte, zu bekommen, gab geh. Hofrath Gmelin den Hortus magni Ducis Badensis Carlsruhanus im September 1811 heraus, wornach die Zahl der Species sich etwas über Sechstausend belief.

Im Jahr 1815 wollte der Höchstselige Großherzog Carl die Menagerie mit dem botanischen Garten verbinden, eine Menge vierfüßiger Thiere, Wasser- und andere Vögel, worunter sich viele seltene befanden, waren ihrer Zone angemessen zum Theil in die Gewächshäuser plazirt, wurden aber wegen Mangel an Raum 1817 in die Fasanerie zu den übrigen verbracht.

In demselben Jahr erhielt der Garten durch C. Manning, welcher aus England zurückkehrte, einen bedeutenden Zuwachs seltener Phaenerogamen; die Pflanzen gediehen bei guter Behandlung ungemein schön, aber die Häuser wurden zu eng, und waren für die grossen Neuholländer-Pflanzen zu niedrig.

Großherzog Carl gab hierauf seinem Minister v. Reitzenstein den Befehl, über den unverweilten Bau eines grossen Caphauses mit mir zu communiciren; leider konnte dieses Unternehmen nicht ausgeführt werden, denn Großherzog Carl starb am 8. Dezember 1818, der im Drang der ungünstigen Zeiten für die Aufnahme dieser Anstalt mit Liebe und Euld gewirkt hatte.

Was durch Zeit und Umstände mit dem besten Willen nicht ausgeführt werden konnte, wurde dem erlauch-

ten Sohn des verewigten Carl Friedrichs unserm glorreich regierenden Großherzog Ludwig vorbehalten.

Es gehört unter seine großen Regententugenden, daß Er nicht nur überall das Gute, das besteht, erhält, und was durch Zeit und Umstände herabgekommen ist; wieder zu kräftigem Leben ruft, sondern daß Er auch dem angefangenen schönen Werk neuen Schwung gibt, und es dem Ziel der Vollendung entgegenführt. Wie Er überall thätig wirkt, so wirkt Er auch für seine Gartenanlagen.

Zwei Monate nach dem Regierungs-Antritt wurden Anstalten zu dem längst gefühlten Bedürfnis, nämlich zur Erbauung eines geräumigen großen Gewächshauses für Cap - und Neuholländer-Pflanzen getroffen.

Nachdem der Baugegenstand gehörig berathen, die Plane dazu gefertigt, und für Herbeischaffung des Materials gesorgt war, wurde am 24. Juny 1819 der Bau begonnen, und nach Verlauf von vier Monaten war dieser colossale Bau vollendet, der unstreitig zu den größten und am zweckmässigsten eingerichteten gezählt werden darf. Diesen Bau leitete der obengenannte Hof-Baumeister Dyckerhoff. Das neue Gewächshaus imponirt nicht nur durch seinen äußern Anblick und ist für den Garten eine wahre Zierde sondern entspricht auch vollkommen dem Zweck, dem es gewidmet ist.

Am 18. Februar 1820 nach dem Ableben des Hofgärtners Müller, wurde dessen Gärtnerei, welche durch das Umgestalten des vordern Schloßgartens sehr beschränkt wurde, nachdem solche 33 Jahre getrennt war, mit der disseitigen Stelle wieder vereinigt.

Um das Ganze mehr zu arrondiren und die alten Orangerien neben dem Hoftheater, welche nicht gut situirt waren, zu anderm Zweck verwenden zu können, dankt jetzt der Garten seinem erhabenen Besitzer ein neues, beinahe eben so großes Orangerie-Gebäude, das

die nämliche schöne Einrichtung hat, und die Linie gegen dem Schloß zu fortsetzt, und so den Plan seiner Ausführung näher bringt, daß die Gewächshäuser an das Schloß sich anreihen sollen. Wird dieser Plan ausgeführt, so könnten dann Sr. Königlichen Hoheit unmittelbar aus ihren Apartements in die botanischen Anlagen treten.

Bisher mangelte es an einem Hauptbedürfnis in den Gartenparthien, nämlich an Wasser. Ausser Regenwasser, welches an mehreren Stellen aufgefangen wurde, mußte alles übrige gepumpt werden. Aber auch diesem Bedürfnisse wurde durch die voriges Jahr von Durlach nach Carlsruhe gemachte große Wasserleitung von Sr. Königlichen Hoheit, dem regierenden Großherzog, abgeholfen, und die Gärten mit laufenden Fontainen versehen.

Auch der Schloßgarten wurde nicht vergessen, im Sommer 1823 wurde dieser mit 4 schönen Urnen geschmückt, deren bildliche Vorstellung folgende ist.

Vom Schloßthurm rechts, auf dem großen Rasenplatz, steht die Eine auf der in Bas-relief der Wettstreit des Apollo und des Pan; auf derselben Seite an dem Hauptwege die zweite, die Diana als Luna; die dritte zur Seite des neuen Wegs, Diana als Göttin der Jagd; links zur Seite an dem Hauptweg gegen das vertiefte Thor hin, die vierte, das Urtheil des Paris, darstellend.

Im Sommer 1824 wurde der Eingang in den Schloßgarten nächst der Hofküche links, an das Gebüsch angelehnt, mit einer schönen Wasserparthie, ein Seepferd von Tritonen, umgeben, geziert, das Wasser steht mit der großen Leitung von Durlach in Verbindung.

Beschreibung des botanischen Gartens.

Die Lage des Gartens ist freundlich, von der Nordseite durch den Schloßgarten, welcher durch drei Thore mit ihm zusammenhängt, begränzt.

Das Gebüsch des Schloßgartens schützt vor rauhen Winden, dicht hinter den Gewächshäusern ist die Pappelallee, wovon ein Theil mit *Sophora japonica* L. die andere drei Theile aber mit Italiänischen Pappeln bepflanzt sind. Letztere sind die Väter von allen inländischen Pappeln, die im Jahr 1764 hierher gebracht wurden. *)

Mit dem Schloßgarten ist zugleich das Arboretum verbunden, woselbst alle ausländische Bäume und Sträucher, welche das hiesige Clima ertragen, angepflanzt und zu finden sind.

Auf der Ostseite steht das Schloß nebst dessen Oeconomie - Gebäuden, und von Süden und Westen hängt der Garten mit der Stadt zusammen, von welcher Seite ebenfalls zwei Eingänge angebracht sind. Der Haupteingang ist bei der Gärtnerei-Wohnung, und während der Arbeits-Stunden bei den humanen Gesinnungen des Durchlauchtigsten Regenten für Jedermann offen; dankbar erkennen die Bewohner der Residenz und die nicht hier Einheimischen die gnädigste Erlaubniß zum freien Zutritt an einen Ort, der ihnen Belehrung und

*) Die Lombardische oder Italiänische Pappel kam im Jahr 1749 zuerst nach Frankreich, und in England wurde sie bei Rochefort 1758 angepflanzt. Ait. Hortus Kewensis.

Die schöne von Carlsruhe nach Durlach in schnurgerader Linie führende Pappel-Allee, besteht aus Abkömmlingen hievon die im Jahr 1770. gepflanzt wurden. Viele dieser Stämme messen 3 Fuß vom Boden, 15 Fuß im Umkreise.

Erholung unter den tausendfachen Formen von Pflanzen gewährt.

Die Hauptwege sind breit und durchgängig zum Fahren eingerichtet.

Die Rabatten hinter den Gewächshäusern nehmen solche Pflanzen auf, die zu ihrem Gedeihen wegen ihrer vielen feinen Thauwurzeln und schwammigten Erde, Schatten unumgänglich nöthig haben, als Andromeden, Azaleen, Rhododendron, Kalmien, Vaccinien u. d. m.

Die punktirten Rabatten vor und hinter den Gewächshäusern mit I. bezeichnet, dienen während den Sommer-Monaten zur Aufstellung der Glashauspflanzen.

Die Rabatten längs den Hauptwegen sind mit Weinreben, wovon der Garten einige 80 Arten von vorzüglicher Güte aufzuweisen hat, begränzt. Diese Reben geben ausser dem Ertrag, weil ihre Wurzeln tief gehen, den Pflanzen unbeschadet, welchen die grellen Sonnenstrahlen nachtheilig sind, den nöthigen Schatten. Rosen und einige Obstbäume, als frühe Kirschen, Mirabellen, Reineclaude etc. stehen wechselsweise an den Geländer-Pfosten.

Die Beeten H. sind mit ein- und zweijährigen und Staudengewächsen nach Classen geordnet, bepflanzt. K. ist ein kleiner Hügel, worauf alle immer grüne Pflanzen angebracht sind, als Pinus-Arten Juniperus, Cupressus, Phillyreen, Buxus, worunter B. Balearica ist, Daphne, Aucuba, Rhododendron, Rhamnus, Ruscus, Prunus lusitanica, Prunus Laurocerasus, Viburnum Tinus, Hypericum, Fontanesia u. d. m.

M. enthält eine Feigenanlage von 9. verschiedenen Sorten; des Winters werden diese niedergebogen und mit Laub bedeckt.

Um dem Garten an dieser Seite von seiner freundlichen Lage nichts zu benehmen, ist dieser so wie ein großer Theil des Schloßgartens mit einer Aha-Mauer

begrenzt, und ausser dieser Gränze sind Gleditschien, Tulpenbäume und Wallnufsbäume angepflanzt.

Das mit A bezeichnete Orangerie-Gebäude enthält die größten Bäume, wovon viele im Stamm 3 Fufs im Umkreis, und 24 — 26 Fufs Höhe haben. Diese stehen grösstentheils des Sommers hinter dem Schloß um den Thurm her.

Das Gewächshaus B. imponirt in allen Theilen. Es nimmt die größten Cap- und Neuholländer Pflanzen auf, und hat 3 Bassins. Das zum Begiessen nöthige Wasser wird auf die höchste Stufe getrieben. In der Mitte ist eine Blumenstellage für die seltensten blühenden Pflanzen, und hat zur Aufbewahrung von Garten-Requisiten einen schönen gewölbten Keller. Die Inclination gegen die Sonne ist 3 Fufs.

In derselben Linie, steht das schöne erst 1824 gebaute Orangeriehaus, welches mit C. bezeichnet, wovon weiter oben bereits mehreres geredet worden ist. —

Die zweite Linie Häuser mit D. bezeichnet enthält meistens tropische Gewächse. Das hintere Zimmer war der Lieblings-Aufenthalt des erhabenen Erbauers Großherzogs Carl Friedrich; die kleine Zimmer in der Höhe oberhalb den Vorhäusern dienen zum Aufbewahren der alphabetisch geordneten Sämereien, die gewöhnlich gebraucht werden.

Die dritte Linie Häuser mit E. bezeichnet, nimmt die kleinere tropische, Cap- und Neuholländer-Pflanzen auf, wovon die Fenster der mittleren Abtheilung Nro. 1. nach der hiesigen Polhöhe $49^{\circ} 2'$ Inclination haben. Hinter dieser Abtheilung ist das Seminarium worin 2200 Species Saamen zur Belehrung nach Classen geordnet in Gläsern aufgestellt sind.

Auf einer andern 8 Fufs langen und 3 Fufs hohen eingeramten Tafel sind die Sämereien zu ersehen zu mehlichten Gemüsern, öconomischen und Futterkräu-

XXVIII

tern, zu Getreidearten, und andern Pflanzen, wovon man das Blatt, den Stengel, die Frucht, oder Wurzeln essen kann, ferner Sämereien von Salatkräutern, Gewürzkräutern, Zierpflanzen, Arzneypflanzen, Bäumen und Sträuchern, und ölichten Saamen.

Die kleinen Neben - Cabinetten enthalten die Holzbibliothek, auf jedem Band ist der systematische Namen angebracht, um Versuche mit diesen Hölzern, wozu sie sich allenfalls brauchen ließen, zu machen, ist die eine Seite bloß abgehobelt, die andere aber polirt, das innere des Buchs enthält die Blüthen, Blätter und Saamen.

Das in der Erde vertiefte Häuschen mit F. bezeichnet, enthält die wärmsten jungen tropischen Pflanzen, und ist zugleich zum Nachziehen bestimmt.

In sämtlichen Pflanzen-Häusern sind statt Oefen, Feuer-Canäle angebracht, wodurch die Wärme schnell und gleichmäßig vertheilt wird. Die Heizung geschieht mit Holz.

Die äussern Wände der Gewächshäuser sind mit rankenden und andern Pflanzen als: *Bignonia radicans*, *B. capreolata*, *Clematis*, *Periploca*, *Glycine frutescens*, *Glychinensis*, *Atragene*, *Vitis vinifera*, *vulpina*, *labrusca*, *Arborea*, *indivisa*, *Vitex agnus-castus*, *Pistacien*, *Cydonia japonica*, *Jasminum officinale*, *revolutum* etc. etc. bepflanzt, welche während ihrer Blüthe- und Fruchtenzeit einen herrlichen Anblick gewähren.

Cultur der hiesigen Pflanzen.

Ueber die Cultur der Pflanzen findet man in den meisten ältern und neuern Werken wenig befriedigendes, entweder wird oberflächlich darüber weggegangen, oder gar nichts davon erwähnt.

Müllers Gärtner-Lexicon von 1776 macht zwar eine Ausnahme, leider enthält aber jenes classische Werk nichts von neuern Pflanzen.

Zu dem Gedeihen der Pflanzen kommt es hauptsächlich auf Wasser, Erde, und glücklich gewählte Situation an. Ersteres läßt sich in Ermangelung von Fluß- oder Regenwasser, durch Pumpwasser, welches vor dem Gebrauch 12 — 20 Stunden in Cisternen von der Athmosphäre berührt wird (Seewasser ausgenommen) zum Gebrauch tauglich machen.

Die Situation oder Plazirung der Pflanzen findet bei einigen geographischen Kenntnissen wenig Schwierigkeiten, auch wird fast in jedem botanischen Werk das Vaterland angegeben, wo jede Pflanze ihrer Zone angemessen untergebracht werden soll.

Die Erde hingegen legt an vielen Orten sehr grose Schwierigkeiten in Weg, häufig wird das Kränkeln der Pflanzen, welches meistens von der Erde herrührt, andern Ursachen zugeschrieben. Wenn z. B. Pflanzen, welche sehr viele feine Haarwurzeln haben, als Andromeden, Azaleen, Rhododendron etc. in eine nicht zuträgliche Heidenerde, Bruch- oder gar Mistbeeterde gepflanzt werden, so werden sie sich zwar aus ihrem alten Ballen und durch das Einsaugen aus der Athmosphäre Jahrelang, aber nur in kränklichem Zustand, erhalten, weil sie die ihnen unzuträgliche Erde gar nicht annehmen, während andere Pflanzen als *Metrosideros*, *Leptospermum*, *Acacien* (*Mimosen*) etc. sehr gut darin gedeihen.

Ein Haupterforderniß ist deswegen ein gut unter-

haltenes Erdemagazin, das, wo möglich, frei, und nicht wie häufig der Fall ist, an entlegenen schattigen Winkeln oder an allzuheissen Orten angelegt werden muß. Ist die Lage zu schattig, so bleiben eine Menge Theile unaufgelöst, was eine Unmenge von Würmern erzeugt, deren Brut darin bleibt, die dann den schwächlichen Pflanzen sehr zusetzen. Ist sie aber zu heiss, so wird der Erde eine Menge aetherischer Theile entzogen.

Die Lage des hiesigen Erdemagazins ist so gewählt, daß das erforderliche Licht durch die einzeln umherstehenden Bäume zu allen Jahreszeiten durchscheint.

Jede Gattung Erde halte ich besonders, und mische solche nach dem Bedürfniss der Gewächse 8 — 14 Tage vor dem Gebrauch.

Die gewöhnliche Sorte, die am meisten gebraucht wird, und unter dem Namen Mistbeet-Erde bekannt ist, besteht aus Abgang im Garten, als Laub, Reifs, Jäthgras, abgängige Versetz-Erde etc. Man hüte sich ja vor dem an vielen Orten üblichen Gebrauch, alte Gerberlohe auf die Erdhaufen zu bringen, wodurch nichts als das Volumen ohne den geringsten Gehalt vermehrt, und eine unsägliche Menge Würmer erzeugt wird.

Um das Eindringen der Witterung zu begünstigen, häufe ich die Erde 2, höchstens $2\frac{1}{2}$ Fufs hoch, setze sie jährlich ein- bis zweimal um, reinige sie fleissig von Unkraut, bei welcher Behandlung die Erde gewöhnlich im 5ten Jahr brauchbar wird.

Dieselbe Behandlung gilt bei den nachfolgenden Erdarten.

Die zweite Sorte ist die sogenannte Damm- oder Rasenerde, eine vorzüglich gute Erdart, die wie mir scheint in vielen Gärten nicht gehörig gewürdigt wird. Sie ist fast überall auf Viehweiden leicht zu haben. Die Hauptbestandtheile dieses Humus sind Vegetabilien und thierische Auflösungen. Sie fühlt sich weich an,

ist leicht zerreiblich, und im Wasser auflösbar, womit sie sich, ohne sogleich wieder auf den Boden zu fallen, vermischt. Ich nehme sie des Sommers bei guter Witterung 2 — 3 Zoll tief, und bringe sie im Erdmagazin auf flache, 1. höchstens 2. Fufs hohe Haufen. Im folgenden Sommer ist sie zu gebrauchen, und eben weil sie gar bald zum Gebrauch tauglich ist, spare ich sie nie über 2 Jahre zusammen, da ich gefunden habe, dafs sie bei längerem Aufheben an Gehalt verliert.

Kühlager oder Kühmist, den ich ebenfalls besonders behandle, braucht zur völligen Verwesung 3 — 4. Jahre. Fleisiges Herumsetzen, das Reinhalten von Unkraut, welches dieser aus lauter Vegetabilien bestehender Dünger in unglaublicher Menge erzeugt, und lange keimfähig erhält, sind Gegenstände, die ich besonders beobachte und empfehle.

Pferdemist, welcher hitziger Natur ist, halte ich gleichfalls abgesondert, bediene mich jedoch desselben nicht in der Menge, wie der andern Erdarten, weil der Hauptstoff der hiesigen Erde von Natur viel Sand mit sich führt. Diese Art Dünger verwest schnell, und kann im 3ten Jahr gebraucht werden; nur ist zu bemerken, dafs er des Sommers während er gesammelt wird, bei trokener Witterung öfters begossen werden mufs.

Heidenerde besteht aus verwesenen Vegetabilien, die man gewöhnlich auf Bergen und an Abhängen, wo *Erica Vulgaris* L., (Heidekraut) wächst, findet. Nicht immer ist diese Erdart von guter Beschaffenheit, entweder ist sie zu fett und mit andern Erdtheilen vermischt, wie meistens die, welche in hiesiger Gegend gefunden wird, und führt ausserdem zu wenig Sand mit sich, oder sie ist zu sandig und mager. Mischungen aller Art habe ich seit 19. Jahren gemacht, aber nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Diejenige Heiden-erde, die ich für *Erica* und andere feinen Cap- und

Neuholländer Pflanzen am zuträglichsten gefunden habe, ist die, welche man auf unsern Gebirgen bei Gernsbach an trockenen Stellen und auf Felsen findet. Sie ist locker, elastisch und besteht aus lauter verwesenen Vegetabilien.

Eine vorzüglich gute Erde ist nach meiner Erfahrung seit vielen Jahren die verwesene Holzerde, auf welche mich ein sonderbarer Zufall aufmerksam machte. Bei meiner Dienstanstellung fand ich mehrere *Rhododendron ponticum*, in kränkendem Zustande in Töpfen. Ich versetzte sie in andere Erde, wechselte ihren Standort mehrere Jahre vergebens. Verdrüsslich über diese kranke Pflanzen, denen ich es an Pflege nicht fehlen liefs, setzte ich sie in die damals hier gewöhnlich gebrauchte Heidenerde in's freie Land. Einige davon, besonders die am Rande des Beets stehenden, an herrlich zu grünen, während die übrigen bei gleicher Behandlung eben so schlecht blieben, als vor ihrer Versetzung. Ich spürte der Ursache nach, und fand beim Aufgraben, daß die am Rand stehenden sich mit ihren Wurzeln in ein rothfaules Bret gemacht hatten. Nun liefs ich im Walde einige Körbe verwesene Holzerde holen, setzte die kränkenden Pflanzen in diese, worauf sie das nächste Jahr fußslange Ruthen trieben, und herrlich blühten.

Seitdem nehme ich für Azaleen, Andromeden, *Rhododendron*, *Kalmien*, *Vaccinien*, *Clethra*, etc. welche insgesamt viele feine Haarwurzeln machen, in Töpfen und für's freie Land, keine andere Erde, als oben erwähnte Holzerde, ob von Buchen oder Eichen, Tannen oder Weiden-Bäumen, wenn sie nur hinlänglich verwesen ist.

Im frischen Zustand, wie ich sie aus dem Walde von hohlen Bäumen erhalte, sieht sie gewöhnlich roth aus, und gleicht sehr dem frischen Gerberlohe.

Mehrartige Versuche von anderer holziger Erde ha-

ben nicht den gewünschten Erfolg geliefert. So habe ich z. B. Rhododendron, nachdem ich sie zuvor im Wasser von ihrer bisher gewöhnten Erde gänzlich befreit hatte, in alte Sägespäne, alten Gerberlohe, in verwesene Holzspäne und in Torf gepflanzt, mit letzterm glaubte ich, würde es gar nicht fehlen, da dieser sich ganz ihrem natürlichen Standort nähert. Nur in den alten Sägespänen zeigten sich dürftige Wurzeln, alle andere Rhododendron aber nahmen die ihnen gegebenen Erdarten durchaus nicht an.

Um bei Anlegung großer Beete von obiger Holzerde mit möglicher Oeconomie zu verfahren, gehe ich auf folgende Art zu Werk; um den Pflanzen ihren angemessenen Standort zu geben, so wie das allzuschnelle Austrocknen dieser lockern schwammigten Erde zu verhindern, wähle ich eine schattige Lage, grabe den Boden $2\frac{1}{2}$ bis 3 Fufs tief aus. In diese Rabatte kommen 1 Fufs hoch Holzspäne mit Sägespäne vermischt, auf diese der Abgang von der durchgeworfenen Holzerde, und auf diese etwa einen starken Fufs hoch Holzerde, worin die Pflanzen Ueberflufs von Nahrung finden, und häufig in einem Jahr drei Fufs hohe Triebe machen.

Die letzte Erdart ist feiner Wassersand, welcher zur Mischung von Heidenerde, wenn sie von Natur nicht hinlänglich Sand mit sich führt, so wie für Fettpflanzen nöthig ist.

- Die Zusammensetzung der Erdarten ist folgende:
- 6. Karren durchgeworfene gewöhnliche oder Mistbeeterde.
 - 3. Karren Rasenerde.
 - 2. do. Kühlagererde.
 - 1. do. Pferdmisterde.

Dies alles wird auf einen Haufen gebracht, und noch einmal durchgeworfen; Sand nehme ich keinen

dazu, weil die hiesige Erde von Natur ihn hinlänglich mit sich führt. In dieser Erde gedeiht fast jede Pflanze, will ich nun der einen oder andern Pflanze mit ihrer angemessenen Erde zu Hülfe kommen, welches sich leicht aus den Wurzeln beurtheilen läßt, so nehme ich von diesem Haufen und setze etwas von der gewöhnlichen Heidenerde hinzu, und so wird diese Mischung für Malpighien, Banisterien, Chrysophyllen etc. tauglich. Andern viele Nahrung liebenden Pflanzen, als Musa Dracaena, Phoenix, Chamaerops, Bambusa, Zamia, Pandanus, Magnolia etc. setze ich die Hälfte ungesiebte Rasenerde hinzu.

Für *Metrosideros*, *Eucalyptus*, *Banksia*, *Hakea*, *Melaleuca*, *Leptospermum*, *Casuarina*, *Protea*, *Camellia* etc. nehme ich Rasenerde und gewöhnliche Heidenerde, von jedem Theil die Hälfte, worin sie ungemein schön vegetiren.

Für *Cymbidien*, *Limodorum*, *Dianella*, *Epidendron*, *Pothos*, *Bauersia* etc. nehme ich von ersterer Mischung, welcher ich geschnittene Baumrinde beifüge.

Viele Pflanzen bedürfen übrigens keineswegs der kostbaren Heidenerde, die von guten Bestandtheilen an den meisten Orten schwer, auch wohl gar nicht zu haben ist. Ich habe seit 5 Jahren bei *Metrosideros*, *Acacia*, *Leptospermum*, *Melaleuca* etc. Versuche mit ungemischter Rasenerde gemacht, welche eben so üppig, wie in der vorerwähnten Erde, ohne dafs man an ihrem Grün oder ihrem Wuchs den geringsten Unterschied bemerkt, gedeihen, und ich bin Willens, die Heidenerde, welche bei der Menge grofser Kübel und Töpfe einen bedeutenden Aufwand verursacht, dadurch entbehrlicher zu machen.

Die Londner Gärtner bedienen sich bei dem gröfsten Theil ihrer Topfpflanzen, sogar bei halmien, einer Art

lehmigter Erde, die sie Mould nennen, welche der hiesigen Rasenerde völlig gleich kommt.

Die Pariser Gärtner hingegen haben eine andere sehr gute Heidenerde, welche von Natur viel feinen Sand mit sich führt, die sie auf den nächstliegenden Bergen holen, und worin sie fast alles, als Rosen, Orangenbäumchen, Camellien, Magnolien, Palmen, Heliotrop, Heiden u. s. w. ziehen, wovon ich mich öfters dort, auf dem Blumenmarkt überzeugt habe.

Eine nähere Analyse über die Bestandtheile der Erdarten findet sich in Professor Schüblers Bemerkungen zu Chaptals Agrikultur-Chemie von Seite 330 — 350.

Die Vermehrung der Pflanzen kann bei den meisten entweder durch Saamen, Wurzeln, Stopfer, Senktöpfe, Ablegen oder durch Veredlung auf andern passenden Pflanzen geschehen.

Die Vermehrung aus Saamen, liefert unstreitig die schönsten und gesündesten Pflanzen, nur kann sie nicht bei allen Generibus angewandt werden. Z. B. nicht bei Pelargonien, Rosen etc. welche sich zu sehr miteinander verbastern.

Will man diese rein erhalten, so geschieht ihre Fortpflanzung entweder durch Steklinge oder durch abgenommene Wurzeln. Da nun nicht jede Pflanze guten Saamen liefert manche schwer aus ihrem Vaterland zu beziehen ist, und andere sich durch Ablegen und Steklinge schwer oder wohl gar nicht vermehren, so lassen sich viele holzige Pflanzen als: *Aralia spinosa*, *Comptonia asplenifolia*, *Ailanthus*, *Broussonetia*, *Rhus*, *Bignonia*, *Gleditschia*, *Periploca*, *Sophora japonica*, *Crataeva* etc. so wie ein großer Theil aus der 17. Classe durch Wurzeln sehr leicht fortpflanzen.

Am sichersten ist es, wenn man im Monat März die Wurzeln abnimmt, sie in 6 bis 9 Zoll lange Stücke schneidet und sie alsdann auf ein lockres, nicht allzuson-

nigtes Beet ins Freie 1 Fuß von einander pflanzt, so daß die Krone des dickern Theils der Wurzel mit einem halben Zoll Erde bedeckt wird und um den Wechsel der Witterung unschädlich zu machen, die Beete mit halbverwesenen Laub, etwa 1 Zoll hoch überstreut werden.

Obgleich die Art wie, und die Zeit wenn man Stopfer, Senktöpfe und Ableger macht, hinlänglich bekannt ist, so glaube ich dennoch manchem Gartenfreund einen Dienst zu thun, wenn ich hier die Zeit und die Methode wann und wie ich meine Stopfer mache, erwähne.

Die gewöhnliche Zeit Stopfer zu machen, ist bekanntlich um Johanni, wo der erste Trieb vorüber ist und die Zweige hinreichend hart sind. Um jene Zeit lassen sich zwar in Mistbeeten oder in Töpfen viele Pflanzen leicht und geschwind vermehren, andere dagegen von härter hölziger Beschaffenheit als *Andromeda*, *Azalea*, *Olea*, *Rhododendron*, *Melaleuca*, *Hakea*, *Illicium*, *Kalmia*, *Ilex*, *Malpighia* etc. machen im Sommer schwer, auch wohl gar nicht Wurzeln, wegen von den zu Ausgang des Dezembers gemachten Steklingen bei guter Behandlung fast wenige fehlen.

In die Töpfe lege ich ein bis zwei Zoll hoch zerstoßene Scherben. Nachdem die Töpfe wozu ich meist neue nehme zu Ausgang des Dezembers mit ihrer für die Pflanzen passenden Erde die schon im Herbst vorrätig in die Häuser gebracht wird, gefüllt sind, werden die Steklinge woran ein Knoten 2jähriges Holz sein muß, fest und dicht zusammengestopft. Darauf wird alsdann eine passende Glasglocke gestürzt, und in ein Lohbeet im warmen Haus nahe am Fenster oder in ein temperirtes Mistbeet eingegraben. Täglich müssen die Glasglocken ausgetrocknet werden, um die allzuvielle Feuchtigkeit, welche die Stopfer in den ersten 3 bis 4 Wochen nicht lieben, zu beseitigen. Bei Sonnenschein

wird durch Papier das auf die Glöcken gelegt wird Schatten gegeben. Später kann dieser mit Reifs das man auf die Fenster legt gemacht werden. Ist die Witterung mild, so ist es gut wenn die Glocken alle 3 — 4 Tage einige Stunden abgenommen und so die Steklinge ausgelüftet werden. In zwei Monaten hat der größte Theil Wurzeln, die dann auseinandergenommen in kleine Töpfe gepflanzt und wieder in ein temperirtes Beet gebracht werden. Zu Anfang May werden sie alsdann in's Freie gestellt.

Die Aufstellung der Topf- und Kübelgewächse während des Sommers im Freien, verlangt viele Aufmerksamkeit. An vielen Orten stehen sie auf hohen, aller Witterung ausgesetzten Stellagen, wodurch die zärtlicheren Pflanzen, besonders jene welche leichte Erde haben, sehr leiden.

Durch die Sonne werden die Töpfe glühend heiss, und des Nachts, besonders im August und September, wo die Nächte länger und kühl werden, eben so kalt, wodurch die zarten Wurzeln die sich am Rand des Topfes anlegen, natürlich leiden, was für die Pflanzen nachtheilige Folgen hat. Ausser Fettpflanzen stelle ich sämtliche kalte Hauspflanzen, so wie viele wärmere Topfpflanzen auf Beete, deren Lage den Pflanzen und der Erde angemessen ist, und die mit Sand oder Lohe ausgefüllt sind.

Ist die Witterung sehr trocken und warm, so werden die Töpfe bis an den Rand eingegraben, und etwa alle 3 Wochen, um das Durchwurzeln zu verhüten, gedreht. Beim Versetzen, welche Arbeit größtentheils im August geschieht, werden sie bis zum Einbringen in die Gewächshäuser auf die Beeten gestellt. Bei dieser Behandlung genießen die Pflanzen eine angemessene Feuchtigkeit, und es wird zugleich dabei viel Zeit beim Begiesen erspart.

Die großen Topf- und Kübelgewächse stehen an zuträglichen Stellen in den Hauptwegen des botanischen Gartens.

Die Cultur der Tropenpflanzen erfordert viel mehr Aufmerksamkeit, als die, welche in Caphäusern überwintert werden. Den größten Theil vom Jahr, sind sie vermöge ihres natürlichen Klima's, des Zutritts der freien Luft beraubt, stehen öfters zu dicht beisammen, werden häufig mittelst Ofenwärme zu warm gehalten, wodurch sie sich frühzeitig widernatürlich entblättern, und sind obendrein einem Hauptübel, nämlich den Pflanzenläusen unterworfen, welches bei kalten Hauspflanzen seltener der Fall ist.

Die hiesigen warmen Hauspflanzen halte ich weit kälter, als es an andern Orten geschieht.

Ich gebe in den warmen Häusern nie über 10 — 11 Grad Reaumur Ofenwärme, und so wie es die Frühlingswitterung erlaubt, öffne ich bei starkem Sonnenschein die Thüren, und im Ausgang des Aprils oder im Anfang des Mays die Fenster, welche ich während der Sommertage sogar Nachts offen stehen lasse. Viele Pflanzen als *Cestrum*, *Ficus*, *Lantana*, *Duranta*, *Hibiscus*, mehrere *Sp. Phyllanthus*, *Jasminum*, *Caladium* etc. stelle ich 4 — 5 Monate lang an warme Stellen ganz ins Freie, wozu ich gewöhnlich dunkle trübe Witterung, oder Regenwetter abwarte, welches ich überhaupt beim Herausbringen aller Pflanzen beobachte, weil sonst beim Sonnenschein die Blätter gar leicht verbrennen, und der halbe Sommer vorübergeht, ehe sie sich wieder erholen.

Dadurch habe ich den Vortheil, daß die Pflanzen in den Häusern dünner zu stehen kommen, und diejenigen, welche während der warmen Sommermonate das Freie ertragen, kräftiger werden, und weit lieber blühen.

Das Bespritzen der Pflanzen mit reinem Wasser besonders des Frühjahrs, ist von grossem Vortheil, dadurch wird der unvermeidliche Staub abgewaschen, den Insekten entgegengewirkt, hauptsächlich aber das Entwickeln der Knospen begünstigt. Ist den folgenden Tag gute Witterung zu vermuthen, so lasse ich in sämmtlichen Häusern des Abends von allen Richtungen einen tüchtigen feinen Regen machen. Für die ganz grosse Häuser, so wie für die Pflanzen nehme ich während der heissen Sommertage im Freien eine Handfeuerspritze, womit sich durch das Vorhalten des Daumens jede beliebige Wendung machen, und der Regen bald stärker bald schwächer geben läßt. Durch diesen künstlichen Regen bildet sich mehr kohlenaures Gas, welches den Vegetations-Proceß ungemein befördert.

Die Lohbeete lasse ich, um durch die Gährung neue Wärme zu bekommen, jährlich 4mal herumarbeiten. Im Frühjahr und Sommer nehme ich, weil die warme Witterung zu Hülfe kommt, nur wenig Zusatz von neuem Lohe; hingegen im Herbst und im Winter, theils um die Wurzeln der Pflanzen in Thätigkeit zu erhalten, theils um die Regenwürmer abzuhalten, gegen welche man bisher kein Mittel gefunden hat, nehme ich weil dieser Artikel seit 10 Jahren so theuer geworden ist, statt 3 Fufs nur 2 Fufs neuen Lohe, womit ich die nöthige Wärme erhalte.

Werden die Tropenpflanzen auch noch so pünktlich gepflegt, so sind sie doch wie oben erwähnt, einem Hauptübel, nämlich den Pflanzenläusen unterworfen, welche sie zum Theil von einander erben, und welche sich durch die den Pflanzen nöthige Wärme in kurzem ins Unendliche vermehren, ohne daß sie durch die Witterung oder durch Insekten, denen sie im Freien zur Nahrung dienen würden, irgend eine Störung leiden.

Eine der gefährlichsten dieser ungebetenen Gäste ist *Coccus-adonidum* Lin. (Gewächshaus-Schildlaus,) der Körper hat eine matte Rosenfarbe, und ist mit mehligem weisem Staube bedeckt, Flügel und Schwanz des Männchens sind weiß, das Weibchen hat Seidenanhänge, von denen die letztern länger sind, und eine Art von Schwanz bilden. Es umhüllt die Eier in eine weisse wollige Masse, welche ihnen zum Schutz dient, am häufigsten findet man sie auf *Coffea*, *Hamelia*, *Jxora*, *Gardenia*, *Banisteria*, *Erythrina* und vielen andern warmen Pflanzen. Ausser obigen Species giebt es noch mehrere als *Coccus hesperidum*, welche auf Orangenbäumen, *Oleander* und *Lorbeer* vorkommt, ein anderes Species auf *Cactus*, *Cycas*, *Mesembryanthemum*, *Bossiaea* u. d. m.

Fleisiges Waschen mit reinem Wasser, besonders Ueberpinseln mit schwarzer Seife in etwas lauem Wasser aufgelöst, ist ein ganz untrügliches Mittel, um diese Gäste sowohl im Freien an Pflirsichen und Reben, als in Gewächshäusern, ohne der Pflanze im geringsten zu schaden, los zu werden. Pflanzen, welche im Winter ihre Blätter fallen lassen, bestreiche ich im März mit dieser schwarzen oder Schmierseife, die sich Jeder selber bereiten kann. Man nimmt 1 $\frac{1}{4}$ Pfund Thran, 4 Pfund Potasche. Die Potasche wird in Wasser aufgelöst, und so viel frisch gebrannter Kalk bis zu einem dicken Brei abgelöscht, noch warm damit vermischt, bis verdünnte Schwefelsäure mit dieser viltrirten Lauge weder ein Aufbrausen noch einen Niederschlag verursacht. Nun wird die Lauge hell durchgesehen, und in einem eisernen Kessel gekocht, bis das Ganze eine seifenartige dickichte Masse darstellt.

Willdenow empfiehlt in seinem Grundriß der Kräuterkunde pag. 389 das Bestreichen mit Seifensiederlauge oder Tabaksdecockt, und starkes Räuchern mit Tabaks-

blätter in einem verschlossenen Zimmer, oder man solle, so fern es die Temperatur erlaubt, die Pflanze plötzlich an einen schattigen luftigen Ort ins Freie stellen. Mehrmalige Versuche haben bei obigen Coccus-Arten bei mir nicht den gewünschten Erfolg gehabt.

Ausser den angegebenen Mitteln giebt es noch mehrere, diese lästige Gäste zu vertreiben. Zwei bis drei Theelöffel voll Terpentinspiritus in ein gewöhnliches Trinkglas voll Wasser gethan, wohl umgerührt, und damit bestrichen, leistet gute Dienste. Weil aber der Terpentin besonders an der Luft zu schnell verfliegt, so sterben nur die, welche der Terpentin unmittelbar trift, und die Brut treibt in wenigen Tagen ihr Wesen ungestört fort.

Ein anderes von Tatin, in mehreren Blättern empfohlenes Mittel, wovon ich zwar noch keine Proben habe, soll sehr gut und wohlfeil sein, und deshalb auf Gartenbeeten gegen Erdflöhe, Blattläuse, Schneken etc. gebraucht werden können.

Man nimmt schwarze Seife 2 $\frac{1}{2}$ Pfund, Schwefelblumen 2 $\frac{1}{2}$ Pfund, Holz- oder Mistbeet Champignon 2 Pfund, und 60 Kannen Wasser, man theilt das Wasser in 2 gleiche Theile, und schüttet die eine Hälfte in ein Fafs, löset die schwarze Seife darin auf, und fügt die vorher leicht zerquetschten Champignons hinzu. Die andere Hälfte des Wassers läßt man 20 Minuten lang kochen, vor dem Aufwallen bringt man den Schwefel hinein, den man in ein dünnes Tuch einwickelt, welches mit einem Gewicht beschwert wird, damit es zu Boden bleibt. Indessen rührt man das Wasser um, damit es die Farbe annimmt, und drückt zugleich den Schwefel von Zeit zu Zeit mit dem Ende des Stokes. Hierauf gießt man das kochende Wasser in das Fafs, rührt es einen Augenblick mit dem Stock um, und schüttelt es jeden Tag, bis es einen stinkenden Geruch be-

kommt; denn je älter und stinkender die Mischung wird, desto wirksamer ist sie. Man taucht die Aeste der Pflanzen hinein, begießt und besprengt sie mit dieser Mischung.

Die Blattlaus. *Aphis* Lin. Die Fühlhörner länger, als der Halsschild, bestehen aus sieben Gliedern, das dritte davon lang. Am Ende des Hinterleibs stehen bei den meisten Arten zwei kleine, abgebrochene Röhre, wie Hörner, aus diesen tröpfelt ein durchsichtiger honigartiger Saft, nach welchen die Bienen und die Ameisen sehr begierig sind. Die Augen sind ganz.

Von diesem Genus giebt es viele Species, wovon fast jedes auf einer andern Pflanze vorkommt, als auf dem Ahorn, der Birke, der Ulme, der Rose, der Pappel, dem Hollunder, der Linde, der Weide, der Tanne der Johannistraube, dem Beifuß, dem Kohl, dem Pastinat, der Seerose etc. *)

In den Gewächshäusern bei Rosentreibereien und überhaupt bei Topfpflanzen, ist dies Insekt leicht zu vertreiben. Man stellt die Töpfe zusammen in ein Haus, und macht einen starken Rauch von Tabaksblättern, wornach sie schnell sterben. Die beschmutzten Blätter können nicht anders als mit frischem Wasser gereinigt werden. Bei Rosen, Stachel- und Johannisbeeren, welche beide letztere zuweilen von *Phalaena geometra grossulariae*. Fabricii. (Stachelbeerraupe) heimgesucht werden, hilft das Bespritzen mit Seifensiederlauge. Weil

*) Die Vermehrung der *Aphis* (Blattläuse) ist sehr groß, Bonnet, welcher diese Thiere genau beobachtet hat, erhielt in 3 Monaten neun sich folgende Generationen. Siehe des Ritter von Cuvier Thierreich aus dem Französischen übersetzt von H. R. Schinz III. Bd. pag. 602.

dieser Schmetterling seine Eier in die Erde an obige Pflanzen legt, ist fleisiges Behaken und reine halten des Bodens das beste Mittel, sie zu zerstören.

Zuweilen findet sich eins dieser lästigen Species von schwarzer oder grüner Farbe bei der Mistbeettreiberei, besonders in den Gurkenbeeten, bemerkt man dieses, so säume man nicht, sie sorgfältig wegzulesen. Haben sie aber mehrere Tage lang ihr Wesen getrieben, besonders jene von schwarzer Farbe, so rathe ich den ganzen Kasten sammt den Pflanzen und der Erde, von dem Mistbeetplatz zu entfernen, und Jahrelang nicht wieder zu gebrauchen.

Der C a n k e r (*Acarus tellarius* Lin.) eine Art Milbe, ist ebenfalls ein gefährliches Insekt für Gewächshäuser, und für Pflanzen im Freien, nur daß es in den Gewächshäusern und in den Mistbeeten durch die Wärme sich weit schneller vermehrt. In den Gewächshäusern findet man es häufig auf dem Caffee-Baum, auf mehrere Arten *Ficus*, *Hibiscus*, *Gardenia*, *Sida* etc. in den Mistbeeten wie im Freien, auf den Bohnen, Melonen und häufig in Annanashäuser, und bei der Obsttreiberei. Fleisiges Waschen, Luft geben, öfteres Bespritzen mit frischem Brunnenwasser, sind die mir bekannten Mittel, welche helfen; hat aber dieses Uebel, wie ich mich dieses Falles an einigen Orten in Norddeutschland erinnere, so überhand genommen, daß diese Mittel nicht mehr helfen, so bleibt nichts anders übrig, als die angesteckten Pflanzen wegzuwerfen, und das Gewächshaus Jahr und Tage lang leer stehen zu lassen, die Wände des Frühjahrs und des Sommers mehreremal mit gutem Kalk, dem etwas Kochsalz beigemischt wird, zu weiseln, und sämtliches Holzwerk mit Oelfarbe anzustreichen.

Der Mehlthau (*Mucor Erysiphe* Lin.) ist eine Art Schimmel, der die Pflanzenblätter im Freien überzieht.

Man findet ihn öfters auf Weiden, Hopfen, Hasseln, und seit einigen Jahren im hiesigen botanischen Garten auf der Italiänischen (*Clematis viticella*) und der scharfen Waldrebe (*Clematis flammula*) doch nur an einer Stelle. Sonderbar fand ich es, daß die gefüllte Italiänische Waldrebe, die nur 50 bis 60 Fuß davon entfernt steht, bisher nicht befallen worden ist.

Alle möglichst angewandten Mittel gegen dieses Uebel waren fruchtlos. Ich habe die Pflanzen, sobald ich nur irgend diese Krankheit bemerkte am Boden abgeschnitten, allein das folgende Jahr wurden sie dennoch wieder befallen.

Geographische Lage und Witterung des hiesigen botanischen Gartens.

Ausser dem, was über die Erdarten etc. gesagt wurde, hat auf die Pflanzen-Cultur die geographische Lage und die Witterung einen bedeutenden Einfluss. Oft giebt es Pflanzen, die in ein und demselben Garten, an der einen Stelle, die mehr oder weniger dem Zug der Winde ausgesetzt ist, im strengen Winter leiden, während sie an andern der Pflanze mehr angemessenen Stellen ohne alle Dekung sehr gut gedeihen: so z. B. *Phillyreen*, *Prunus lusitanica*, *Rhamnus alaternus* R. *latifolius*, *Jasminum revolutum*, *Päonia arborea*, *Viburnum Tinus* etc.

Um zur Erleichterung der Acclimatisirung an meinem Theil auch etwas beizutragen, füge ich hier eine Tabelle bei, woraus von Carlsruhe und einigen andern Orten mit bedeutenden botanischen Gärten die geographische Lage, die Höhe über dem Meer, die mittlere Sommer- und die mittlere Wintertemperatur, etc. zu ersehen ist.

Obgleich Carlsruhe 137 Fufs höher als Paris liegt, und in seiner Länge und Breite etwas abweicht, und obgleich die nahen Gebirge die Vogesen und der Schwarzwald, so wie der Rhein, oft grosse Kälte umher ver-

breiten; so fand ich doch den Unterschied nicht so groß, die Pflanzen, welche ich dort von bedeutender Größe im Freien gefunden habe, auch hier anzupflanzen; nur dürfte vielleicht der bessere Boden und Standort die Ursache sein, daß z. B. Pinus Cedrus, dort besser gedeihen, als bei uns, wo der Boden sehr sandig und flach ist. *)

Auffallend fand ich den Unterschied im Fortkommen fremder Pflanzen zwischen Wien und Berlin. Obschon Wien zwar höher, aber doch bedeutend südlicher liegt, als Berlin, und vollkommen zum Weinbau, den ich als Maasstab für einen gewissen Grad von Kälte annehme, geeignet ist; so werden doch dort die Rhododendron, Azaleen, Kalmien, Andromeden, mehrere Arten Magnolien, Anona etc. (Brom an der Leytha ausgenommen) nicht gepflanzt, die dagegen in Berlin im Freien gut fortkommen. Ob die dominirenden heftigen Ostwinde, die nahe der Schneeberge, das Wasser, oder der viele Salpeter den die Erde enthalten soll die Ursachen sind, wage ich nicht zu bestimmen. Die herrschenden Winde in Karlsruhe, sind Westwinde, selten stellen sich Nord- oder Ostwinde ein, welche ohnedies durch den die Stadt von diesen zwei Seiten umgebenden Wald nicht so heftig, wie an vielen andern Orten, auf Karlsruhe wirken können.

*) 1734 pflanzte Bernard de Jussieu, Professor der Botanik daselbst im Beisein seiner Zuhörer die jetzt so große Ceder vom Libanon. Bei Bestürmung der Bastille 1789 traf diesen schönen Baum eine Kanonenkugel, welche ihm den Gipfel wegnahm.

O r t e.	Geographische Länge.	Geographische Breite.	Höhe über dem Meere.	Mittlere Jahrestempe- ratur.	Mittlere Sommerwärme in den Monaten Juni, July und August.	Mittlere Winterkälte in den Monaten Dezember, Jan. u. Februar.	Gröste Sommerhitze im Jahr 1822.	Gröste Winterkälte von 1822 auf 1823.
Carlsruhe.	25°. 57'.	49°. 2'.	361'.	8, 5 Gr.	14, 8 Gr.	+ 1, 2 Gr.	27, 2 Gr.	— 10, 2 Gr.
Paris.	20°. 0'.	48°. 50'.	224'.	8, 5 Gr.	14, 5 Gr.	+ 2, 9 Gr.	27, 0 Gr.	— 11, 7 Gr.
London.	17°. 35'.	51°. 31'.	162'.	8, 8 Gr.	13, 1 Gr.	+ 3, 1 Gr.	23, 6 Gr.	— 6, 7 Gr.
München.	29°. 10'.	48°. 10'.	1658'.	7, 2 Gr.	15, 0 Gr.	— 0, 8 Gr.	25, 2 Gr.	— 16, 0 Gr.
Weimar.	29°. 0'.	50°. 59'.	650'.	7, 1 Gr.	14, 1 Gr.	+ 0, 7 Gr.	25, 2 Gr.	— 23, 0 Gr.
Wien.	34°. 2'.	48°. 13'.	480'.	8, 3 Gr.	16, 6 Gr.	+ 0, 3 Gr.	26, 1 Gr.	— 14, 1 Gr.
Berlin.	31°. 2'.	52°. 31'.	123'.	7, 3 Gr.	14, 8 Gr.	— 1, 4 Gr.	25, 0 Gr.	— 24, 0 Gr.
Göttingen.	27°. 36'.	51°. 31'.	447'.	7, 5 Gr.	14, 5 Gr.	— 0, 3 Gr.	23, 5 Gr.	— 24, 0 Gr.
Petersburg.	47°. 59'.	59°. 56'.	Wenige Fufse.	3, 0 Gr.	12, 8 Gr.	— 7, 2 Gr.	23, 3 Gr.	— 29, 5 Gr.

Nach 20jährigem Durchschnitt werden in Carlsruhe gezählt:

- 22. Tage ohne alles Gewölk.
- 84. heitere Tage.
- 50. ganz bedeckte Tage.
- 36. meist trübe Tage, und
- 173. vermischte Tage.

Ferner:

- 146. Tage mit Regen.
- 26. — — Schnee.
- 9. — — Schlossen und Graupeln.*)
- 24. nahe und ferne Gewitter.
- 18. Tage mit Sturm.
- 70. — — Wind.
- 8. — — dickem Nebel.
- 24. — — mehr oder weniger dänstiger Luft.
- 58. — — Eis, und ausser diesen noch
- 40. — — Reifen.

Die Mehrzahl der Tage kommt daher, weil es an einem Tag Regnen, Schneien, Frieren und dabey windig sein kann.

Sommertage, oder Tage vom Frühlings- bis Herbstäquinoktium:

- 10. frostige Tage (mittlere Temperatur unter $+ 5$ Gr.)
- 31. kühle Tage (— — — 5 bis $9, 9$ Gr.)
- 90. gemässigte Tage (— — — 10 bis $14, 9$ Gr.)
- 51. warme Tage (— — — 15 bis $19, 9$ Gr.)
- 3. heisse Tage (— — — 20 Gr. und darüber)

Wintertage, oder Tage vom Herbst- bis Frühlingsäquinoktium:

- 68. laue Tage (mittlere Temperatur $+ 5$ Gr. und darüber.)
- 76. gelinde Tage (— — — $+ 4, 9$ bis 0 Gr.)
- 29. gemässigte Tage (— — — 0 , bis 5 Gr.)
- 6. kalte Tage (— — — $5, 1$. bis 10 Gr.)
- 1. strenger Tag (— — — $10, 1$ Gr. und darunter.)

Anmerkung.

Ein frostiger Sommertag ist gleich einem gelinden Wintertag und ein kühler Sommertag gleich einem lauen Wintertag.

*) Innerhalb 20. Jahren gab es hier nur einmal Schlossen welche einige 40. Mistbeet-Scheiben zerschlugen.

Etwas über den Gang der Vegetation in C a r l s r u h e.

N^{ro.} 2.

J a h r.	Erste Frühlings- blumen in der Blüthe.	Abricosen in der Blüthe.	Wald ganz grün.	Erste reife Kirschen auf dem Markte.	Reben in voller Blüthe.	Korn reif, Anfang der Erndte.	Erste reife Trauben.	Wald entlaubt sich allmählich.
1806.	Febr. 20.	März 15.	May 6.	Juny 5.	Juny 18.	July 12.	August 5.	Oct. 18.
1807.	April 6.	April 12.	April 30.	May 23.	Juny 16.	July 8.	July 28.	Oct. 26.
1808.	— 5.	— 8.	May 4.	— 30.	— 14.	— 11.	August 1.	— 8.
1809.	Febr. 16.	März 21.	— 10.	Juny 11.	— 25.	— 19.	— 9.	— 10.
1810.	März 10.	— 18.	— 2.	— 10.	— 23.	— 14.	— 4.	— 16.
1811.	— 6.	— 14.	April 24.	May 18.	— 1.	Juny 28.	July 20.	Nov. 10.
1812.	— 24.	April 1.	May 3.	— 31.	— 15.	July 10.	August 9.	Oct. 26.
1813.	Febr. 28.	März 20.	April 15.	— 18.	— 12.	— 6.	— 6.	— 18.
1814.	März 22.	— 30.	— 20.	— 27.	— 15.	— 6.	— 3.	— 11.
1815.	Febr. 25.	— 6.	— 3.	— 14.	— 5.	— 4.	— 1.	— 23.
1816.	April 1.	April 9.	— 28.	Juny 12.	July 20.	— 25.	Sept. 10.	— 24.
1817.	Febr. 20.	— 6.	May 8.	— 10.	Juny 20.	— 8.	Aug. 16.	— 7.
1818.	März 8.	März 30.	April 27.	May 27.	— 12.	— 4.	— 1.	— 13.
1819.	Febr. 26.	— 28.	— 18.	— 20.	— 3.	— 3.	July 25.	— 16.
1820.	März 23.	— 30.	— 20.	— 20.	— 12.	— 10.	Aug. 10.	— 12.
1821.	— 10.	— 28.	— 26.	Juny 5.	— 20.	— 18.	— 15.	— 18.
1822.	Febr. 8.	Febr. 25.	— 14.	May 8.	May 25.	Juny 20.	Juny 30.	Nov. 6.
1823.	März 15.	März 25.	May 8.	— 27.	Juny 14.	July 11.	Aug. 6.	Oct. 15.
1824.	Febr. 14.	— 28.	April 30.	Juny 1.	— 23.	— 10.	— 5.	Nov. 10.
S								

Nota. Die Erklärung der Abbreviaturen habe ich weggelassen. Der Botaniker bedarf sie nicht, und der bloße Liebhaber hat kein Interesse dafür. Zur Bezeichnung der Varietäten habe ich mich statt der griechischen, lateinischer Lettern bedient.

Die Dauer und den Standort der hiesigen Pflanzen habe ich mit folgenden gewöhnlichen Zeichen bemerkt :

⊙. einjährig.

♂. zweijährig.

⌘. ausdauernd.

h. Baum oder Strauch.

W. H. Warmes Haus, bei solchen, welche im Winter 10 — 11 Grad Wärme nach Reaumur erfordern.

C. H. Cap Haus, welche im Winter 5 — 6 Grad Wärme erfordern.

Fr. im Freien, welche das ganze Jahr im Freien bleiben.

The first of these is the fact that the
... ..
... ..
... ..
... ..

The second is the fact that the
... ..
... ..

...

...

...

...

The third is the fact that the
... ..
... ..
... ..

The fourth is the fact that the
... ..
... ..

The fifth is the fact that the
... ..
... ..



A.

A b r o m a.

A b r o m e.

1. Augusta Pers. $\frac{1}{2}$. prächtige. w. H.

A. Fastuosum Jacq.

Theobroma augusta. L. syst.

A b r u s.

P a t e r n o s t e r e r b s e.

1. precatorius. L. $\frac{1}{2}$. gemeine. w. H.

Glycine Abrus. L.

A c a c i a.

A c a c i e.

1. acanthocarpa W. En. $\frac{1}{2}$. stachelfrüchtige. w. H.

Mimosa aculeatocarpa Hortul.

2. alata R. Br. $\frac{1}{2}$. geflügelte. C. H.

Angustisiliqua vid. *Desmanthus*.

3. arborea. L. $\frac{1}{2}$. baumartige. C. H.

Mimosa filicifolia Lam.

4. armata R. Br. $\frac{1}{2}$. stacheliche. C. H.

5. Catechu W. $\frac{1}{2}$. Katechu. C. H.

Mim. Catechu L.

6. ceratonia W. $\frac{1}{2}$. gehörnte. w. H.

Mim. ceratonia. L.

7. ciliata H. et B. gefranzte. C. H.

A. Browniana Wendl.

8. cornigera W. $\frac{1}{2}$. hörnertragende w. H.

9. crassiuscula Wendl. $\frac{1}{2}$. dickblättrige. C. H.

10. decipiens. R. Br. $\frac{1}{2}$. täuschende. C. H.

Adiantum truncatum L.

11. decurrens W. En. $\frac{1}{2}$. herablaufende. C. H.

12. dodoneifolia W. En. $\frac{1}{2}$. klebrige. C. H.

A. viscosa Wendl.

13. eburnea W. $\frac{1}{2}$. weisstachelige. w. H.

M. eburnea L.

14. ensifolia? . . . degenblättrige. C. H.

15. falcata W. En. $\frac{1}{2}$. sichelförmige. C. H.

A. obliqua Wendl.

Acacia.

Acacie.

16. farnesiana W. En. h. farnesische. C. H.
Mimosa farnesiana L.
17. floribunda W. En. h. vielblumige C. H.
18. — b. latifolia. h. — m. breit. Blät. C. H.
foetida vid. *Inga*.
19. geniculata Wendl. h. gegliederte w. H.
20. glandulosa W. En. h. drüsige C. H.
21. Glauca W. En. h. graue w. H.
Mimosa glauca L.
22. heterophylla W. h. verschiedenblättrige. C. H.
23. horrida W. h. fürchterliche w. H.
Mimosa leucantha Jacq.
24. Houstoni W. h. houstonische w. H.
25. Julibrissin W. En. h. orientalische C. H.
26. Juniperina W. h. wachholderblättrige C. H.
Mimosa ulicina Wendl.
27. latisiliqua W. breitschotige w. H.
Mimosa latisiliqua L.
28. Lebbek W. Lebbekische w. H.
Mimosa Lebbek. L.
29. linifolia W. h. leinblättrige C. H.
30. longifolia W. En. h. langblättrige C. H.
31. — b. brevifolia h. mit kurzen Blättern C. H.
32. — c. latifolia h. mit breiten Blättern C. H.
33. lophanta W. h. buschelblüthige C. H.
Mimosa distachya Vent.
— *elegans* Andr.
34. — b. compacta h. mit gedrängten Blät. C. H.
35. marginata R. Br. h. geränderte. C. H.
36. melanoxylon Ait. h. schwarzrindige. C. H.
37. microphylla W. h. kleinblättrige. C. H.
Mimosa parvifolia Poir.
38. myrtifolia W. h. myrtenblättrige. C. H.
Mimosa myrtifolia Smith.
39. nigricans R. Br. h. rautenblättrige. C. H.
Mimosa rutaefolia Labill.
40. pedunculata W. h. gestielte. C. H.
41. pennata W. h. federförmige w. H.
Mimosa pennata L.
42. portoricensis W. h. portoricosche w. H.
Mimosa portoricensis Jacq.
43. pterocarpa Lam. h. flügelfrüchtige C. H.

Acacia. Acacie.

- 44. pulchella R. Br. h. schöne C. H.
- 45. rhombifolia Pers. h. rautenblättrige. w. H.
- 46. scandens W. h. kletternde. w. H.

Mimosa Entada L.

- 47. sericea Roxb. h. serissenblättrige w. H.
- 48. Sophorae Ait. h. sophorenblättrige C. H.
- 49. stipulacea Wendl. h. asterblättrige w. H.
- 50. stricta W. En. h. steif blättrige C. H.

Mimosa stricta Pers.

- 51. suaveolens W. En. h. wohlriechende C. H.
- 52. tamarindifolia W. h. tamarindenblättrige w. H.

Mimosa tamarindifolia L.

- 53. taxifolia W. h. taxblättrige C. H.

Mimosa ternata Pers.

— *stellata* Lour.

- 54. tenella H. Par. h. feinblättrige C. H.
- 55. tetragona W. h. viereckige w. H.

Mimosa quadrangularis Poir.

- 56. uncinella Poir. h. hackenförmige w. H.
- 57. undulata W. En. h. wellenblättrige C. H.
- 58. vera W. h. aechte w. H.

Mimosa nilotica Desf.

- 59. verticillata W. En. h. wirtelblättrige C. H.

virgata. vid. Desmanthus.

Acaena. Acaena.

- 1. adscendens. Vahl. 4. aufwärtssteigende C. H.
- 2. sericea Jacq. fil. 4. seidenartige C. H.

Acalypha. Brennkraut.

- 1. alopecuroides W. ☉. fuchsschwanzähnliches Fr.
- 2. caroliniana Walt. ☉. carolinisches Fr.
- 3. cuspidata Jacq. h. zugespitztes w. H.
- 4. diversifolia Jacq. h. verschiedenblättriges w. H.
- 5. rubra W. 4. rothes C. H.
- 6. scabrosa Sw. h. rauhblättriges w. H.
- 7. virgata L. h. ruthenförmiges w. H.
- 8. virginica L. ☉. virginisches Fr.

Acanthus. Baerenklau.

- 1. carduiifolius W. 4. distelblättrige Fr.
- 2. mollis L. 4. weichblättrige Fr.
- 3. — b. nigra Mill 4. schwarze Fr.
- 4. spinosissimus Desf. 4. vielstachelige Fr.
- 5. spinosus. L. 4. stachelige Fr.

A c a r n a.

A c a r n e.

1. cancellata W. ☉. gegitterte Fr.
Atractylis cancellata L.
2. gumifera W. 4. gummitragende Fr.
Atractylis gumifera L.

A c e r.

A h o r n.

1. barbatum. Mich. h. bartiger Fr. ;
2. campestre L. h. Feldahorn Fr.
3. — b. foliis variegatis. buntblättriger Fr.
4. — c. austriacum Tratt. h. österreicher. Fr.
5. creticum L. h. cretischer Fr.
6. dasycarpum Ehrh. h. rauher Fr.
A. eriocarpum Mich.
A. rubrum Wangenh.
7. heterophyllum W. En. h. verschiedenblättrig. Fr.
A. sempervirens L.
8. hybridum Bosc. h. Bastard Fr.
A. lobatum Fisch.
9. macrophyllum Pursch. h. großblättriger Fr.
10. monspessulanum L. h. französischer Fr.
A. trifolium Bauh.
11. Negundo L. h. eschenblättriger Fr.
Negundo aceroides Moench.
12. nigrum Mich. h. schwarzer Fr.
13. obtusatum W. et R. h. stumpfblättriger Fr.
14. Opalus Lam. h. italienischer Fr.
15. opulifolium Desf. H. Par. h. schneeballbltgr. Fr.
16. pensylvanicum L. h. gestreifter Fr.
A. striatum Duroi.
A. canadense Marsh.
17. platanoides L. h. spitzblättriger Fr.
18. — b. laciniatum Ait. m. zerschlizt. Bltrn. Fr.
19. — c. foliis varieg. — mit bunten Blättern Fr.
20. Pseudo-platanus L. h. weißer Fr.
21. — — foliis varieg. mit bunt. Blättern Fr.
22. rubrum L. h. rother. Fr.
23. — b. pallidum. Fr. h.
A. virginianum Pluk.
24. saccharinum L. h. Zucker Fr.
25. spicatum Lam. h. Berg. Fr.
A. montanum Ait.
A. parviflorum Ehrh.
A. pensylvanicum Duroi.
26. tataricum L. h. tartarischer Fr.

Achania. Tuttenmalve.

1. Malvaviscus Ait. ʒ. baumartige w. H.
Hibiscus malvaviscus L.
2. mollis Ait. ʒ. weiche w. H.

Achillea. Schaafgarbe.

1. aegyptiaca L. ʒ. ägyptische Fr.
2. — b. flore albo. weisse Fr.
3. Ageratum L. ʒ. gewürzhafte Fr.
4. alpina L. ʒ. Alpen Fr.
A. cristata W.
5. anthemoides W. ʒ. chamillenartige Fr.
A. santolina Hortul.
6. asplenifolia. Vent. ʒ. strichfarnblättrige Fr.
7. atrata L. ʒ. schwarzkelchige Fr.
8. aurea Lam. ʒ. goldfarbene Fr.
9. Clavennae L. ʒ. Bittere Fr.
10. compacta W. ʒ. strahllose Fr.
11. coronopifolia W. ʒ. schlizblättrige Fr.
12. crithmifolia W. et K. ʒ. Bacillenblättrige Fr.
13. decolorans Schrad. ʒ. zerbrechliche Fr.
A. fragilis. Hortul.
14. Eupatorium M. B. ʒ. caspische Fr.
15. grandiflora M. B. ʒ. großblumige Fr.
16. impatiens L. ʒ. sibirische Fr.
17. lanata Spr. ʒ. wollige Fr.
18. leptophylla M. B. ʒ. afrikanische Fr.
19. ligustica All. ʒ. ligurische Fr.
20. longifolia H. Vindeb. ʒ. langblättrige Fr.
21. magna L. ʒ. große Fr.
22. millefolium L. ʒ. Schaafgarbe Fr.
23. — b. flore purpureo. rothblühende Fr.
24. mongolica Fisch. ʒ. mongolische Fr.
25. moschata Jacq. ʒ. Bisam Fr.
26. microphylla W. ʒ. kleinblättrige Fr.
A. pectinata Lam.
27. myriophylla W. En. ʒ. stabwurzblättrige Fr.
A. abrotanifolia Hortul.
28. nana L. ʒ. zwerg Fr.
29. nobilis W. ʒ. edle Fr.
30. ochroleuca W. et. K. ʒ. blafsgelbe Fr.
A. pectinata W.
31. ptarmica L. ʒ. weisser Dorant Fr.
— b. flore pleno. gefüllter Fr.

Achillea. Schaa fgarbe.

- 32. serrata Retz. 4. gesägte Fr.
- 33. setacea W. et K. 4. borstenblättrige Fr.
- 34. speciosa Spr. 4. prächtige Fr.
A. biserrata M. B.
- 35. tanacetifolia All. 4. wurmkrautblättrige Fr.
- 36. tenuifolia W. 4. dünnblättrige Fr.
A. santolina Lam.
- 37. tomentosa L. 4. filzige Fr.
- 38. velutina Desf. 4. samtblättrige Fr.

Achimenes vid. **Trevirana.**

Achras. Breyapfel.

- 1. mammosa L. 4. brüstenförmiger w. H.
A. zapota major Jacq.
- 2. Sapota W. 4. gemeiner. w. H.

Achyranthes. Spreublume.

- 1. argentea Lam. 4. weißliche w. H.
A. sicular Roth.
- 2. aspera L. 4. scharfe w. H.
A. indica Roth.
A. obtusaefolia Lam.
- 3. lapacea W. 4. klettenartige w. H.
- 4. muricata W. 4. feinstachliche w. H.
- 5. porrigens Jacq. 4. ausgebreitete w. H.
Celosia elongata Spr.
- 6. virgata Desf. 4. ruthenförmige w. H.
Celosia virgata Pers.

Acollanthes. Acollanthes.

- 1. suavis H. Monac. ☉. wohlriechende w. H.

Aconitum. Eisenhut.

- 1. album Ait. 4. weißer Fr.
A. orientale Mill.
- 2. altissimum Mill. 4. höchster Fr.
- 3. angustifolium Bernh. 4. schmalblättriger Fr.
- 4. Anthora L. 4. feinblättriger Fr.
- 5. australe Reichb. 4. südlicher Fr.
- 6. barbatum Pers. 4. bartiger Fr.
- 7. Breiterianum Reichb. 4. Breiterischer Fr.
- 8. Camarum L. 4. langhelmiger Fr.
- 9. cernuum W. 4. hängender Fr.

Aconitum. Eisenhut.

10. exaltatum Bernh. 4. hoher Fr.
11. Koehleri Reichb. 4. Koehlerischer Fr.
12. Lycoctonum L. 4. Wolfs Fr.
13. medium. Schrad. 4. mittlerer Fr.
14. Napellus L. 4. wahrer Fr.
15. ochroleucum W. En. 4. gelbweiser Fr.
16. paniculatum Lam. 4. rispenblüthiger Fr.
17. pyramidale Mill. 4. pyramidenförmiger Fr.
18. pyrenaicum L. 4. pyrenäischer Fr.

A. squarrosum Dec.

19. rostratum Bernh. 4. schnabelförmiger Fr.
20. septentrionale W. 4. nördlicher Fr.
21. strictum Bernh. 4. aufrechter Fr.
22. tauricum Wulf. 4. taurischer Fr.
23. tortuosum W. En. 4. gedrehter Fr.
24. uncinatum L. 4. hakenförmiger Fr.
25. variegatum L. 4. bunter Fr.
26. venustum Reichb. 4. schöner Fr.
27. volubile Koell. 4. windender Fr.
28. Vulparia Reichb. 4. vulparischer Fr.
29. Wildenowii Reichb. 4. Wildenowischer Fr.

Acorus. Calmus.

1. Calamus L. 4. wahrer Fr.
2. gramineus W. 4. grasartiger Fr.

Acrostichum. Staubfarn.

1. alcicorne Sw. 4. elennhornförmiger w. H.

A. bifurcatum Cav.

2. aureum L. 4. goldener w. H.
3. calomelanos L. 4. schwarzstrunkiger w. H.
4. chrysophyllum Sw. 4. goldblättriger w. H.
5. lanuginosum Delill. 4. wolliger w. H.

Cetrach lanuginosum. Sieb.

6. Marantae L. 4. schuppiger Fr.
7. septentrionale L. 4. mittägiger Fr.

Actea. Christophskraut.

palmata vid. *Hydrastis*.

1. racemosa L. 4. traubenförmiges Fr.
2. rubra W. 4. rothblühendes Fr.
3. spicata L. 4. ährentragendes Fr.

Adansonia. Affenbrodbaum.

1. digitata L. 5. gefingerter w. H.

Adelia. Adolie.

1. Acidoton L. †. dornige C. H.
Acidoton frutescens R. Br.
acuminata vid. Borya.
2. myrtifolia H. Cels. myrtenblättrige C. H.
3. ovata Pers. †. eyrunde C. H.

Adenandra. Drüsenträger.

1. umbellata W. †. doldenblüthiger C. H.
Diosma umbellata Hortul.
2. uniflora W. †. einblumiger C. H.
Diosma uniflora L.

Adenantha. Drüsenblume.

1. pavonia L. †. glattblättrige C. H.

Adiantum. Krullfarn.

1. capillus veneris L. ‡. Frauenhaar w. H.
2. pedatum L. ‡. fufsförmiger Fr.
3. reniforme L. ‡. nierenförmiger w. H.

Adonis. Adonis.

1. aestivalis L. ☉. Sommer Fr.
A. miniata Jacq.
2. autumnalis L. ☉. Herbst Fr.
capensis vid. Knowltonia.
3. flammea Jacq. ☉. brennendrothes Fr.
4. vernalis L. ‡. Frühlings Fr.

Adoxa. Bisamkraut.

1. moschatellina L. ‡. gemeines Fr.

Aegilops. Walch.

1. cylindrica W. ☉. walzenförmiger Fr.
2. ovata L. ☉. eyrunder Fr.
3. squarrosa L. ☉. sparriger Fr.
4. triuncialis L. ☉. dreyzölliger Fr.

Aegiphila. Ziegenstrauch.

1. martinicensis Pers. †. martinikischer w. H.

Aegopodium. Giersch.

1. podagraria L. ☉. gemeiner Fr.
Sison Podagraria.

Aeschynomene. Schampflanze.

1. americana W. En. ☉. amerikanische w. H.
2. aspera W. ☉. scharfstielige w. H.
3. pumila L. ☉. kleine. w. H.
sesban vid. Sesbania.

Aesculus. Rofskastanie.

1. flava W. ☿. gelbe Fr.
A. lutea Wangelh.
2. Hippocastanum L. ☿. gemeine Rofskastanie Fr.
3. — b. foliis variegatis ☿. buntblättrg. Fr.
4. hybrida Dec. ☿. Bastard. Fr.
5. macrostachys Mich. ☿. langährige Fr.
A. parviflora Walt.
6. ohioensis Mich. ☿. Roskastanie von Ohio Fr.
7. pallida W. En. ☿. gelbliche Fr.
8. pavia L. ☿. rothe Fr.
9. rubicunda. Dec. Herb. amat. ☿. scharlachrothe Fr.
A. carnea. Hortul.

Aethusa. Gleifs.

1. Ammi Spr. ☉. kleines Fr.
Sison Ammi L.
2. Cynapium L. ☉. Garten Fr.
3. Cynapioides M. B. ☉. petersilienblättriges Fr.
4. elata. Fisch. ☉. hohes Fr.

Afelia. Afzelie.

1. grandis n. sp. ☿. großblumige w. H.

Agapanthus. Schmücklilie.

1. praecox W. En. 4. frühblühende C. H.
2. umbellatus Herit. 4. doldenblüthige C. H.
Crinum africanum L.
Mauhlia linearis Thunb.
3. — b. flore albo. weißblühende C. H.
4. — c. foliis variegatis. buntblättrige C. H.

Agathosma. Agathosme.

1. acuminata W. E. ☿. zugespitzte C. H.
Bucco acuminata Wendl.

Agathosma. Agathosme.

2. bruniioides Wendl. h. brunienähnliche C. H.
Diosma bruniioides Nois.
3. imbricatum W. En. h. dachziegelblättrige C. H.
Bucco imbricata Wendl.
Diosma imbricata L.
4. laxa Wendl. h. schlaffe C. H.
5. obtusata Dietr. h. stumpfblättrige C. H.
Bucco obtusata Wendl.
Diosma obtusata Thunb.
6. patula Wendl. h. ausgebreitete C. H.
7. pubescens W. En. h. filzige C. H.
Diosma pubescens L.
8. villosum W. En. h. haarige C. H.
Bucco villosa Wendl.
Diosma villosa L.

Agave. Agave.

1. americana W. 4. amerikanische C. H.
2. — b. foliis marg. luteis 4. gelbgerandt. C. H.
3. — c. fol. luteis viride margt. 4. grüngdt. C. H.
4. — d. fol. viridib. luteo striatis 4. gelbgst. C. H.
5. angustifolia Haw. 4. schmalblättrige C. H.
6. foetida L. 4. übelriechende w. H.
Furcraea gigantea Vent.
geminiflora vid. Littaea.
7. lurida Jacq. 4. bleifarbig w. H.
A. vera crux Mill. 4.
8. mexicana Salm 4. mexikanische w. H.
9. tuberosa Ait. 4. knollige w. H.
10. virginica L. 4. virginische w. H.
11. vivipara Haw. 4. lebendigbringende w. H.
12. yuccaefolia W. En. Supl. 4. yuccablättrige w. H.

Ageratum. Ageratum.

1. album W. ☉. weisses Fr.
A. hirtum Lam.
2. conyzoides L. ☉. dürrwurzelartiges Fr.
3. latifolium Cav. ☉. breitblättriges Fr.
4. paniculatum Schrad. ☉. rispenblüthiges Fr.

Agrimonia. Odermennig.

1. Eupatoria L. 4. gemeiner Fr.
2. odorata Ait. 4. wohlriechender Fr.
3. repens L. 4. kriechender Fr.

Agrostemma. Rade.

1. Coeli rosa L. ☉. glattblättrige. Fr.
Lychnis coelirosa Lam.
2. coronaria L. ♂. Garten. Fr.
3. — b. floribus rubr. plenis. mit rothgefüllten Blum. Fr.
4. Flos jovis L. ♀. doldentraubige. Fr.
5. Githago L. ☉. gemeine. Fr.

Agrostis. Windhalm.

1. alba L. ♀. weißer. Fr.
A. coarctata Hoffm.
2. diffusa Host. ♀. verworrener. Fr.
3. filiformis W. En. ♀. fadenförmiger. Fr.
Cinna filiformis L.
4. interrupta W. En. ☉. unterbrochener. Fr.
5. mexicana W. En. ♀. mexikanischer. Fr.
6. Spica venti L. ☉. gewöhnlicher. Fr.
7. stolonifera L. ♀. wuchernder. Fr.
8. tenacissima W. En. ♀. dünner. Fr.
Sporobolus tenacissimus R. Br.

Ailanthus. Götterbaum.

1. glandulosa Desf. ♂. drüsiger. Fr.
Rhus Coccodendrum Erh.
— *hypselodendrum* Moench.
— *canadense* Mill.

Aira. Schmiele.

1. aquatica L. ♀. Wasserschmiele. Fr.
Catabrosia aquatica R. et S.
2. arundinacea L. ♀. schilfartige. Fr.
3. Bottnica Wahlenb. ♀. Bottnische. Fr.
4. caespitosa L. ♀. rasenbildende. Fr.
Deschampsia caespitosa R. et S.
5. canescens W. En. ♀. gräulichte. Fr.
Corynephorus canescens R. et S.
6. caryophyllea L. ☉. nelkenartige. Fr.

Aira.

Schmiele.

7. flexuosa W. En. 4. niedergebogene. Fr.
8. involucrata W. En. Supl. ☉. Andornblättrige. Fr.
Aiopsis involucrata R. et S.
9. media Gouan. 4. mittlere. Fr.
Deschampsia media R. et S.
10. praecox L. ☉. frühblühende. Fr.

Aitonia.

Aitonie.

1. capensis L. fil. 5. capische. C. II.

Ajuga.

Ginsel.

1. alpina L. 4. Alpenginsel. Fr.
2. orientalis L. ☉. morgenländischer. Fr.
3. pyramidalis L. ♂. Pyramidenginsel. Fr.
4. reptans L. 4. kriechender. Fr.

Aizoon.

Immergrün.

1. canariense L. ☉. canarisches. Fr.
2. hispanicum L. ☉. spanisches. Fr.

Albua.

Stiftblume.

1. altissima Jacq. 4. höchste. C. H.
A. alba Lam.
2. coarctata Dryander. 4. gedrängtblättrige. C. H.
3. fragrans Pers. 4. wohlriechende. C. H.
4. setosa Jacq. 4. borstige. C. H.

Alcea vid. Althaea.

Alchemilla.

Frauenmantel.

1. Alpina L. 4. Alpenmantel. Fr.
A. argentea Lam.
2. montana W. En. 4. Berg. Fr.
A. hybrida. Mill.
3. pentaphylla L. 4. fünfblättriger. Fr.
4. vulgaris L. 4. gemeiner. Fr.

Aletris.

Aletris.

1. arborea W. 5. baumartige. w. H.
2. fragrans L. 5. wohlriechende. w. H.
Dracaena fragrans Ait.
capensis vid. Veltheimia.

Aleurites. Aleurites.

1. moluccana W. ♂. molukische w. H.

Alisma. Froschlöffel.

1. Plantago. L. 4. gemeiner Fr.
2. ranunculoides L. 4. ranunkelartiger Fr.

Allamanda. Allamande.

1. cathartica L. ♂. purgirende w. H.
Orelia grandiflora Aubl.
2. verticillata Desf. ♂. quirlförmige w. H.

Allium. Lauch.

1. acutangulum W. 4. scharfeckiger Fr.
2. acutum Spr. 4. eckiger Fr.
3. altaicum Pall. 4. altaischer Fr.
4. Ampeloprasum L. 4. breitblättriger Fr.
5. ascalonicum L. 4. Scharlottenlauch Fr.
6. arenarium L. 4. Sandlauch Fr.
7. baicalense W. 4. baikalischer Fr.
8. canadense L. 4. canadischer Fr.
9. carinatum L. 4. Getreide Fr.
10. Cepa L. 4. gemeiner oder Zwiebel Fr.
11. cernuum Roth. 4. hängender Fr.
12. Clusianum W. 4. clusischer Fr.
13. descendens L. 4. Ackerlauch Fr.
14. fistulosum L. 4. röhrenstieliger Fr.
15. foetidum M. B. 4. stinkender Fr.
16. flavum L. 4. gelber Fr.
17. fragrans Vent. 4. wohlriechender Fr.
18. globosum M. B. 4. kugelrunder Fr.
19. inodorum W. 4. geruchloser Fr.
20. lineare W. 4. linienförmiger Fr.
21. magicum L. 4. Zauberlauch Fr.
22. Moly. L. 4. goldfarbener Fr.
23. multibulbosum Jacq. 4. schwarzer Fr.
A. nigrum L.
24. nutans L. 4. hängender Fr.
25. obliquum L. 4. schiefblättriger Fr.
26. pallens W. et R. 4. blasser Fr.
27. paniculatum L. 4. rispenblüthiger Fr.
28. Porrum L. 4. gemeiner Fr.
29. sativum L. 4. starkkriechender Fr.

Allium. Lauch.

30. schoenoprasum L. 4. Suppenlauch Fr.
31. scorodoprasum L. 4. Rokenboll. Fr.
32. senescens. L. 4. grauwerdender Fr.
33. sphaerocephalum L. 4. rundköpfiger Fr.
34. striatum Jacq. 4. gestreifter Fr.
35. triquetrum Desf. 4. dreyeckiger Fr.
36. ursinum L. 4. Bärenlauch Fr.
37. Victoriale L. 4. netzwurzlicher Fr.
38. vineale L. 4. Ackerlauch Fr.

Alnus. Erle.

1. cordata Tenor. h. herzblättrige C. H.
2. crispa Pursch. h. krausblättrige Fr.
A. undulata W.
3. glutinosa W. En. h. gemeine Fr.
Betula alnus Lin.
4. — b. laciniata h. mit zerschlitzten Bltrn. Fr.
5. incana W. En. h. nordische Fr.
Betula incana Lin.
6. ovata Gm. fl. Bad. mit eyrunden Blättern Fr.
7. serrulata W. En. h. Hasselblättrige Fr.
Betula serrulata Ait.

Aloe. Aloe.

1. acinacifolia Jacq. h. säbelscheidenförmige w. H.
2. — b. angustifolia. mit schmalen Blät. w. H.
3. acuminata Haw. h. zugespitzte w. H.
4. angulata W. h. eckige w. H.
5. — b. unilateralis W. h. mit einseit. Bltrn. w. H.
6. — c. truncata W. h. m. abgestutzten do. w. H.
7. — d. striata h. mit gestreift. Blättern w. H.
8. arborescens Haw. h. baumartige w. H.
A. frutescens Pers.
9. atrovirens Haw. h. schwarzgrüne w. H.
10. attenuata Haw. h. verdünnte w. H.
Apicra attenuata W.
11. aspera Haw. h. rauhe w. H.
Apicra aspera W.
12. barbadensis Haw. h. gemeine w. H.
A. vulgaris W.
13. — b. elongata Murr. mit lang. Bltrn. w. H.
14. brevifolia Haw. W. et Dec. h. kurzblättrig. w. H.

Aloe:

Aloe.

15. Commelini W. h. comelinische w. H.
A. supralaevis Haw.
16. carinata Haw. h. hohlblättrige w. H.
17. caesia H. Dyk. h. meergrüne w. H.
18. — b. elatior H. Dyk h. höhere w. H.
19. conspurcata H. Dyk. h. beschmutzte w. H.
20. — b. unilateralis h. einseitige w. H.
21. cymbiformis Bot. Mag. h. kahnförmige w. H.
Apicra cymbaefolia W.
22. depressa Haw. h. niedergedrückte w. H.
23. echinata W. E. h. weichstacheliche w. H.
24. excavata W. h. ausgehöhlte w. H.
25. expansa Haw. h. ausgespannte w. H.
Apicra expansa W.
26. fasciata W. h. gestreifte w. H.
27. foliosa Haw. h. beblätterte w. H.
Apicra foliosa W.
28. frutescens H. Dyk. h. strauchartige w. H.
29. glabra Haw. glatte w. H.
30. glauca Haw. h. graugrüne w. H.
31. — b. elatior h. hohe w. H.
32. — c. humilior h. niedrigere w. H.
33. humilis Haw. h. niedrige w. H.
34. — b. incurva h. eingebogene w. H.
35. hybrida H. Dyk. h. Bastard w. H.
36. imbricata Haw. h. dachziegelblättrige w. H.
Apicra imbricata W.
- Aloe spiralis* Dec.
37. intermedia Haw. mittlere w. H.
38. — b. truncata. mit abgestutzten Bltrn. w. H.
39. latifolia Haw. h. breitblättrige w. H.
40. lacte virens Haw. h. angenehmgrüne w. H.
41. Aloe lineata Haw. h. linienförmige w. H.
42. lingua W. h. zungenblättrige w. H.
43. — b. verrucosa. mit warzigen Blättern w. H.
44. macra Haw. h. große w. H.
45. margaritifera W. h. Perlaloe w. H.
46. — b. major große Perlaloe w. H.
marginalis vid. Lomatophyllum.
47. mirabilis Haw. h. wunderbare w. H.
Apicra mirabilis W.
48. mitraeformis W. h. mützenförmige w. H.
A. distans Haw.

Aloe.

Aloe.

49. mucronata Haw. h. spitzige w. H.
50. nigricans Haw. W. schwärzliche w. H.
51. — b. denticulata gezähnte w. H.
52. nitida H. Dyk. h. glänzende w. H.
53. obliqua Haw. h. schiefblättrige w. H.
A. maculata W.
54. obscura W. h. dunkelfleckige w. H.
55. — b. unilateralis. mit einseitigen Blät. w. H.
56. — c. truncata. abgestutzten Blättern. w. H.
57. paniculata Jacq. h. rispenblüthige w. H.
A. striata Haw.
58. pentagona Haw. h. fünfeckige w. H.
Apicra pentagona W.
59. — b. spiralis Haw. H. Dyk. spiralfmg. w. H.
Apicra spiralis W.
60. picta Haw. Dec. h. bemahlte w. H.
plicatilis vid. Rhipidodendrum.
61. pseudo angulata H. Dyk. h. unächtekige w. H.
62. — b. nigricans H. Dyk. h. unächtschwarze w. H.
63. — c. rigida H. Dyk. h. unächtsteife w. H.
Apicra rigida W.
64. — d. tortuosa H. Dyk. h. unächtgedrehte w. H.
Apicra tortuosa W.
65. pulchra Haw. h. schöne w. H.]
A. obliqua Dec.
66. radula Haw. h. raspelblättrige w. H.
Apicra radula W.
67. Reinwardti H. Dyk. h. reinwardtische w. H.
68. reticulata Haw. h. netzförmige w. H.
Apicra reticulata W.
Aloe pumilio Jacq.
69. retusa Haw. h. abgestutzte w. H.
70. rhodacantha Pers. h. rosendornige w. H.
71. rigida Haw. h. steife w. H.
Apicra patula W.
72. semimargaritifera H. Dyk. halbgesägte w. H.
A. africana Comel.
73. serra Dec. h. sägenblättrige w. H.
74. spirella H. Dyk. h. feingewundene w. H.
75. subverrucosa H. Dyk. h. mit wenigen Warzen w. H.
76. succotrina Haw. et W. h. officinelle w. H.
77. tenuifolia W. h. dünnblättrige w. H.
78. tuberculata Haw. h. vertiefte w. H.

Aloc.

Aloc.

79. umbellata Haw. h. doldenblüthige. w. H.
80. — b. picta H. Dyck. h. mit bunten Blätt. w. H.
81. variegata Haw. h. bunte. w. H.
82. verrucosa Haw. h. warzige. w. H.
83. virens Haw. h. grüne. w. H.
84. viscosa Haw. h. klebrige. w. H.
vulgaris vid. barbadensis.
85. Xanthacantha W. h. spitzstachliche. w. H.

*)

Alopecurus.

Fuchsschwanz.

1. agrestis L. ☉. Acker. Fr.
2. geniculatus. W. En. 4. gegliederter. Fr.
3. pratensis L. 4. Wiesen. Fr.

Alpinia.

Alpinie.

1. spiralis Jacq. 4. spiralförmige. w. H.
Costus spiralis Rosc.

Alstroemeria.

Alstroemerie.

1. Ligta L. 4. rachenförmige. w. H.
2. Pelegrina L. 4. bunte. C. H.

Althaea.

Eibisch. (Althee)

1. cannabina L. 4. hanfblättriger. Fr.
2. ficifolia Cav. ♂. feigenblättriger. Fr.
Alcea ficifolia L.
3. hirsuta L. ☉. behaarter. Fr.
4. narbonensis L. 4. narbonischer. Fr.
5. officinalis L. 4. gemeiner. Fr.
6. rosea Cav. ♂. Stockrosen; (Malven) in viel. Farb. Fr.
Alcea rosea L.
7. — b. sinensis ♂. chinesische. Fr.

Alternanthera.

Wechselblume.

1. sessilis R. Br. 4. sitzende. w. H.
Illecebrum sessile L.
Paronichia sessilis Desf.
2. spinosa R. et Sch. 4. stachliche w. H.
Achyranthes spinosa Horn.

*) Diese herrliche Sammlung Aloc, so wie den größten Theil der übrigen succulenten Pflanzen, hat der hiesige Garten der Güte und zuvorkommenden Bereitwilligkeit Sr. Durchlaucht des Fürsten Salm Dyck zu verdanken.

Alyssum.

Steinkraut.

1. alpestre L. 4. Alpen. Fr.
2. argenteum W. 4. weifsblättriges. Fr.
3. deltoideum L. 5. rothblühendes. Fr.
Aubrietia deltoidea Dec.
4. edentulum W. et R. ♂. zahnloses. Fr.
Adysetum edentulum Poir.
5. gemonense L. 4. gemonesisches. Fr.
6. hirsutum M. B. ☉. behaartes. Fr.
Adysetum Draba W. En.
7. incanum L. 4. bestäubtes. Fr.
Berteroa incana Dec.
8. linifolium M. B. 4. flachsblättriges. Fr.
Meniocus linifolius Dec.
9. maritimum W. En. 5. meerstrands. Fr.
Adysetum maritimum Scop.
Clypeola maritima L.
10. minimum L. ☉. kleinstes. Fr.
11. montanum L. 4. Berg-Steinkraut. Fr.
12. podolicum Besser. 4. Podolisches. Fr.
Schiverekia podolica Dec.
13. sativum W. En. ☉. gemeines Fr.
Myagrurn sativum L.
Camelina sativa Dec.
14. saxatile L. 5. Gebirgs. Fr.
15. sinuatum W. En. 4. buchtiges. Fr.
Vesicaria sinuata Poir.
16. spinosum L. 5. dorniges. C. H. et Fr.
Adysetum spinosum Scop.
17. tortuosum W. et R. 4. gedrehtes. Fr.

Amaranthus.

Amaranth.

1. albus. L. ☉. weisser. Fr.
2. angustifolius M. B. ☉. schmalblättriger. Fr.
3. bicolor Nocea. ☉. zweifarbiger. Fr.
4. Blitum W. ☉. wilder. Fr.
5. caudatus L. ☉. geschwänzter. Fr.
6. chlorostachys W. ☉. grünähriger. Fr.
7. cruentus L. ☉. dunkelrother. Fr.
8. flavus L. ☉. gelber. Fr.
9. gangeticus L. ☉. bengalischer. Fr.
10. hybridus L. ☉. Bastard. Fr.
11. — b. hecticus W. ☉. bleicher. Fr.
12. hypochondriacus L. ☉. blassrother. Fr.
13. inamoenus W. ☉. hässlicher. Fr.

Amaranthus. Amaranth.

14. laetus W. ☉. freundlicher Fr.
15. lividus L. ☉. braunblättriger Fr.
16. sanguineus L. ☉. blutfarbener Fr.
17. scandens L. ☉. kletternder Fr.
18. spinosus L. ☉. stachlicher Fr.
19. strictus W. ☉. steifer Fr.
20. tricolor L. ☉. dreyfarbiger Fr.
21. tristis L. ☉. trauriger Fr.
22. viridis L. ☉. grüner Fr.

Amaryllis. Amaryllis.

1. Atamasco L. 4. virginische C. H.
2. aurea Herit. 4. goldene C. H.
3. Belladonna L. 4. westindische C. H.
A. rosea Lam.
4. carolinac H. Nymph. 4. carolinische w. H.
5. crispa Jacq. 4. krause C. H.
6. crocata Ker. 4. crocusgelbe w. H.
7. curvifolia Jacq. 4. krummblättrige C. H.
A. Fothergillia Andr.
8. equestris L. 4. Ritter w. H.
A. dubia L. *amoenit.*
9. flexuosa Jacq. 4. gebogene C. H.
10. formosissima L. 4. schönste C. H.
11. gigantea Ait. 4. Riesen C. H.
A. Jagus. Thomps.
Crinum giganteum Andr.
12. latifolia Herit. 4. breitblättrige C. H.
Crinum latifolium L.
13. longifolia Ait. 4. langblättrige C. H.
14. lutea L. 4. gelbe Fr.
15. orientalis L. 4. orientalische w. H.
Brunswigia multiflora Gawl.
A. Josephine Redout.
16. radiata Ait. 4. schneeglöckchenblättrige w. H.
17. Reginac L. 4. königliche C. H.
18. — b. brasiliensis Spr. 4. brasilianische C. H.
19. reticulata Herit. 4. netzförmige w. H.
20. sarniensis L. Jacq. 4. japanische C. H.
21. — b. capensis. capische C. H.
22. speciosa Herit. 4. prächtige w. H.
A. purpurea Ait.
23. tubispatha Herit. 4. scheideblüthige C. H.

Amaryllis.

Amaryllis.

- 24. undulata L. 4. wellenförmige C. H.
- 25. vittata Ait. 4. bandirte C. H.
- 26. Zeylanica L. 4. zeylanische w. H.

Ambrosia.

Götterspeise.

- 1. elatior L. ☉. hohe Fr.
- 2. maritima L. ☉. Meerstrands Fr.
- 3. peruviana W. 4. peruvianische C. H.
- 4. trifida L. ☉. dreytheilige Fr.

Ambrosinia.

Ambrosine.

- 1. Bassii L. 4. grüne C. H.

Amellus.

Amellus.

- 1. Lychnitis L. †. capischer C. H.

Amethystea.

Bläuling.

- 1. coerulea L. ☉. sibirischer Fr.

Amirola.

Amirole.

- 1. nitida Pers. †. glänzende C. H.
Lagunea nitida R. et P.

Ammannia.

Ammannie.

- 1. aegyptiaca W. ☉. ägyptische Fr.
- 2. auriculata W. ☉. geöhrte Fr.
- 3. baccifera L. ☉. beerentragende Fr.
- 4. caspica M. B. ☉. caspische Fr.
- 5. debilis Ait. ☉. zerbrechliche Fr.
- 6. diffusa Swaeg. ☉. ausgebreitete Fr.
- 7. latifolia L. ☉. breitblättrige Fr.
- 8. ramosior Wallt. ☉. ästige Fr.
- 9. sanguinolenta Sw. ☉. blutrothe Fr.

Ammi.

Ammi.

- 1. acaule Spr. ♂. stengelloses Fr.
Bunium acaule M. B.
- 2. Boeberi Hoffm. ☉. Böberisches Fr.
- 3. majus L. ☉. großes Fr.
Apium Ammi Crantz.

A m o m u m. **J n g w e r.**

1. cardamomum L. 4. Cardamom w. H.
2. zerumbet. Mill. 4. Block w. H.
3. zingiber Sw. 4. ächter w. H.

A m o r p h a. **U n f o r m.**

1. fruticosa L. 5. strauchartiger Fr.
2. pubescens W. 5. weichhaariger Fr.

A m p e l o p s i s vid. **V i t i s.**

A m s o n i a. **A m s o n i e.**

1. latifolia Mich. 4. breitblättrige Fr.
Tabernaemontana Amsonia L.
2. angustifolia Mich. 4. schmalblättrige Fr.
Tabernaemontana angustifolia Ait.

A m y g d a l u s. **M a n d e l.**

1. communis L. 5. gemeine Fr.
2. — b. dulcis. süsse Fr.
3. nana L. 5. Zwergmandel Fr.
4. orientalis Pers. 5. morgenländische Fr.
A. argentea Lam.
5. Persica L. 5. Pfirschingbaum Fr.
6. pumila flore pleno. gefüllte niedrige Fr.
7. sibirica L. 5. sibirische Fr.

A m y r i s. **B a l s a m s t r a u c h.**

1. polygama Cav. 5. geschlechtsändernder C. H.
Schinus dependens Orteg.
2. sylvatica L. 5. Wald w. H.

A n a c y c l u s. **R i n g b l u m e.**

1. aureus L. 4. goldgelbe Fr.
2. bicolor Pers. ☉. zweyfarbige Fr.
3. clavatus Pers. ☉. keulförmige Fr.
4. divaricatus Cav. ☉. ausgebreitete Fr.
5. valentinus L. ☉. spanische Fr.

A n a g a l l i s. **G a u c h h e i l.**

1. arvensis L. ☉. Acker Fr.
A. phoenicea Lam.

Anagallis. Gauchheil.

2. collina Schousb. ♂. Berg C. H.
A. fruticosa Vent.
3. latifolia L. ☉. breitblättriges Fr.
4. Monelli L. ♀. aufrechtes C. H.

Anagyris. Stinkbaum.

1. foetida L. ♀. gemeiner Fr. et C. H.

Anastatica. Jerichorose.

1. hierochontica L. ☉. gemeine Fr.

Anchusa. Ochsenzunge.

1. angustifolia L. ♀. schmalblättrige Fr.
2. Barrelieri Dec. ♀. barrelierische Fr.
Myosotis obtusa W. et Kit.
3. italica L. ♂. italienische Fr.
A. paniculata Ait.
4. lutea M. B. ☉. gelblichte Fr.
Lycopsis lutea. Lam.
5. maculata Hornem. ♀. fleckige Fr.
6. ochroleuca M. B. weißlichgelbe Fr.
7. officinalis L. ♀. gewöhnliche Fr.
8. rosea M. B. ♀. rothe Fr.
9. sempervirens L. ♀. immergrüne Fr.
10. undulata L. ♂. wellenförmige Fr.

Ancistrocarpus. Ancistrocarpus.

1. maypurensis H. et B. ☉. maypurensische Fr.

Ancistrum. Hackenfrucht.

1. repens Vent. ♀. kriechende Fr.
2. sanguisorbae L. ♀. wiesenknopfblättrige Fr.

Andrachne. Andrachne.

1. thelephioides L. ☉. niedrige Fr.
Limeum humile Forsk.

Andreusia vid. Myoporum.

Andromeda. Andromede.

1. acuminata Ait. ♀. zugespitzte Fr.

Andromeda.

Andromede.

- A. lucida*. Jacq.
A. laurina Mich.
A. populifolia. Lam.
A. formosissima Bartr.
A. reticulata Walt.
2. *b. serrata* Duham. m. sägeförm. Bltrn. Fr.
3. *angustifolia*. Pursch h. schmalblättrige Fr.
Andromeda calyculata angustifolia Ait.
4. *arboorea* L. h. baumartige Fr.
5. *axillaris* Mich. h. winkelblüthige Fr.
A. Walteri W.
A. Catesbaei Walt.
A. spinulosa Pursch.
6. *calyculata* L. h. rostblättrige Fr.
7. — *b. ventricosa* Ait. 4. bauchige Fr.
Daboecia vid. *Menziesia polifolia*.
8. *frondosa*. Pursch. h. blätterblühende Fr.
A. racemosa Walt.
A. paniculata foliosiflora Mich.
9. *nitida*. Pursch. h. glänzende Fr.
A. coriacea. Ait.
A. marginata Duh.
A. mariana Jacq.
10. *paniculata* L. h. rispenblüthige Fr.
A. globulifera Hortul.
A. racemosa Lam.
11. *polifolia* L. h. poleyblättrige Fr.
12. — *b. latifolia* h. breitblättrige Fr.
13. — *c. media* h. mittlere Fr.
14. — *d. angustifolia* h. roßsmarinblättrige Fr.
15. *racemosa* L. h. traubenblüthige Fr.
A. paniculata Walt.
16. *speciosa* Mich. h. prächtige Fr.
17. — *b. nitida* Pursch. h. m. glänzd. Bltrn. Fr.
A. cassinaefolia Vent.
18. — *c. pulverulenta* Pursch. h.
A. pulverulenta. Bartr.

Andropogon.

Bartgras.

1. *argenteus* Dec. 4. silberweißes w. H.
Sacharum argenteum Brouss.
Erianthus saccharoides W.
2. *arundinaceus* W. 4. rohrartiges w. H.

Andropogon. **Bartgras.**

3. furcatus Schreb. 4. gabeltragendes Fr.
4. Gryllus L. 4. lombardisches Fr.
Pollinia Gryllus Spreng.
5. Jschaemum L. 4. deutsches Fr.
A. provincialis Lam.
6. Schoenanthus W. 4. Kamelheu od. wohlriechd. w.H.
A. bicornis Forsk.
A. citriodorum Hortul.
7. strictus W. 4. steifes Fr.
Saccharum strictum Spreng.

Androsace. **Mannsschild.**

1. alismoides Hornem. ♂. milchweissblühendes Fr.
A. lactiflora Fisch.
2. elongata Retz ☉. verlängertes Fr.
3. filiformis Retz ☉. fadenförmiges Fr.
4. lactea L. 4. milchweisses Fr.
A. pauciflora Vill.
5. septentrionalis W. ♂. nördliches.
6. villosa L. 4. rauhes Fr.

Andryala. **Wolldistel.**

1. cheiranthifolia Herit. 4. leucojenblättrige Fr.
2. lanata W. 4. weisshaarige Fr.
Hieracium lanatum Vill.
3. ragusina L. 4. ragusinische C. H.

Anemone. **Anemone.**

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
A. burseriana Scop.
2. appenina L. 4. Appeninen Fr.
3. apiifolia Wulf. 4. selleryblättrige Fr.
4. Coronaria L. 4. gemeine Fr.
Hepatica vid. Hepatica.
5. hortensis L. 4. schöne Fr.
A. stellata Lam.
6. narcissiflora L. 4. narcissenblüthige Fr.
A. umbellata Lam.
7. nemorosa L. 4. Busch. Fr.
8. ochotensis Fisch. 4. ochotische Fr.
Pulsatilla vid. Pulsatilla.
9. pensylvanica L. 4. pensylvanische Fr.
A. aconitifolia. Mich.

Anemone. Anemone.

10. ranunculoides L. 4. ranunkelartige. Fr.
A. lutea Lam.
11. sylvestris L. 4. Wald. Fr.
12. thalictroides L. 4. thalicttrumblättrige. Fr.
13. virginiana L. 4. virginische. Fr.

Anethum. Wurzdoide.

1. Foeniculum W. En. 4. Fenchelkraut. Fr.
Foeniculum dulce Dec.
Meum Foeniculum Spr.
2. graveolens W. En. ☉. gemeiner Dill. Fr.
Pastinacea Anethum Spr. R. et S.
3. segetum L. ☉. Acker-Dill. Fr.

Angelica. Angelik.

1. Archangelica W. En. 4. Garten. Fr.
Selinum Archangelica R. et S.
2. atropurpurea W. En. 4. dunkelrothe. Fr.
Selinum atropurpureum R. et S.
3. sylvestris W. En. 4. Wald-Angelik. Fr.
Selinum Angelica R. et S.
4. verticillaris W. En. ♂. wirtelblättrige. Fr.
Selinum verticillare R. et S.
Imperatoria verticillaris Dec.

Angelonia. Angelonie.

1. salicariaefolia H. et B. ☉. weidenblättrige Fr.

Anigozanthos. Anigozanthos.

1. flavida Labill. 4. gelblicher. C. H.

Annona. Flaschenbaum.

1. glabra L. ♀. glatter. C. H. et Fr.
2. squamosa L. ♀. schuppiger. w. H.
3. triloba L. ♀. dreylappiger C. H. et Fr.
Asimina triloba Dec.
4. tripetala L. ♀. dreyblättriger. w. H.
A. Cherimolia Dec.

Anoda vid. Sida.

Anthemis. Kamille.

1. alpina L. 4. Alpen. Fr.
2. altissima L. ☉. hohe. Fr.
3. arabica L. ☉. arabische. Fr.
A. prolifera Pers.
4. artemisiaefolia W. En. 5. beyfußblättrige C.H.etFr.
Chrysanthemum indicum Curtis mit 24 Varietäten.
5. austriaca L. 4. österreichische. Fr.
6. coronopifolia W. ☉. kleinblättrige Fr.
7. Cotula L. ☉. stinkende. Fr.
8. fallax W. En. ☉. täuschende. Fr.
9. fruticosa M. B. 5. strauchartige. C. H.
10. fuscata Brot. ☉. braunspeltige. Fr.
11. maritima L. 4. Meerstrands Fr.
12. mixta L. ☉. doppelfarbige. Fr.
13. nobilis L. 4. römische. Fr.
14. pubescens W. En. 4. weichhaarige. Fr.
15. rigescens W. En. 4. steife. Fr.
16. secundiramea Bivon ☉. einseitige. Fr.
17. tinctoria L. 4. Färber. Fr.
18. trilobata Orteg. 5. dreilappige. C. H.

Anthericum. Zaunblume.

- aloides vid. Bulbine.*
calyculata vid. Tofieldia.
1. Liliago L. 4. gemeine. Fr.
Phalangium liliago Pers.
 2. paniculatum Andr. 4. rispenblüthige. Fr.
 3. pendulum Hornem. 4. hängende. Fr.
Anthropodium pendulum Dec.
 4. ramosum L. 4. ästige. Fr.
Phalangium ramosum Pers.
 5. revolutum L. 4. zurückgebogene. C. H.

Antholyza. Rachenlilie.

1. aethiopica L. 4. aetiopische. C. H.
2. Cunonia W. En. 4. schönrothe. C. H.
Gladiolus Cunonia Ait.

Anthospermum. Amberstrauch.

1. aethiopicum L. ♀. äthiopischer C. H.

Anthoxanthum. Ruchgras.

1. amarum Brot. 4. bitteres Fr.
2. odoratum W. 4. wohlriechendes Fr.
3. ovatum. Lagas ☉. eyrundes Fr.

Anthyllis. Wöllblume.

1. barba Jovis L. ♀. silberblättrige C. H.
Vulneraria argentea Lam.
2. cornicina L. ☉. gehörnte Fr.
3. cretica Lam. ♀. cretische C. H.
Ebenus cretica L.
4. cytisoides Gouan ♀. bohnenbaumartige C. H.
Aspalathus cytisoides L.
5. Dillenii S. et R. 4. dillenische Fr.
6. Hermanniae L. ♀. flachsblättrige C. H.
Cytisus graecus Smith.
Aspalathus cretica L.
7. tetraphylla L. ☉. vierblättrige Fr.
Vulneraria vesicaria Lam.
8. Tournefortii S. et R. 4. tournefortische Fr.
9. *Vulneraria* L. 4. gemeine Fr.

Antidesma. Giftstiller.

1. alexiteria L. ♀. glänzender w. H.

Anthirrhinum. Löwenmaul.

1. Asarina L. 4. gundermannblättriges C. H.
2. jamaicense Fisch. ☉. jamaicensisches Fr.
3. majus L. ♂. großes Fr.
Orontium majus Pers.
4. sempervirens Lapeyr. ♀. immergrünes C. H.
vid. *Linnaria*.

Apargia. Pfaffenröhrlein.

1. autumnalis Hoffm. 4. Herbst Fr.
2. crispa W. 4. krauses Fr.
3. dubia W. 4. zweifelhaftes Fr.
4. hispida L. 4. gabelhaariges Fr.
5. incana W. En. 4. bestäubtes Fr.
6. pratensis Link. 4. Wiesen Fr.

Apargia. Pfaffenröhrlein.

7. Taraxaci W. 4. löwenzahnartiges Fr.
8. tuberosa W. En. 4. rübenartiges Fr.
9. Villarsii Desl. 4. französisches Fr.

Apium. Sellerie.

1. graveolens L. ♂. gemeiner Fr.
2. Petroselinum L. ♂. Petersilie Fr.

Apocynum. Hundswolle.

1. androsaemifolium L. 4. fliegenfangende Fr.
2. cannabinum L. 4. hanfartige Fr.
3. hypericifolium Ait. 4. hartheublättrige Fr.
4. venetum L. 4. venetianische Fr.

Aponogeton. Aponogeton.

1. angustifolium W. 4. schmalblättriges C. H.
2. distachyon W. 4. zweyähriges C. H.
3. monostachyon W. 4. einähriges C. H.

Aquilegia. Ackeley.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. — b. grandiflora Dec. 4. mit großen Blumen.
3. atropurpurea W. 4. dunkelpurpurfarbene Fr.
4. canadensis L. 4. canadische Fr.
5. glandulosa Fisch. 4. drüsige Fr.
6. viridiflora Pall. 4. grünblühende Fr.
7. viscosa L. 4. klebrige Fr.
8. vulgaris L. 4. gemeine Fr.
— florib. albis, rubris, roseis, coeruleis, et
violaceis, semiplenis et plenis.

Arabis. Gänskraut.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
Turritis verna Desf.
2. aspera All. ♂. scharffes Fr.
3. bellidifolia L. 4. maßliebenblättriges Fr.
4. Crantziana Ehrh. 4. cranzisches Fr.
5. hispida L. 4. scharfblättriges Fr.
6. lucida L. 4. glänzendes Fr.
7. nutans Moench. 4. überhängendes Fr.
A. pumila Wulf.
8. pendula L. ☉. hängendes Fr.

Arabis. Gänsekraut.

9. procurrens W. et K. 4. wanderndes Fr.
10. saxatilis All. ♂. Stein Fr.
11. serpyllifolia Vill. ♂. quendelblättriges Fr.
12. Turrita L. ♂. thurmkrautartiges Fr.
13. thaliana L. ☉. thalisches Fr.

Arachis. Erdnufs.

1. hypogea L. ☉. amerikanische.

Aralia. Aralie.

1. arborea L. ♀. baumartige w. H.
Hedera arborea Smith.
2. capitata Jacq. ♀. kopfblüthige w. H.
3. nudicaulis L. 4. schaftblüthige Fr.
4. racemosa L. 4. traubige Fr.
5. spinosa L. 4. stachliche Fr.

Araucaria. Andentanne.

1. imbricata Pav. ♀. proteenartige C. H.
Pinus Araucaria Molin.
Dombeya chilensis Lam.

Arbutus. Sandbeere.

1. Andrachne L. ♀. candische C. H.
2. Andrachnoides Link ♀. mitgesägten Blättrn. C. H.
3. canariensis Lam. ♀. canarische C. H.
4. Unedo L. ♀. erdbeerartige C. H.
5. — b. flore pleno ♀. gefülltblühende C. H.
6. — c. flore rubro ♀. rothblühende C. H.
7. — d. crispa ♀. krausblättrige C. H.
9. — e. salicifolia ♀. weidenblättrige C. H.
10. Uva ursi L. ♀. gemeine Fr.

Arctium. Klette.

1. Bardana W. ♂. filzige Fr.
2. Lappa L. ♂. gemeine Fr.
3. majus Gml. ♂. großblüthige Fr.

Arctotheca. Bärenbüchse.

1. repens W. 4. kriechende C. H.
Arctotis repens Thunb.

Arctotis. Bärenohr.

1. angustifolia Jacq. h. schmalblättriges C. H.
2. anthemoides L. ☉. kamillenartiges C. H.
3. aspera L. h. scharfblättriges C. H.
4. auriculata Jacq. h. geöhrtes C. H.
- A. lyrata W.* ☉.
5. bicolor W. ♂. zweyfarbiges C. H.
6. decurrens Jacq. h. laufendes C. H.
7. grandiflora Jacq. h. großblüthiges C. H.
8. hypochondriaca L. ☉. melancholisches Fr.
9. rosea Jacq. h. rosenfarbiges C. H.
10. speciosa Jacq. h. ansehnliches C. H.
11. squarrosa Jacq. h. sparriges C. H.
12. tristis L. ☉. trauriges Fr.

Ardisia. Spitzblume.

1. acuminata W. h. zugespitzte w. H.
2. canariensis H. Cels. h. canarische w. H.
3. coriacea Sw. h. lederblättrige C. H.
4. crenulata Vent. h. gekerbte w. H.
5. excelsa Ait. h. hohe w. H.
- Heberdenia excelsa Banks.*
- Anguillaria bahamensis Gaert.*
6. pyramidalis Cav. h. pyramidenartige w. H.
7. solanacea Roxb. h. nachtschattenartige w. H.

Arduina. Arduine.

1. bispinosa L. h. zweydornige C. H.
- Carissa arduina Lam.*

Areca. Areca Palme.

1. Borbonia h. borbonische w. H.

Arenaria. Sandkraut.

1. austriaca L. 4. österreichisches Fr.
2. balearica L. 4. moosartiges C. H.
3. caespitosa Dec. 4. rasenbildendes Fr.
4. graminifolia W. 4. grasblättriges Fr.
5. lanceolata All. 4. lanzettenblättriges Fr.
6. marina W. ☉. Meer Fr.
7. montana L. 4. Berg Fr.
8. peploides L. 4. dickblättriges Fr.
9. recurva All. 4. krummblättriges Fr.

Arenaria. Sandkraut.

10. rubra L. ☉. rothblüthiges Fr.
11. stricta Mich. 2. aufrechtes Fr.
12. tenuifolia L. ☉. dünnblättriges Fr.
13. triflora L. 2. dreyblüthiges Fr.
14. verna L. ☉. Frühlings Fr.

Argania vid. **Sideroxylon.**

Argemone. Argemone.

1. mexicana L. ☉. mexicanische Fr.

Aristida. Aristide.

1. canariensis W. ☉. canarische Fr.
A. coerulescens Desf.

Aristea. Borstenlilie.

1. cyanea W. 2. blaue C. H.
Ixia africana L.
2. major Andr. 2. grofse C. H.
A. coerulea Vahl.

Aristolochia. Osterluzey.

1. Clematitis L. 2. gemeine Fr.
2. glauca Desf. 2. graublättrige C. H.
3. indica L. 2. ostindische w. H.
4. oblongata Jacq. 2. verlängerte w. H.
5. panduraeformis Jacq. 2. geigenförmige w. H.
6. Pistolochia L. 2. gekerbte C. H.
7. ringens Vahl. 2. rachenförmige w. H.
8. sempervirens L. 2. immergrüne w. H.
9. Serpentaria L. 2. arzneystärkige w. H.
10. Siphon W. 2. grofsblättrige Fr.
A. macrophylla Herit.
11. triloba L. 2. dreylappige w. H.

Aristotelia. Aristotelie.

1. Macqui Herit 2. chilische C. H.

Armeria. Armerie.

1. alliacea W. 2. lauchblättrige Fr.
2. fasciculata W. 2. büschelblüthige Fr.
Statice fasciculata Vent.

Armeria. *Armerie.*

3. latifolia W. 4. breitblättrige Fr.
 4. plantaginea W. 4. wegebreitartige Fr.
 5. scorzoneraefolia W. 4. haberwürzblättrige Fr.
 6. vulgaris W. 4. gemeine Fr.
- Statice Armeria L.*

Arnica. *Wolverley.*

1. cordata Thunb. 4. herzblättriger Fr.
2. Doronicum Jacq. 4. Wahrer Fr.
A. Clussii All.
3. glacialis Jacq. 4. Eiswolverley. Fr.
4. montana L. 4. Berg Fr.
5. scorpioides Jacq. 4. scorpionsartige Fr.
Doronicum grandiflorum Lam.

Arnopogon. *Schafsbart.*

1. Dalechampii W. 4. dalechampischer Fr.
Tragopogon Dalechampii L.
Urospermum Dalechampii H. Par.

Artemisia. *Wermuth.*

1. Abrotanum L. 5. Eberraute Fr.
2. Absinthium L. 4. gemeiner Wermuth Fr.
3. arborescens L. 5. baumartiger Beyfuß Fr.
4. argentea L. 5. silberblättriger Fr.
5. austriaca Jacq. 4. österreichischer Fr.
A. alba Hall.
6. balsamita W. En. Supl. 4. wohlriechender Fr.
7. coerulescens L. 4. bläulicher Fr.
8. desertorum Spr. 4. Sand. Fr.
9. Dracunculus L. 4. Estragon Fr.
10. glauca Pall. 4. graugrüner Fr.
11. leucanthemifolia Desf. 4. wucher, blümlättriger Fr.
12. maritima L. 4. Meerstrandsbeyfuß Fr.
13. maderaspatana L. ①. maderaspatanischer Fr.
14. neglecta W. 4. geringer Fr.
15. pedemontana Balb. 4. hügelliebender Fr.
16. pontica L. 4. römischer Fr.
17. procumbens Dec. 4. niedergestreckter Fr.
18. repens Pall. 4. kriechender Fr.
19. saxatilis W. et K. 4. Stein Beyfuß Fr.
20. scoparia W. et K. 4. Besen Beyfuß Fr.

Artemisia. Wermuth.

21. tanacetifolia L. ♀. Wurmkrautblättriger C. H.
22. tenuifolia W. ♀. dünnblättriger Fr. et C. H.
A. capillaeifolia Lam.
23. vulgaris L. ♀. gemeiner Fr.

Artocarpus. Brodbaum.

1. incisa L. ♀. gemeiner w. H.

Arum. Aron.

1. Arisarum L. ♀. Kappenförmiger C. H.
auritum vid. Caladium.
2. Colocasia L. ♀. ägyptischer w. H.
3. divaricatum L. ♀. ausgebreiteter Fr.
4. Dracunculus L. ♀. Schlangenkraut Fr.
5. indicum Lour. ♀. indischer w. H.
6. italicum Mill. ♀. italienischer Fr.
7. macrorhizum L. ♀. grofswurzlicher w. H.
8. maculatum L. ♀. gemeiner Fr.
A. vulgare Lam.
9. pedatum Fisch. ♀. gefufster w. H.
10. ramosum Hort. Angl. ♀. ästiger w. H.
11. tenuifolium L. ♀. dünnblättriger Fr.
12. ternatum Thunb. ♀. gedreyter.
13. triphyllum L. ♀. dreyblättriger Fr.
14. viviparum Loddig ♀. lebendigbringender w. H.

Arundo. Rohr.

1. acutiflora Schrad ♀. spitzblühendes Fr.
2. arenaria L. ♀. sandrohr Fr.
Calamagrostis arenaria Roth.
3. Donax L. ♀. breitblättriges Fr.
4. — b. versicolor Moris. ♀. buntblättriges Fr.
5. Epigejos L. ♀. epigeisches Fr.
Calamagrostis Epigejos Host.
6. stricta Schrad. ♀. canadisches Fr.
A. canadensis Mich.
A. neglecta Ehrh.
7. sylvatica Schrad ♀. Wald Fr.
Calamagrostis arundinacea Roth.
8. varia Schrad. ♀. buntes Fr.
9. vulgaris Lam. ♀. Rohrschilf Fr.
A. Phragmites Schrad.

Asarum.

Haselwurz.

1. arifolium Mich. 2. aronblättrige Fr.
A. virginicum Walt.
2. canadense L. 2. canadische Fr.
A. carolinianum Walt.
3. europaeum L. 2. europäische Fr.
4. virginicum W. 2. virginische Fr.

Asclepias.

Schwalbenwurz.

1. amoena L. 2. angenehmrothe Fr.
arborescens vid. Gomphocarpus.
carnosa vid. Hoya.
2. curasavica L. ☉. ♂. orangenfarbene w. H.
fruticosa vid. Gomphocarpus.
fuscata vid. Cynanchum Fr.
gigantea vid. Calotropis.
3. incarnata L. 2. rothblühende Fr.
4. linaria Cav. ♀. flachsblättrige C. H.
5. Mexicana Cav. ♂. mexicanische C. H.
nigra vid. Cynanchum.
6. nivea L. 2. weißblüthige w. H.
7. parviflora Ait. ♀. kleinblüthige C. H.
8. pulchra Ehrh. 2. schöne Fr.
9. purpurascens L. 2. röthliche Fr.
sibirica vid. Cynanchum.
10. syriaca L. 2. syrische Fr.
11. — b. exaltata 2. hohe Fr.
12. truncata W. ♀. abgestutzte w. H.
13. tuberosa L. 2. knollige Fr.
14. — b. decumbens Pursch. 2. niedergestreckt. Fr.
Vincetoxicum vid. Cynanchum.
volubilis vid. Hoya.

Ascyrum.

Ascyrum.

1. Crux Andreae L. 2. Andreas Ascyrum C. H.

Aspalathus vid. Anthyllis.

Asparagus.

Spargel.

1. acutifolius L. 2. spitzblättriger C. H.
2. caspicus Hort. Windeb. 2. caspischer C. H.
3. declinatus L. 2. gebogener C. H.
4. officinalis L. 2. gemeiner Fr.
5. — b. maritimus. mittelländischer Fr.

Asparagus. Spargel.

6. retrofractus L. 4. Ierchenbaumblättriger C. H.
7. scandens. Thunb. 4. kletternder C. H.
8. verticillatus L. 4. wirtelblättriger C. H.

Asperugo. Scharfkraut.

1. procumbens L. ☉. liegendes Fr.

Asperula. Waldmeister.

1. aristata Tenor 4. ährenblüthiger Fr.
2. arvensis L. ☉. Feld Fr.
3. cynanchica L. 4. Hügel Fr.
4. montana W. et K. Berg Fr.
5. odorata L. 4. wohlriechender Fr.
6. taurica L. 4. taurischer Fr.
7. tinctoria L. 4. färbender.

Asphodelus. Affodil.

1. creticus Lam. 4. cretische C. H.
2. fistulosus L. 4. röhriger Fr.
3. luteus L. ♂. gelber Fr.
4. ramosus L. 4. ästiger Fr.
5. spicatus Desf. 4. ährenförmiger Fr.
6. tauricus Pall. 4. taurischer Fr.

Aspidium. Wurmfarren.

1. acrostichoides Sw. 4. staubfarrenartiger Fr.
2. alpinum Sw. 4. Alpen Fr.
Polypodium alpinum L.
3. aculeatum Sw. 4. stachlicher Fr.
Polypodium aculeatum L.
4. bulbiferum Sw. 4. zwiebeltragender Fr.
Polypodium bulbiferum L.
5. capense W. 4. capischer C. H.
A. decompositum Sw.
A. macroporum Bory.
Polypodium capense L.
6. cristatum Sw. 4. kammförmiger Fr.
Polypodium cristatum L.
7. exaltatum Sw. 4. hoher w. H.
Polypodium exaltatum L.
Lonchitis altissima Sloan.

Aspidium. **Wurmfarn.**

8. Filix mas Sw. 4. gebräuchlicher Fr.
Polypodium Filix mas. L.
9. Filix foemina Sw. 4. schmallaubiger Fr.
Polypodium Filix foemina L.
10. fontanum W. 4. Brunnen Fr.
Polypodium fontanum L.
11. fragile Sw. 4. zerbrechlicher Fr.
Polypodium fragile L.
Cyathea fragilis Roth.
12. Halleri Sw. 4. hallerscher Fr.
13. lobatum Sw. 4. gelappter Fr.
14. Lonchitis Sw. 4. buchtenfarrenartiger Fr.
Polypodium Lonchitis L.
15. marginale Sw. 4. randfrüchtiger Fr.
16. molle Sw. 4. weicher w. H.
Polypodium molle Jacq.
17. montanum Sw. 4. Berg Fr.
Polypodium montanum Jacq.
18. Oreopteris Smith. 4. randfrüchtiger Fr.
Polypodium Oreopteris Hoffm.
19. parasiticum Sw. 4. schmarozer w. H.
Polypodium parasiticum L.
20. patens W. 4. ausgebreiteter w. H.
Polypodium patens L.
21. pectinatum W. 4. kammförmiger w. H.
A. Trapezoides Skur.
22. regium Sw. 4. Königs Fr.
Polypodium regium L.
23. spinulosum Sw. 4. borstigblättriger Fr.
Polypodium spinulosum L.
24. Thelypteris Sw. 4. Sumpf. Fr.
Polypodium Thelypteris Hoffm.
25. trifoliatum Sw. 4. dreyblättriger w. H.
Polypodium trifoliatum L.

Asplenium. **Streiffarn.**

1. Adiantum nigrum W. 4. schwarzer Fr.
2. alternifolium L. 4. wechselblättriger Fr.
3. Ceterach L. 4. gemeiner Fr.
Ceterach officinarum W.
Grammitis ceterach Ait.
4. denticatum? Sieb. 4. gezahnter w. H.

Asplenium. Streiffarn.

5. ebenum Ait. 4. schwarzstrunkiger C. H.
A. polypodioides Schkuhr.
6. furcatum W. 4. gabelblättriger C. H.
7. marinum W. 4. Meerstrands C. H.
8. pumilum Sw. 4. niedriger w. H.
A. anthriscifolium Jacq.
9. rhizophyllum W. 4. wurzelblättriger Fr.
10. Ruta muraria W. 4. Mauerstrichfarn Fr.
11. striatum W. 4. gestrichelter w. H.
12. Trichomanes W. 4. wiederthon Fr.
13. viride Sw. 4. grünstrunkiger Fr.
Scolopendrium vid. Scolopendrium officinarum.

Aster. Sternblume.

1. adulterinus W. En. 4. unächte Fr.
2. aculeatus Labill. 5. stachliche C. H.
Houstonia foliosa R. Br.
3. aestivus Ait. 4. Sommer Fr.
4. alpinus L. 4. Alpen Fr.
5. altaicus W. En. 4. altaische Fr.
6. amelloides Bernh. 4. bergliebende Fr.
7. Amellus L. 4. virgils Fr.
8. annuus L. ☉. einjährige Fr.
9. argenteus Mich. 4. silberfarbene C. H.
A. sericeus Vent.
10. argophyllus Labill. 5. silberblättrige C. H.
11. bellidiflorus W. En. 4. masliebenblüthige Fr.
12. calendulaefolius H. Cels 5. ringelblumenblättrige C. H.
13. canus W. et R. 4. graue Fr.
14. carolinianus Walt. 5. carolinische C. H.
A. capensis Hortul.
15. chinensis L. ☉. chineser Fr.
mit vielen Abarten.
16. concolor. L. 4. gleichfarbige Fr.
17. cordifolius L. 4. herzblättrige Fr.
18. coridifolius Mich. 4. corisblättrige Fr.
19. cornuti Wendl. 4. gehörnte Fr.
20. corymbosus Ait. 4. straußblüthige Fr.
21. cymbalariae Ait. 5. cymbelkrautartige C. H.
22. diffusus Ait. 4. ausgebreitete Fr.
23. divaricatus L. 4. ausgesperrte Fr.
24. divergens Ait. 4. rothscheibige Fr.
25. dracunculoides W. En. 4. dragonartige Fr.

Aster.

Sternblume.

26. dumosus L. 4. buschige Fr.
27. elegans W. En. 4. zierliche Fr.
28. eminens W. En. 4. hervorragende Fr.
29. ericoides L. 4. heidenartige Fr.
30. filiformis Vent. 5. fadenförmige Fr.
31. floribundus W. En. 4. blumenreiche Fr.
32. foliosus Ait. 4. beblätterte Fr.
33. fragilis L. 4. zerbrechliche Fr.
34. fruticulosus L. 5. strauchartige C. H.
A. hysopifolius Berg.
35. glutinosus Cav. 4. klebrige C. H.
Donia glutinosa R. Br.
36. grandiflorus L. 4. großblumige Fr.
37. junceus Ait. 4. binsenartige Fr.
38. laevigatus W. 4. glattblättrige Fr.
39. laevis L. 4. glatte Fr.
40. lanceolatus W. En. 4. lanzettblättrige Fr.
41. laxus W. En. 4. schlaffe Fr.
42. linifolius L. 4. flachsblättrige Fr.
43. longifolius Lam. 4. langblättrige Fr.
44. lyratus Sims. 5. leyerförmige C. H.
45. macrophyllus L. 4. großblättrige Fr.
46. — b. flore albo 4. mit weißer Blume Fr.
47. — c. flore rubro 4. — rother Blume Fr.
48. multiflorus Ait. 4. vielblumige Fr.
49. mutabilis L. 4. veränderliche Fr.
50. nemoralis Ait. 4. Haynen Fr.
51. novae Angliae L. 4. neuenglische Fr.
52. — b. multiflorus 4. mit vielen Blumen Fr.
53. — c. praecox 4. frühblühende Fr.
54. — d. ramis divaricatis 4. m. ausgt. Aesten Fr.
55. — e. roseus 4. m. rosenrothen Blumen Fr.
56. paniculatus Lam. 4. rispenblühende Fr.
A. novi Belgii L.
57. pendulus Ait. 4. hängende Fr.
58. punctatus W. et K. 4. punctirte Fr.
59. puniceus L. 4. hochrothe Fr.
60. rubricaulis Lam. 4. rothstengliche Fr.
61. sagittifolius W. En. 4. pfeilblättrige Fr.
62. salicifolius Ait. 4. weidenblättrige Fr.
63. sibiricus L. 4. sibirische Fr.
64. simplex W. En. 4. einfache Fr.
65. spectabilis Ait. 4. prachtvolle Fr.

Aster. Sternblume.

- 66. tardiflorus L. 4. spätblühende Fr.
- 67. tenellus L. ☉. ♂. zarte Fr.
Cineraria tenella Link.
- 68. tenuifolius L. 4. dünnblättrige Fr.
- 69. tomentosus L. ♀. filzige C. H.
A. dentatus Bot. Rep.
- 70. Tradescanti L. 4. Tradescants Fr.
- 71. — b. flore albo. mit weißer Blume Fr.
- 72. — c. major großer Blume Fr.
- 73. Tripolium L. 4. Meerstrands Fr.
- 74. umbellatus W. En. 4. doldenblüthige Fr.
- 75. vernus L. 4. Frühlings Fr.
- 76. versicolor W. 4. bunte Fr.

Astragalus. Traganth.

- 1. albidus W. et K. 4. weißlicher Fr.
- 2. alopecuroides L. 4. fuchsschwanzartiger Fr.
- 3. annularis Dec. ☉. ringelförmiger Fr.
A. subulatus Desf.
- 4. arenarius L. 4. Sand Fr.
- 5. asper Jacq. 4. rauher Fr.
- 6. austriacus L. 4. österreichischer Fr.
- 7. baeticus L. ☉. spanischer Fr.
- 8. campestris L. 4. Feld Fr.
- 9. canaliculatus W. 4. rinnenförmiger Fr.
- 10. capitatus L. 4. kopfförmiger Fr.
- 11. carolinianus L. 4. carolinischer Fr.
- 12. Cicer L. 4. kicherförmiger Fr.
- 13. clandestinus Roth ☉. heimlichblühender Fr.
- 14. contortuplicatus L. ☉. gedrehtfrüchtiger Fr.
- 15. depressus L. ♂. 4. niedergedrückter Fr.
- 16. epiglottis L. ☉. vielzungiger Fr.
- 17. exscapus L. 4. schaftloser Fr.
- 18. falcatus Lam. 4. sichelförmiger Fr.
- 19. galegiformis L. 4. geißrautenartiger Fr.
- 20. Glaux L. ☉. milchkrautartiger Fr.
- 21. glycyphyllus L. 4. süßholzartiger Fr.
- 22. hamosus L. ☉. hakiger Fr.
- 23. humifusus W. ☉. gestreckter Fr.
- 24. hypoglottis L. ☉. Wiesen Fr.
- 25. leucophaeus Smith 4. weißbrauner Fr.
- 26. micranthus Desf. 4. kleinblüthiger Fr.
- 27. Onobrychis L. 4. süßkleeartiger Fr.

Astragalus.

Traganth.

28. pentaglottis L. ☉. fünfzungiger Fr.
29. pilosus L. ☉. haariger Fr.
30. purpureus Lam. 4. purpurrother Fr.
31. reptans W. En. 4. kriechender Fr.
32. scorpioides W. ☉. scorpions Fr.
33. sesameus L. ☉. sesamartiger Fr.
34. stella L. ☉. sternfrüchtiger Fr.
35. sulcatus L. 4. gefurchter Fr.
36. Tragacantha L. ʒ. gemeiner C. H.
37. uliginosus L. 4. Sumpf Fr.
38. virescens Ait. 4. grünlicher Fr.

Astrantia.

Astrantie.

1. carniolica Jacq. 4. krainsche Fr.
2. Epipactis L. 4. grüne Fr.
Dondia Epipactis Spreng.
3. heterophylla M. B. verschiedenblättrige Fr.
4. major L. 4. Grofse Fr.
5. minor L. 4. kleine Fr.

Athamantia.

Hirschwurz.

1. cretensis L. 4. Gebirgs Fr.
3. Libanotis L. 4. gewürzhafte Fr.
4. Matthioli Wulf. 4. fadenblättrige Fr.
5. Oreoselinum W. En. 4. petersilienartige Fr.
6. sibirica vid. Ligusticum.

Athanasia.

Athanasie.

1. annua L. ☉. jährige Fr.
2. crithmifolia L. ʒ. meerfenchelblättrige C. H.
3. trifurcata L. ʒ. dreyzähnige C. H.

Atractylis vid. Acarna.

Atragene.

Atragene.

1. alpina L. ʒ. Alpen Fr.
2. — b. coerulea ʒ. blaue Fr.
A. austriaca Scop.

Atraphaxis.

Strauchmelde.

1. spinosa L. ʒ. dornige C. H.
2. undulata L. ʒ. wellenblättrige C. H.

Atriplex.

Melde.

1. acuminata W. et K. ☉. langzugespitzte Fr.
2. angustifolia Smith. ☉. schmalblättrige Fr.
3. bengalensis Lam. ☉. bengalische Fr.
4. Halimus L. ☿. strauchartige C. H.
5. hortensis L. ☉. Garten Fr.
6. — b. fol. rubris et viridis. m. roth. u. gr Blt. Fr.
7. laciniata L. ☉. zerschlitzte Fr.
8. microsperma W. et K. ☉. kleinsamige Fr.
9. Obtusa W. ☉. stumpfe Fr.
10. patula L. ☉. ausgebreitete Fr.
11. portulacoides L. ☿. portulakblättrige C. H.
12. rosea L. ☉. rosenartige Fr.
13. sibirica L. ☉. sibirische Fr.
14. tatarica L. ☉. tatarische Fr.

Atropa.

Tollkraut.

1. Belladonna L. ♀. gemeines Fr.
2. frutescens L. ♀. strauchartiges C. H.
Mandragora vid. Mandragora.
physaloides vid. Nicandra.
umbellata vid. Saracha.

Aucuba.

Aucube.

1. japonica Thunb. ☿. japanische Fr. et C. H.

Avena.

Hafer.

1. alba Vahl ☉. weißer Fr.
2. brevis Roth. ☉. kurzer Fr.
A. nuda Thuill.
3. calycina Vill. ♀. gekelchter Fr.
Danthonia provincialis Dec.
4. elatior L. ♀. hoher oder französ. Raigras Fr.
Holcus avenaceus Schrad.
5. fatua L. ☉. wilder Fr.
6. fragilis L. ☉. zerbrechlicher Fr.
gaudinia fragilis Palliss.
7. lutea L. ☉. gelber Fr.
8. neglecta Savi. ☉. nakender Fr.
9. orientalis Schreb. ☉. morgenländischer Fr.
10. pensylvanica L. ☉. pensylvanischer Fr.
11. planiculmis Schrad. ♀. flachhalmiger Fr.
A. latifolia Host.

Avena.

Hafer.

12. pratensis L. 4. Wiesen Fr.
 13. pubescens L. 4. behaarter Fr.
 14. sativa L. ☉. gemeiner Fr.
 15. b. rubra ☉. rother Fr.
 16. c. georgica ☉. georgischer Fr.
 17. d. anglica ☉. englischer Fr.
 18. e. trisperma ☉. dreysaamiger Fr.
 19. strigosa Schreb. ☉. Getreide Fr.
- Danthonia strigosa Beauv.*

Averrhoa.

Averrhoa.

1. Bilimbi L. ʒ. Bilimbi w. H.

Axyris.

Amaranthmelde.

1. amaranthoides L. ☉. sibirische Fr.
2. hybrida L. ☉. Bastard Fr.

Ayenia.

Ayenie.

1. pusilla L. ☉. kleine w. H.

Azalea.

Azalea.

1. aurantiaca Lee et K. ʒ. orangenfarbige Fr.
 2. bicolor Pursch. ʒ. zweyfarbige Fr.
 3. calendulacea Pursch. ʒ. ringelblumartige Fr.
 4. — b. Crocea Pursch. ʒ. saffrangelbe Fr.
 5. — c. flamea Pursch. ʒ. geflammte Fr.
 6. canescens Mich. ʒ. gräuliche Fr.
 7. cuprea H. Cels. ʒ. kupferfarbene Fr.
 8. glauca Lam. ʒ. graue Fr.
 9. indica L. ʒ. indische C. H.
 10. nudiflora L. ʒ. naktblühende Fr.
- A. periclymenoides Mich.*
11. — b. carnea Ait. fleischfarbige Fr.
 12. — c. coccinea Ait. scharlachrothe Fr.
 13. — d. papilionacea Ait. schmetterlingsblum. Fr.
 14. — e. rutilans Ait. dunkelrothblühende Fr.
 15. pontica L. ʒ. pontische Fr.
 16. — b. pallida. mit blaßsgelben Blumen Fr.
 17. viscosa L. ʒ. klebrige Fr.
 18. — b. flore pleno. mit gefüllten Blumen Fr.
 19. — c. odorata Ait. wohlriechende Fr.
 20. — d. serotina. spätblühende Fr.
 21. — e. lucida. glänzende Fr.

B.

Bacharis.

Bacharis.

1. adnata L. †. angewachsene w. H.
2. Dioscoridis L. †. levantische C. H.
3. halimifolia L. †. meldenblättrige C. H.
4. ivaefolia L. †. ivaebblättrige C. H.
5. neriifolia L. †. oleanderblättrige C. H.
6. parviflora R. et P. kleinblüthige C. H.
7. peruviana Fl. peruv. †. peruvianische C. H.

Bactrylobium.

Rohr. (Cassie.)

1. fistula W. En. †. röhrenfrüchtige w. H.
Cassia fistula L.

Bacobotrys.

Kleintraube.

1. indica Bot. Mag. †. indische w. H.

Ballota.

Ballote.

1. alba L. 4. weisse Fr.
2. lanata L. 4. wollige Fr.
3. nigra L. 4. schwarze Fr.

Balsamita.

Frauenmünze.

1. ageratifolia Desf. 4. dürrwurzblättrige C. H.
Chrysanthemum flosculosum L.
2. flabelliformis Pers. †. fächerförmige C. H.
Pentzia flabelliformis W.
Tanacetum flabelliforme Herit.
3. suaveolens Pers. 4. wohlriechende Fr.
B. vulgaris W.
Tanacetum balsamita L.
4. virgata Desf. 4. ruthenförmige Fr.
Chrysanthemum discoideum All.

Baltimora.

Baltimore.

1. recta L. ☉. aufrechte w. H.

Bambusa.

Bambos.

1. arundinacea W. †. gemeiner w. H.
Arundo Bambos L.
2. — b. latifolia. breitblättriger w. H.

Banisteria.

Banisterie.

1. angulosa L. h. eckige w. H.
2. chrysophylla Jacq. h. goldblättrige w. H.
3. ciliata Lam. h. gefranzte w. H.
4. laurifolia L. h. lorbeerblättrige w. H.
5. purpurea L. h. purpurfarbene w. H.
6. tomentosa Desf. h. filzige w. H.

Banksia.

Banksie.

1. dendata L. h. gezähnte C. H.
2. ericaefolia L. h. heidenblättrige C. H.
3. illicifolia R. Br. h. hülsenblättrige C. H.
4. integrifolia L. h. ganzblättrige C. H.
5. latifolia R. Br. h. breitblättrige C. H.
Banksia robur Cav.
6. microstachia Cav. h. kleinährige C. H.
7. oblongifolia Cav. h. langblättrige C. H.
B. asplenifolia Salisb.
8. plumosa Andr. h. federweise C. H.
9. praemorsa Andr. h. stumpfblättrige C. H.
B. marcescens R. Br.
10. repens Labill. h. kriechende C. H.
B. polypodiifolia Salisb.
11. serrata L. h. sägeblättrige C. H.
B. mitis Salisb.

Barleria.

Barlerie.

1. flava Jacq. h. gelbe w. H.
Justicia flava Vahl.
2. Prionitis L. h. fufsangelförmige w. H.
Justicia appressa Forsk.

Barosma.

Barosme.

1. odorata W. h. wohlriechende C. H.
Parapetalifera odorata Wendl.

Bartia.

Bartie.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.

Basella.

Beerblume.

1. alba L. ♂. weisse w. H.
2. cordifolia Lam. ♂. herzblättrige w. H.
3. lucida L. ♂. glänzende w. H.
4. rubra L. ♂. rothe w. H.

Bauersia. *Bauersie.*

1. maculata Hor. Berol. h. flekige w. H.

Bauera. *Bauere.*

1. rubioides Andr. h. röthenblättrige C. H.

Bauhinia. *Bauhinie.*

1. acuminata L. h. zugespitzte w. H.
2. aculeata L. h. stachliche w. H.
3. furcata Wendl. h. gabelförmige w. H.
4. purpurea L. h. purpurrothe w. H.
5. racemosa Lam. h. traubenförmige w. H.

Beaufortia. *Beaufortie.*

1. decussata R. Br. h. kreuzweisblättrige C. H.

Beckea. *Beckee.*

1. trinervia?..... h. dreynervige C. H.
2. virgata Ait. h. ruthenförmige C. H.

Beckmannia. *Beckmannie.*

1. erucaeformis W. ☉. raukenartige Fr.
Cynosurus erucaeformis Ait.

Begonia. *Schiefblatt.*

1. acuminata Pers. h. zugespitztes w. H.
2. agrostigma H. Berol. h. silberdupfiges w. H.
3. capensis L. h. capisches w. H.
4. dichotoma Jacq. h. gabelästiges w. H.
5. discolor Ait. 4. verschiedenfarbiges w. H.
6. hirtella H. Berol. h. borstiges w. H.
7. obliqua Jacq. h. schiefes w. H.
8. odorata W. En. h. wohlriechendes w. H.
9. patula Fisch. h. ausgebreitetes w. H.
10. spathulata H. Lieverp. h. spathenförmiges w. H.
11. Ulmifolia W. h. rüsterblättriges w. H.

Bellis. *Maslieb.*

1. perennis L. 4. ausdauernde Fr.
2. — b. fl. pl. albis rubris et incarnatis. mitge-
füllten weissen, rothen und fleischfarb. Blum. Fr.

Bellium. Bundblume.

1. bellidioides L. 4. masliebartige Fr.

Berberis. Berberitze.

1. canadensis Mill. 5. canadische Fr.
2. cretica L. 5. cretische Fr.
3. illicifolia Forst. 5. hülsenblättrige Fr.
4. sibirica Pall. 5. sibirische Fr.
5. vulgaris L. 5. gemeine Fr.
6. — b. fruct violac 5. m. violetten Beeren Fr.

Berckheya. Berckheye.

1. ciliaris W. 5. gewimperte C. H.
Rohria ciliaris Thunb.
Gorteria ciliaris L.
2. grandiflora W. 5. großblühende C. H.
Rohria grandiflora Thunb.
3. incana W. 5. graue C. H.
Gorteria fruticosa L.

Bertolonia vid. Myoporum.

Besleria. Beslerie.

1. melittifolia L. 5. melittisblättrige w. H.
2. serrulata Jacq. 5. gezähnte w. H.

Beta. Mangold (Runkelrübe).

1. Cicla L. ♂. weißer Fr.
2. trigyna W. et K. 4. dreyweibiger Fr.
3. vulgaris L. ♂. gemeiner Fr.
4. — b. rubra, alba et lutea. mit rother weißer und gelber Rübe Fr.

Betonica. Betonie.

1. alopecuros L. 4. gelbweise Fr.
2. grandiflora W. 4. großblüthige Fr.
3. hirsuta L. 4. haarige Fr.
4. officinalis L. 4. gemeine Fr.
5. — b. flore albo. mit weißer Blume Fr.
6. orientalis L. 4. morgenländische Fr.
7. stricta Ait. 4. steife Fr.
B. danica Mill.

Betula. Birke.

1. alba L. ♀. gemeine Fr.
2. — b. laciniata H. Cels ♀. mit zerschliessenen Blättern Fr.
3. c. pendula ♀. mit hängenden Aesten Fr.
4. carpinifolia Ehrh. ♀. haynbuchenblättrige Fr.
5. daurica Pall ♀. daurische Fr.
6. excelsa Ait. ♀. hohe Fr.
B. lutea Mich.
7. fruticosa Pall. ♀. strauchartige Fr.
B. humilis Schrank.
glandulosa Mich. ♀. drüsige Fr.
9. lenta L. ♀. zähe Fr.
B. nigra Duroi.
10. nana L. ♀. Zwerg Fr.
11. nigra L. ♀. schwarze Fr.
12. odorata Borckh ♀. wohlriechende Fr.
13. papyracea Ait. ♀. Papier Fr.
14. pontica Desf. ♀. pontische Fr.
15. populifolia Ait. ♀. pappelblättrige Fr.

Bidens. Zweyzahn.

1. bullata L. ☉. blasiger Fr.
2. cernua L. ☉. hängender Fr.
Coreopsis Bidens W.
3. chinensis W. ☉. chinesischer Fr.
4. chrysanthemoides Mich. ☉. Wucher blumentragender Fr.
5. diversifolia W. ☉. — großblumiger Fr.
B. grandiflora Dec.
6. heterophylla Orteg. ☉. verschiedenblättriger Fr.
7. nodiflora L. ☉. achselblüthiger Fr.
8. pilosa L. ☉. haariger Fr.
9. tripartita L. S. dreytheiliger.

Bignonia. Trompetenblume.

1. aequinoctialis L. ♀. cajennische w. H.
2. capreolata L. ♀. Rankende Fr.
3. Catalpa L. ♀. gemeine Fr.
Catalpa bignonioides Walth.
C cordifolia Duh.
4. crucigera L. ♀. kreuzförmige w. H.
5. grandifolia Jacq. ♀. großblättrige w. H.

Bignonia. *Trompetenblume.*

6. *lactiflora* Vahl h. milchfarbene w. H.
7. *Leucoxydon* L. h. weißholzige w. H.
8. *lucida*? . . . h. glänzende w. H.
9. *pandorana* Andr. h. neuholländische C. H.
10. *paniculata* L. h. rispenblüthige w. H.
11. *pentaphylla* L. h. fünfblättrige w. W.
12. *radicans* L. h. Wurzelnde Fr.

Thecoma radicans Düh.

13. — b. *minor*. mit kleinen Blumen Fr.
14. *rigescens* Jacq. h. steifblättrige Fr.
15. *sempervirens* L. h. immergrüne w. H.

Gelsemium sempervirens Pers.

16. *serratifolia* Vahl. h. sägeblättrige w. H.
17. *salns.* L. h. eschenblättrige w. H.

B. frutescens. Mill.

18. *triphylla* L. h. dreyblättrige w. H.

Billardiera. *Billardiere.*

1. *longiflora* Labill. h. langblüthige C. H.
2. *mutabilis* Salisb. h. veränderliche C. H.
3. *scandens* Smith h. rankende C. H.

Biscutella. *Brillenschote.*

1. *apula* L. ☉. apulische Fr.
2. *auriculata* L. ☉. geöhrte Fr.
3. *depressa* W. ☉. Zwerg Fr.
4. *didyma* W. ☉. gedoppelte Fr.
5. *laevigata* L. ☉. glatte Fr.
6. *lyrata* L. ☉. leyerförmige Fr.
7. *raphanifolia* Poir ☉. rettigblättrige Fr.

Biserrula. *Sägekraut.*

1. *Pelecines* L. ☉. gemeiner w. H.

Bixa. *Orleanbaum.*

1. *Orellana* L. h. gemeiner w. H.

Blaeria. *Blaerie.*

1. *ericoides* W. En. h. heidenartige C. H.

Erica Blaeria Thunb.

Blakea. *Blakie.*

1. *trinervia* L. h. dreynervige w. H.

Blechnum. Rippenfarn.

1. australe W. 24. südlicher w. H.
2. boreale W. 24. nördlicher Fr.
Osmunda spicant L.
3. occidentale Jacq. 24. abendländischer w. H.
radicans vid. *Woodwardia*.

Bletia vid. *Limodorum*.

Blitum. Erdbeerspinat.

1. capitatum L. ☉. kopfförmiger Fr.
2. tataricum Mill. ☉. tatarischer Fr.
3. virgatum L. ☉. ruthenförmiger Fr.
4. — b. *chenopodioides* L. gänsefußblättriger Fr.

Bocconia. Bocconie.

1. cordata W. 24. herzblättrige Fr.
2. frutescens L. ʒ. strauchartige w. H.

Boebera. Boebere.

1. chrysanthemoides W. ☉. goldblumenartige Fr.
Tagetes papposa Mich.

Boehmeria. Boehmerie.

1. rubescens W. ʒ. röthliche C. H.
Parietaria arborea Ait.
Boemia arborea Desf.
Urtica arborea L.

Boerhavia. Boerhavia.

1. erecta L. ʒ. aufrechte w. H.
2. excelsa W. ʒ. hohe w. H.
3. hirsuta L. ʒ. haarige w. H.
4. scandens L. ʒ. kletternde w. H.

Boltonia. Boltonie.

1. asteroides Herit. 24. sternblumenartige Fr.
Matricaria asteroides L.
2. glastifolia Herit. 24. glattblättrige Fr.

Bombax. Wollbaum.

1. *Ceiba* L. ♀. starker w. W.
2. *Erianthos*. Lam. ♀ vielstachlicher w. H.
3. *pentandrum* L. ♀. fünffädiger w. H.

Bonapartea vid. *Littaea*.

Bonplandia vid. *Caldasia*.

Bontia. Bontie.

1. *daphnoides* L. ♀. scidelbastblättrige w. H.

Borago. Boretsch.

1. *laxiflora* Dec. 4. schlaffblättriger Fr.
2. *officinalis* W. ☉. gemeiner Fr.
3. *orientalis* W. 4. morgenländischer C. H. et Fr.

Borbonia. Borbonie.

1. *crenata* L. ♀. gekerbte C. H.

Borya. Borya.

1. *acuminata* W. ♀. zugespitzte C. H.
Adelia acuminata Mich.

Bosea. Goldruthenbaum.

1. *Yervamora* L. ♀. canarischer C. H.

Bossiaea. Plattschote.

1. *linophylla* Ait. ♀. Linienblättrige C. H.
2. *scolopendrium* Andr. ♀. hirschzungenblättrige C. H.
Platylobium scolopendrium Andr.

Brachysema. Brachysema.

1. *latifolium* R. Br. ♀. breitblättrige C. H.

Brachystemum. Bergbasilicum.

1. *lanceolatum* W. 4. lanzettförmiger Fr.
Pycnanthemum lanceolatum Mich.
2. *linifolium* W. 4. leinblättriger Fr.
Thymus virginicus L.
Satureja virginica L.

Brassica. Kohl.

1. alpina L. 24. Alpen Fr.
2. arvensis L. 24. Acker Fr.
3. austriaca W. ☉. österreichischer Fr.
4. Eruca L. ☉. wilde Rauke Fr.
Sisymbrium Erucastrum Will.
5. Erucastrum L. ☉. raukenartiger Fr.
6. Napus L. ♂. Rübsen oder Rebs Fr.
7. oleracea L. ♂. gemeiner Fr.
— b. amplae variet. mit vielen Abarten Fr.
8. odorata Schrank ☉. wohlriechender Fr.
9. orientalis L. ☉. morgenländischer Fr.
10. Rapa L. ♂. Rüben Fr.
11. Tournefortii Desf. ☉. tournefortischer Fr.
12. vesicaria L. ☉. dickkelchiger Fr.

Briza. Zittergras.

1. maxima L. ☉. größtes Fr.
2. media L. ☉. gemeines Fr.
B. tremula Lam.
3. minor L. ☉. kleines Fr.
4. virens L. ☉. grünes Fr.

Bromelia. Ananas.

1. Ananas L. ♀. gemeine w. H.
2. — b. inermis Pers. ♀. wehrlose w. H.
3. — c. foliis argenteis, aureis varieg. lucidis, viridis, violaceis ♀. w. H. mit Silber und Gold, bunten, glänzenden, grünen und violetten Blättern.
4. humilis L. ♀. niedrige w. H.
B. haemisphaerica Lam.
5. chrysantha Jacq. gelbblüthige w. H.
6. karatas L. ♀. wilde w. H.
7. Pinquin L. ♀. Zaun w. H.
Ananas Pinquin Mill.
8. pyramidalis Sims ♀. pyramidenförmige w. H.
9. semiserrata W. ♀. mit halbgesägten Bltrn. w. H.

Bromus. Trespce.

1. asper L. 24. rauhe Fr.
2. commutatus Schrad. ♂. hängende Fr.

Bromus. Trespe.

3. erectus Smith. 4. aufrechte Fr.
B. arvensis Lam.
B. angustifolius Schrank.
B. agrestis All.
4. giganteus L. 4. Futter Fr.
B. triflorus Fl. dan.
B. strigosus Lam.
5. glaucus Lapeyr. 4. graue Fr.
B. erectus Smith.
6. gracilis Weig. 4. dünnstilige Fr.
Festuca gracilis W. En.
7. hirsutissimus Cyrill. 4. vielhaarige Fr.
8. inermis L. 4. wehrlose Fr.
Festuca inermis Dec.
— *speciosa* Schreb.
9. laxiflorus Spr. 4. schlaffblüthige Fr.
10. laxus Spr. 4. schlaffer Fr.
11. ligusticus All. ☉. ligurische Fr.
12. longiflorus W. En. 4. langblüthige Fr.
13. madritensis L. 4. Madritische Fr.
B. diandrus Smith.
B. gynandrus Roth.
Festuca madritensis Desf.
14. maximus Desf. ☉. größte Fr.
15. murorum Bernh. 4. Mauer Fr.
16. parviflorus Desf. ☉. kleinblumige Fr.
17. pendulinus Sesse ☉. hängende Fr.
18. pinnatus L. 4. gefiederte Fr.
Avena laeta Salisb.
19. pubescens Mühlenb. 4. weichhaarige Fr.
20. purgans L. 4. canadische Fr.
21. velutinus Schrad. ☉. samtartige Fr.
B. multiflorus Smith.
22. wolgensis Spr. ☉. wolgaische Fr.

Brotera. Brotere.

1. trinervata Pers. ☉. dreynervige Fr.
Nauenburgia trinervata W.

Broussonetia. Maulbeer.

1. papyrifera Vent. Mas. et Foem. Papier Fr.
Morus papyrifera L.

Browallia. Browallie.

1. elata L. ☉. hohe blaublühende Fr.
2. lactea L. ☉. milchweise Fr.

Brucea. Brucea.

1. ferruginea Herit. ☿. rostfarbige w. H.

Brunia. Brunie.

1. abrotanoides L. ☿. stabwurzartige C. H.
 2. ericoides Wendl. ☿. heidenblättrige C. H.
 3. lanuginosa Thunb. ☿. haarstielige C. H.
 4. paleacea L. ☿. spreuartige C. H.
 5. radiata L. ☿. gestrahlte C. H.
 6. superba Donn. ☿. prächtige C. H.
- B. speciosa Hortul.*

Brunnichia. Brunnichie.

1. cirrhosa Gaert. ☿. rankende C. H.
- Rajania ovata Walt.*

Brunsfelsia. Brunsfelsie.

1. americana L. ☿. amerikanische w. H.
2. undulata Sw. ☿. wellenblättrige w. H.
3. violacea H. Cels ☿. mit violetten Blättern w. H.

Bryonia. Gicht od. Zaunrübe.

1. africana L. ♀. afrikanische C. H.
2. alba L. ♀. gemeine Fr.
3. dioica Jacq. ♀. rothbeerige Fr.
4. grandis L. ☉. großblumige w. H.
5. laciniata L. ♀. schlitzblättrige C. H.

Bryophyllum. Blattblume.

1. calycinum Haw. ☿. gekelchte w. H.

Bubon. Steineppig.

1. buchtormensis Thunb. ♂. buchtormensischer Fr.
2. Galbanum L. ☿. galban C. H.
3. glaucus Spr. ♀. grauer Fr.
Seseli petraeum M. B.
4. macedonicus L. ♂. macedonischer C. H.
5. rigidior L. ♀. steifer Fr.
6. siculus Spr. ♀. sicilianischer Fr.
Seseli cuneifolium M. B.

Bubroma. Ochsenfras.

1. Guazuma W. h. schiefblättriger w. H.
Theobroma Guazuma L.
Guazuma ulmifolia Desf.

Bucco vid. Diosma.

Buchnera vid. Manulea.

Budleja. Budleje.

1. connata R. et P. verwachsene C. H.
2. globosa Ait. h. kopftragende C. H.
capitata Jacq.
3. salicifolia Jacq. h. weidenblättrige C. H.
4. salvifolia Lam. h. salbeyblättrige C. H.
Lantana salvifolia L.

Buffonia. Buffonie.

1. annua Lam. ☉. jährige Fr.
2. perennis Lam. 4. ausdaurende Fr.

Buginvillea. Buginville.

1. spectabilis W. h. ansehnliche w. H.

Bulbine. Bulbine.

1. alaides W. En. 4. aloebblättrige C. H.
Anthericum aloides L.
2. annua W. ☉. jährige Fr.
3. frutescens W. En. h. strauchartige C. H.
Anthericum frutescens L.

Bulbocadium. Lichtblume.

1. vernum L. 4. Frühlings Fr.

Bumelia. Hochstamm.

1. lycioides W. h. bocksdornblättriger C. H.
Sideroxylon laeve Lam.
— *lycioides* Duh.
2. pallida Sw. h. bleicher C. H.
3. pentagona Sw. h. fünfeckiger C. H.
Sideroxylon pauciflorum Lam.
4. salicifolia Sw. h. weidenblättriger C. H.
Achras salicifolia L.

Bumelia. Hochstamm.

5. tenax W. h. zäher C. H.
Sideroxylon tenax L.
S. — Chrysophylloides Mich.

Bunias. Zackenschote.

1. aegyptiaca L. ☉. ägyptische Fr.
2. aspera Retz ☉. rauhe Fr.
3. cochlearioides W. ☉. löffelkrautartige Fr.
4. orientalis L. 4. morgenländische Fr.
5. syriaca Gaert. ☉. syrische Fr.
Anastatica syriaca L.

Bunium. Erdnufs.

1. Bulbocastanum L. 4. gemeine Fr.
Sium Bulbocastanum Spr.

Buphthalmum. Rindsauge.

1. aquaticum L. ☉. wasserliebendes Fr.
2. cordifolium W. et K. h. herzblättriges Fr.
Inula macrophylla Hortul.
3. frutescens L. h. strauchartiges C. H.
4. grandiflorum L. 4. großblühendes Fr.
5. helianthoides L. 4. sonnenblumenartiges Fr.
Heliopsis laevis Pers.
6. salicifolium L. 4. weidenblättriges Fr.
7. sericeum L. h. seidenartiges C. H.
8. spinosum L. ♂. stachliches C. H.

Bupleurum. Hasenöhrllein.

1. aureum Fisch. ☉. goldfarbiges Fr.
2. coriaceum Ait. h. baumartiges C. H.
Tenoria coriacea Spr.
Bupleurum arboreum Jacq.
B. — gibraltarica Lam.
B. — obliquum Vahl.
3. frutescens L. h. strauchartiges Fr.
Tenoria fruticosa Spr.
4. junceum L. ☉. binsenartiges Fr.
5. longifolium L. 4. langblättriges Fr.
6. petraeum L. 4. Felsen Fr.
7. ranunculoides L. 4. ranunkelblättriges Fr.
8. rotundifolium L. ☉. rundblättrige Fr.

Burglaria. Burglarie.

1. lucida Wendl. h. weidenblättrige C. H.

Bursaria. Bursarie.

1. spinosa Cav. h. stachliche C. H.

Cyrilla spinosa Spr.

Itea spinosa Andr.

Butomus. Wasserbinse.

1. umbellatus L. 4. doldenblüthige Fr.

Büttneria. Büttnerie.

1. cordata Cav. h. herzblättrige w. H.

Buxus. Buxbaum.

1. balearica Lam. h. balearischer C. H.

2. sempervirens L. h. immergrüner Fr.

3. — b. arborescens h. baumartiger Fr.

4. — c. angustifolia h. schmalblättriger Fr.

5. — d. suffruticosa h. Zwerch Fr.

6. — e. myrtifolia h. myrtenblättriger Fr.

fol. arg. et aur. varieg. mit gold- und
silberbunten Blättern.

Bysteropogon. Kelchbart.

1. punctatum Herit. h. punctirter C. H.

C.

Cacalia. Pestwurz.

1. albifrons L. 4. geöhrte Fr.

2. alpina L. 4. Alpen Fr.

3. Anteuphorbium L. h. wolfmilchartige C. H.

4. articulata Thunb. h. gegliederte C. H.

5. atriplicifolia L. 4. Meldenblättrige Fr.

6. canescens W. h. graue C. H.

7. carnosa Ait. h. fleischige C. H.

Kleinia carnosa Haw.

8. cylindrica Lam. h. cylinderblättrige C. H.

9. ficoides L. h. zaserblumenartige C. H.

Cacalia. Pestwurz.

10. kleinia L. †. canarische C. H.
11. hastata L. ‡. spontanblättrige Fr.
12. papillaris Haw. †. warzige C. H.
13. pugioniformis Hort. Dyk. †. dolchförmige C. H.
14. repens L. †. kriechende C. H.

Kleinia repens. Haw.

15. sagittata Vahl. ☉. pfeilblättrige Fr.
16. saracenica L. ‡. goldruthenblättrige Fr.
17. suaveolens L. ‡. wohlriechende Fr.
18. sonchifolia L. ☉. gänse-distelblättrige Fr.

Cachrys. Nufsdolde.

1. panacifolia. Vahl. ‡. pastinakblättrige Fr.

Cactus. Fackeldistel.

1. abnormis. W. †. monströse w. H.
C. monstrosus Hort. Par.
2. albispinis Hort. Dyk. †. weisstachlige w. H.
3. alatus Schw. †. geflügelte w. H.
4. brassiliensis W. †. brasilianische w. H.
5. coccinellifera Haw. †. cochenillenfackeldistel w. H.
6. coronarius W. En. †. gekrönte w. H.
7. crenulatus Hort. Dyk. †. gekerbte w. H.
8. curassavicus W. †. curassavische w. H.
9. cylindricus Lam. †. walzenförmige w. H.
10. decumanus W. †. grofse w. H.

C. elongata Haw.

11. depressus Dec. †. niedergedrückte w. H.
12. eburneus Hort Dyk †. elfenbeinstachlige w. H.
13. elatior W. †. hohe w. H.

C. nigricans Haw.

14. elongatus Haw. †. verlängerte w. H.
15. extensus H. Dyk †. ausgedehnte w. H.
16. fasciculatus W. Haw. †. büschelförmige w. H.

C. parasiticus Dec.

17. ferox W. †. langdornige w. H.
18. Ficus indica L. †. indische w. H.
19. flagelliformis W. Haw. †. peitschenförmige w. W.
20. — b. minor Hort. Dyck. kleinere w. H.
21. flavispinis Hort Dyk †. gelbstachlige w. H.
22. foliosus W. †. beblätterte w. H.

C. pusilla Haw.

Cactus.

Fackeldistel.

23. grandiflorus L. h. großblumige w. H.
24. hexagonus L. h. sechseckige w. H.
25. lanuginosus Haw. h. wollige w. H.
26. mamillaris W. h. warzentragende w. H.
27. — b. prolifer sprossende w. H.
28. — c. spinis luteis gelbstachelige w. H.
29. maximus Hort. Dyk h. größte.
30. melocactus L. h. melonenartige w. H.
31. monacanthus Haw. h. einstachelige w. H.
32. multangularis Haw. h. vieleckige w. H.
33. niger Hort. Dyk h. schwarze w. H.
34. opuntia L. h. gemeine w. H.
35. — b. fol. rotundis h. mit runden Blättrn. w. H.
36. pendulus W. h. hängende w. H.

C. Cassutha Haw.

37. pentagonus W. En. h. fünfeckige w. H.
38. Pereskia W. h. großblättrige w. H.
39. peruvianus Haw. h. peruvianische w. H.
40. Phyllanthus W. h. dünngliedrige w. H.
41. polyanthos Dec. h. vielblumige w. H.
42. pseudo tuna H. Dyk. unechtbreite w. H.
43. pusillus Hort. Dyk. kleine w. H.
44. repandus W. h. ausgeschweifte w. H.
45. reptans Haw. h. kriechende. w. H.
46. Royeni H. Par. h. royenische w. H.
47. salicornoides Haw. h. glasschmalzblättrige w. H.

Rhipsalis salicornoides Lodd.

48. serpentinus Haw. h. schlangenförmige w. H.
49. speciosus W. h. schöner w. H.
50. spinosissimus W. h. vielstachelige w. H.
51. stellaris W. En. h. gesternt w. H.
52. strictus W. h. aufrechte w. H.
53. tetragonus L. h. viereckige w. H.
54. tomentosus Link. h. filzige w. H.
55. triacanthos W. h. dreistachelige w. H.
56. triangularis W. h. dreieckige w. H.
- b. foliis variegatis. bunte w. H.
57. trigonus Haw. h. dreieckige w. H.
58. triqueter W. h. dreiseitige w. H.
59. tuberculatus W. h. knopfige w. H.
60. truncatus Haw. h. abgestutzte w. H.
61. Tuna Haw. h. breite w. H.

Caesalpinia.

Caesalpinie.

1. cristata L. ♀. vielstachlige w. H.
C. Arista Mill.
2. Sappan L. ♀. Brasilienholz w. H.

Caladium.

Caladium.

1. arborescens Vent. ♀. baumartiges w. H.
Arum arborescens L.
2. auritum W. En. ♀. geöhrttes w. H.
Arum auritum Jacq. ♀.
3. bicolor Vent. 4. zweyfarbiges w. H.
Arum bicolor Ait.
4. esculentum Vent. 4. genießbares w. H.
Arum esculentum L.
5. helleborifolium Vent. 4. christwurzblättrgs. w. H.
Arum helleborifolium Jacq.
6. grandifolium W. ♀. großblättriges w. H.
Arum grandifolium Jacq.
7. lacerum W. En. ♀. geschlitztes w. H.
Arum lacerum Jacq.
8. pinnatifidum W. ♀. halbgefiedertes w. H.
Arum pinnatifidum Jacq.
9. sagittae-folium Vent. 4. pfeilblättriges w. H.
Arum sagittae-folium L.
10. sequinum Vent. ♀. giftiges w. H.
Arum sequinum L.
11. tripartitum W. En. ♀. dreytheiliges w. H.
Arum tripartitum Jacq.

Calanchoe vid. Verca.

Calceolaria.

Pantoffelschuh.

1. pinnata L. ☉. gefiederter Fr.

Caldasia.

Caldasie.

1. heterophylla W. ♀. verschiedenblättrige w. H.
Bonplandia geminiflora Cav.

Calea.

Calee.

1. aspera Jacq. ☉. rauhe Fr.

Calendula.

Ringelblume.

1. arragonica Fisch. ☉. arragonische Fr.

Calendula. Ringelblume.

2. arvensis L. ☉. Ackerringelblume Fr.
3. chrysanthemifolia Vent. ☿. wucherblumenartige C. H.
4. denticulata W. ☿. gezähnte C. H.
5. fruticosa L. ☿. strauchartige C. H.
6. graminifolia L. ☿. grasblättrige C. H.
7. incana W. ☿. bestäubte C. H.
8. officinalis L. ☉. officinelle Fr.
9. pluvialis L. ☉. Regen Fr.
10. sicula W. ☉. sicilianische Fr.
11. stellata Cav. ☉. sternförmige Fr.
12. Tragus Ait. ☿. kupferfarbige C. H.

Calla. Drachenwurz.

1. aethiopica L. 4. aethiopische C. H.

Callicarpa. Schönbeere.

1. americana L. ☿. americanische C. H.
2. cana L. ☿. graue w. H.
3. tomentosa W. ☿. filzige w. H.

Callicoma. Callicome.

1. ferratifolia Andr. sägeblättrige C. H.

Calluna. Callune.

1. vulgaris W. ☿. gemeine Fr.
2. — b. flore pleno. mit gefüllter Blume.
Erica vulgaris W. Sp. pl.

Calomeria. Calomérie.

1. amaranthoides Vent. ♂. schöne C. H.
Hymea elegans Smith.

Calophyllum. Schönblatt.

- Calaba L. ☿. indisches w. H.

Calothamnus. Calothamnus.

1. quadrifidus R. Br. ☿. viertheiliger C. H.
2. villosus R. Br. ☿. filziger C. H.

Callistachys. Callistachys.

1. lanceolata Vent. ☿. lanzettblättrige C. H.
2. ovata Bot. Mag. ☿. eyrunde C. H.

Calotropis. Calotropis.

1. gigantea R. Br. †. riesenmäfsige w. H.
Asclepias gigantea W.

Caltha. Dotterblume.

1. palustris L. †. gemeine Fr.
— b. flore pleno. mit gefüllter Blume Fr.
2. radicans Forst. †. wurzelnde Fr.

Calycanthus. Kelchblume. (Gewürzstrauch)

1. floridus L. †. carolinische Fr.
2. glaucus W. En. †. grauer Fr.
C. fertilis Walt.
3. laevigatus W. glatte Fr.
C. ferax. Mich.
C. nanus Duh.
4. praecox L. †. frühblühende Fr.
Chimonanthus praecox Edwards. Bot. Reg.

Calyptranthes. Deckelmyrte.

1. Chytraculea Sw. †. steifblättrige w. H.
Myrtus Chytraculea L.
2. Suzygium Sw. †. gabelästige w. H.
Myrtus Zuzygeum L.

Calyxhymenia vide Oxybaphus.

Camellia. Camellie.

1. iaponica L. †. iapanische C. H.
2. — b. alba †. weisse C. H.
3. — c. — fl. ql. †. gefüllte C. H.
4. — d. incarnata pl. †. fleischfarbigest. C. H.
5. — e. myrtifolia pl. †. myrtenblättrigest. C. H.
6. — f. paeoniiflora pl. †. gichtrosenblätteste. C. H.
7. — g. purpurea pl. †. dunkelrothgefüllt. C. H.
8. — h. — flore varieg. pl. †. m. buntgest. B.
9. — i. rubra pl. †. rothgefüllte C. H.
10. — k. longifolia langblättrige †. C. H.
11. sasanqua Thunb. †. stumpfblättrige C. H.

Cameraria. Camerarie.

1. dubia H. Berol. †. zweifelhafte w. H.

Campanula. Glockenblume.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. aurea L. 5. goldfarbene C. H.
3. barbata L. 4. rauhblüthige Fr.
4. betonicaefolia M. B. ♂. betonienblättrige Fr.
5. bononiensis L. 4. bologneser Fr.
6. carpatica L. 4. carpatische Fr.
7. caespitosa Scop. 4. rasenbildende Fr.
8. collina M. B. 4. auf Hügel wachsende Fr.
9. dichotoma L. ☉. gabelförmige Fr.
10. divergens W. ♂. ausgesperrte Fr.
11. elongata W. ☉. Hügel. (Glockenblume) Fr.
12. Erinus L. ☉. kleinblüthige Fr.
13. glomerata L. 4. knaulblüthige Fr.
14. grandiflora L. 4. großblumige Fr.
Wahlenbergia grandiflora Schrad.
15. hybrida L. ☉. Bastard Fr.
16. latifolia L. 4. breitblättrige Fr.
17. lilifolia W. et K. 4. lilienblättrige Fr.
18. ligularis Lam. 4. bandförmige Fr.
19. linifolia Jacq. 4. flachsblättrige Fr.
20. lobelioides L. ☉. lobelienartige Fr.
21. macrantha. Fisch. 4. großblumige Fr.
22. macrostachya W. et K. ♂. großsährige Fr.
23. marsupii flora Fisch 4. beutelblüthige Fr.
24. medium L. ♂. schmalblättrige Fr.
25. obliqua Tenor 4. schiefe Fr.
26. patula L. ♂. ausgebreitete Fr.
27. perfoliata L. ☉. durchwachsene Fr.
28. persicifolia L. 4. pfirschblättrige Fr.
29. — b. fl. pleno albo et rubro. roth u. weißgfl. Fr.
30. pulla Jacq. 4. dunkelblaue Fr.
31. punctata Lam. 4. punctirte Fr.
32. pyramidalis L. 4. pyramidenartige Fr.
33. reniformis Pers. 4. nierenblättrige Fr.
34. rhomboidea L. 4. rautenförmige Fr.
35. ruthenica M. B. 4. russische Fr.
36. sibirica L. ♂. sibirische Fr.
37. speculum L. ☉. schönblühende Fr.
38. stylosa Lam. 4. langgriffliche Fr.
39. thyrsoidea L. ♂. straufsblüthige Fr.
40. Trachelium L. 4. gemeine Fr.
41. urticaefolia Schmidt 4. nesselblättrige Fr.
42. versicolor Andr. 4. verschiedenfarbige C. H.

Camphorosma. K a m p f e r k r a u t.

1. monspeliaca L. ♀. rauhblättriges C. H.

Canarina. C a n a r i n e.

1. campanulata W. 4. glockenblüthige C. H.
Campanula canariensis L.

Canella. Z i m m e t.

1. alba W. Sp. pl. ♀. weisser w. H.

Canna. B l u m e n r o h r.

1. angustifolia L. 4. schmalblättriges w. H.
2. coccinea Pers. 4. scharlachrothes w. H.
3. excelsa Wendl. 4. hohes w. W.
4. flaccida Salisb. 4. schlaffblumiges w. H.
5. glauca L. 4. graues w. H.
6. indica L. 4. indianisches w. H.
C. variabilis W. En.
7. — b. foliis variegatis W. mit bunten Blättrn. w. H.
8. — c. lutea W. 4. gelbes w. H.
9. — d. rubra W. 4. rothblühendes w. H.
10. lancifolia Schr. 4. lanzettblättriges w. H.
11. paniculata R. et P. 4. rispenblüthige w. H.
12. rubricaulis Wendl. 4. rothstieliges w. H.

Cannabis. H a n f.

1. sativa L. ☉. gemeiner Fr.

Cantua. C a n t u e.

1. foetida Pers. ♀. stinkende C. H.
Vestia lycioides W. En.
2. pyrifolia Lam. ♀. birnblättrige C. H.

Capparis. C a p e r.

1. Baducca L. ♀. mallabarische w. H.
2. Breynia L. ♀. breynische w. H.
3. cynophallophora L. ♀. langschotige w. H.
4. frondosa L. ♀. buschige w. H.
5. longifolia Sw. ♀. langblättrige w. H.
6. ovata Desf. ♀. eyförmige w. H.
7. saligna Vahl. ♀. weidenblättrige w. H.
8. spinosa L. ♀. stachliche C. H.
9. tenuisiliqua Jacq. ♀. dünnfrüchtige w. H.

Capraria. Herzblume.

1. biflora L. ♀. zweyblumige w. H.
2. lanceolata Link. ♀. lanzettblättrige C. H.
Buddleja glaberrima Herb. Général.
3. undulata L. ♀. wellenförmige C. H.

Capsicum. Beifsbeere.

1. annuum L. ☉. jährige Fr.
fructib. rubris, luteis et rotundis Fr.
mit rothen, gelben und runden Früchten.
2. baccatum L. ♂. kleinfrüchtige w. H.
3. cerasiforme W. ♂. rundfrüchtige w. H.
4. grossum L. ♂. großfrüchtige Fr.
5. nigrum W. ♀. zweyfarbige w. H.
C. bicolor Jacq.
C. violaceum Desf.
6. pendulum W. ♂. hängende w. H.
7. sphaericum W. ☉. kugelfrüchtige Fr.

Cardamine. Schaumkraut.

1. asarifolia L. 4. haselwurzblättriges Fr.
2. bellidifolia L. 4. maßliebenblättriges Fr.
3. hirsuta L. ☉. rauhhaariges Fr.
4. italica H. Crem. ♂. italienisches Fr.
5. pratensis L. 4. gemeines Fr.
6. trifolia L. 4. dreyblättriges Fr.

Cardiospermum. Herzsamen.

1. Halicacabum L. ☉. glatter Fr.
2. grandiflorum Sw. ♀. großblühender Fr.

Carduus. Distel.

1. arabicus L. ☉. arabische Fr.
2. candicans W. et R. ♂. weißliche Fr.
3. carlinaefolius Lam. 4. eberwurzblättrige Fr.
4. cynaroides L. 4. kornblumenartige Fr.
5. defloratus L. 4. Walddistel Fr.
6. lycopifolius Vahl. 4. zigeunerkrautblättrige Fr.
Serratula heterophylla Desf.
7. marianus L. ☉. schöne Fr.
Silybum marianum Gaert.
8. nitidus W. 4. glänzende Fr.
9. peregrinus Retz. ♂. fremde Fr.

Carduus. Distel.

10. Personata Jacq. ♂. Klettenartige Fr.
11. polyanthemus L. ♂. vielblumige Fr.
12. pycnocephalus L. ♂. dichtköpfige Fr.
13. radiatus W. ♀. gestrahlte Fr.
14. syriacus L. ☉. syrische Fr.

Carex. Riedgras.

1. acuta L. ♀. spitziges Fr.
2. arenaria L. ♀. Sand segge do.
3. brizoides L. ♀. zittergrasartiges do.
4. caespitosa L. ♀. Rasen segge do.
5. collina W. ♀. Hügel segge do.
6. cyperoides L. ♀. cyperngrasartiges do.
7. distans L. ♀. entlegenähriges do.
8. divulsa Good. ♀. unterbrochenähriges do.
9. elongata L. ♀. verlängtähriges do.
10. firma Host. ♀. hartblättriges do.
11. flava L. ♀. gelbes do.
12. glauca Scop. ♀. graues do.
13. granularis Mühlenbg. ♀. rundfrüchtiges do.
14. intermedia Good. ♀. mittelmäsiges do.
- C. distycha Schreb.*
15. lagopodioides Schk. ♀. haasenfufsartiges do.
16. laxa Wahlb. ♀. schlaffes do.
17. Oederi Ehrh. ♀. öderisches do.
18. panicea L. ♀. fennigartiges do.
19. pendula Host. ♀. hängendes do.
20. pensylvanica Lam. ♀. pensylvanisches do.
21. plantaginea Lam. ♀. wegbreitblättriges do.
22. praecox. Schreb. ♀. abgestutztes do.
23. stipata Mühlbg. ♀. gedrängtes do.
24. tomentosa L. ♀. filziges do.
25. vulpina L. ♀. Fuchs segge do.

Carica. Melonenbaum.

1. cauliflora Jacq. ♀. westindischer w. H.
2. microcarpa Jacq. ♀. kleiner w. H.
3. monoica Desf. ♀. halbgetrennter w. H.
4. Papaya L. ♀. gemeiner w. H.

Carissa. Carisse.

1. Carandas L. ♀. netzblättrige w. H.

Carlina.

Eberwurz.

1. acaulis L. 4. stammlose Fr.
2. acanthifolia All. 4. krebsdistelblättrige Fr.
3. Biebersteiniana Bernh. 4. Bibersteinische Fr.
4. corymbosa L. 4. doldentraubige Fr.
5. Echinus M. B. ♂. igelige Fr.
6. lanata Pall. ♂. wollige Fr.
7. simplex W. et K. 4. einfache Fr.

Carlowizia.

Carlowizie.

1. salicifolia Moench. ♀. weidenblättr. C. H.
Carthamus salicifolius L.
Onobroma salicifolium Gaert.

Carolinea.

Carolinea.

1. insignis Sw. ansehnliche w. H.
Bombax grandiflorum Cav.
2. princeps L. ♀. fürstliche w. H.
Pachira aquatica Aubl.

Carpesium.

Kragenblume.

1. abrotanoides L. 4. stabwurzartige Fr.
2. cernuum L. ☉. 4. hängende.
3. Wulfenianum Schreb. ♂. Wulfenische Fr.

Carpinus.

Haynbuche.

1. americana W. ♀. americanische Fr.
C. virginiana Mich.
2. Betulus L. ♀. gemeine Fr.
3. — b. quercifolia Desf. ♀. mit Eichblättern Fr.
4. orientalis Lam. ♀. morgenländische Fr.
5. Ostrya L. ♀. Hopfen Fr.
Ostrya vulgaris W.

Carthamus.

Saflor.

1. coeruleus L. 4. blaublühender Fr.
Onobroma coerulea Gaert.
2. creticus L. ☉. cretischer Fr.
Heracantha cretica Fl. Peruv.
3. lanatus L. ☉. wolliger Fr.
Centaurea lanata Dec.
salicifolius vid. Carlowitzia.
4. tinctorius L. ☉. gemeiner Safran Fr.

Carum. Kümel.

1. Carvi L. ♂. gemeiner Fr.
Bunium Carvi M. B.

Caryota. Brennpalme.

1. mitis Lour. ♀. wehrlose w. H.
2. urens L. ♀. ostindische w. H.

Cassia. Cassie.

1. Absus. L. ☉. aegyptische w. H.
2. acuminata L. ♀. zugespitzte w. H.
3. biflora L. ♀. zweyblumige w. H.
4. corymbosa Lam. ♀. doldentraubige C. H.
Fistula vid. *Bactrylobium*.
5. laevigata L. ♀. glatte C. H.
6. marylandica L. ♀. marylandische Fr.
7. multiglandulosa Jacq. ♀. filzige C. H.
C. tomentosa Lam.
8. nictitans L. ☉. virginische C. H.
9. occidentalis L. ♀. westindische C. H.
10. purpurea Jacq. fil. ♀. purpurrothe w. H.
11. Tora L. ☉. viereckigfrüchtige w. H.

Cassine. Cassine.

1. capensis L. ♀. capische C. H.
2. Maurocena L. ♀. lederblättrige C. H.
3. Peraqua Mill. ♀. peraquanische C. H.
4. sphaerocarpa H. Cels. rundfrüchtige C. H.

Castanea. Maronenbaum.

1. pumila W. ♀. Zwerchcastanje Fr.
Fagus pumila L.
— *nana* Duroi.
2. vesca Gaert. ♀. ächter Fr.
Fagus Castanea L.

Casuarina. Streitkolbenbaum.

1. equisetifolia L. ♀. schaftheublättriger C. H.
C. indica Pers.
2. nodiflora Forsk. ♀. kopfblüthiger C. H.
C. verticillata Lam.
3. stricta Ait. ♀. steifer C. H.
C. distyla Vent.

Casuarina. Streitkolbenbaum.

4. torulosa Ait. ♀. gedrehter C. H.
C. suberosa Hortul.

5. truncata H. Cels. abgestutzter C. H.

Catananche. Stärkkraut.

1. coerulea L. ♂. blaues Fr.

2. lutea L. ⊙. gelbes Fr.

Catesbaea. Catesbaec.

1. spinosa L. ♀. dornige w. W.

C. longiflora Sw.

Caucalis. Haftdolde.

1. daucoides L. ⊙. möhrenartige Fr.

2. Gerardi Schwaegr. ⊙. gerardische Fr.

3. hispida Desf. ⊙. steifborstige Fr.

4. humilis Jacq. ⊙. kleine Fr.

5. latifolia L. ⊙. breitblättrige Fr.

6. leptophylla L. ⊙. kleinblumige Fr.

7. littoralis M. B. ⊙. meerstrandwachsende Fr.

8. pulcherrima W. ♂. schönste Fr.

Ceanothus. Säkelbaum.

1. africanus L. ♀. afrikanischer C. H.

2. americanus L. ♀. amerikanischer Fr.

3. — b. microphyllus Mich. kleinblättrigr. Fr.

4. asiaticus L. ♀. asiatischer w. H.

Rhamnus asiaticus Lam.

5. coeruleus Lagas ♀. blaublühender C. H.

6. discolor Vent. ♀. verschiedenfarbiger C. H.

Pomaderris discolor Desf.

7. macrophyllus Desf. ♀. großblättriger w. H.

8. microphyllus Wendl. ♀. kleinblättriger C. H.

Cecropia. Hohlrohr.

1. palmata W. ♀. handförmiges w. H.

2. peltata L. ♀. schildförmiges w. H.

Cedrela. Cedrele.

1. odorata L. ♀. wohlriechende w. H.

Celastrus. *Isidorea* Celaster. *Isidorea*

1. buxifolius L. h. buxblättriger C. H.
2. cassinoides Herit h. cassinenartiger do.
3. cernuus Thunb. h. hängender do.
4. lucidus L. h. glänzender do.
- C. concavus* Lam.
5. multiflorus Lam. vielblumiger do.
- C. hispanicus* Hort. Par.
6. octogonus Herit. h. achteckiger do.
7. pyracanthus L. h. birnblättriger do.
8. scandens L. h. windender (Baummörder) Fr.

Celosia. Hahnenkamm.

1. albida W. ☉. weifslicher Fr.
2. argentea L. ☉. silberähriger Fr.
3. cernua Andr. ☉. hängender Fr.
4. cristata L. ☉. gekrauster Fr.
- b. alba lutea, rubra, crocea, Coccinea w. H.
5. margaritacea L. ☉. perlenartiger Fr.
6. trigyna L. ☉. dreygrifflicher Fr.

Celsia. Celsie.

1. Arcturus L. ♂. gestielte Fr.
2. cretica L. ♂. cretische Fr.
3. heterophylla Desf. 4. verschiedenblättrige Fr.
4. orientalis L. ☉. morgenländische Fr.
5. viscosa L. ☉. klebrige Fr.

Celtis. Zürgelbaum.

1. australis L. h. mittägiger Fr.
2. cordata Desf. h. herzblättriger Fr.
3. crassifolia Mich. h. dickblättriger Fr.
4. micrantha Sw. h. kleinblumiger w. H.
- Rhamnus micranthus* L.
5. occidentalis L. h. amerikanischer Fr.
6. orientalis Mill. h. morgenländischer Fr.
- C. Tournefortii* Lam.
7. sinensis Pers. h. chinesischer Fr.

Cenchrus. Klebgras.

1. echinatus L. ☉. stachliches Fr.
2. tribuloides L. ☉. bürzeldornartiges Fr.

Centaurea. Flockenblume.

1. Adami W. ☉. Adamische Fr.
2. aegyptiaca L. ☉. ägyptische Fr.
3. africana Lam. 4. afrikanische Fr.
4. alba L. 4. weisse Fr.
5. amara L. 4. bittere Fr.
6. aurea Ait. 4. goldfarbige Fr.
7. austriaca W. 4. österreichische Fr.
8. atropurpurea W. et K. ♂. schwarzpurpurfarbene Fr.
9. axillaris W. 4. achselblättrige Fr.
- C. seusana* Will.
- C. stricta* W. et K.
10. banatica H. Pesth. 4. banatische Fr.
11. benedicta L. ☉. benedicten Fr.
12. bracteata Scop. afterblättrige Fr.
13. Calcitrapa L. ♂. sterndistel Fr.
14. Caloccephala W. 4. dickköpfige Fr.
15. cineraria W. 4. aschgraue Fr.
16. coriacea W. et K. 4. lederartige Fr.
17. Crocodylium L. ☉. italienische Fr.
18. Crupina L. ☉. feinblättrige Fr.
19. Cyanus L. ☉. gemeine Fr.
20. dealbata M. B. 4. weifsblättrige Fr.
21. decipiens Thuill. 4. täuschende Fr.
22. diffusa Lam. 4. ausgebreitete Fr.
23. elongata W. En. 4. langstielige Fr.
24. ferox. Desf. 4. portugiesische Fr. et C. H.
25. flosculosa W. 4. strahlenlose Fr.
26. galactites L. ☉. milchstreifige do.
27. glastifolia L. 4. spreukelchige do.
28. Jacea L. 4. gemeine do.
29. intybacea Desf. zichorienblättrige do.
30. Isnardi W. 4. isnardische do.
31. Lippii L. ☉. purpurrothe do.
32. melitensis L. ☉. französische do.
33. montana L. 4. Bergflockenblume do.
34. moschata L. ☉. Bisam do.
35. neglecta W. 4. geringe do.
36. nervosa W. 4. gerippte do.
37. nigra L. ♂. schwarze do.
38. nitens M. B. 4. glänzende do.
39. orientalis L. 4. morgenländische do.
40. phrygia L. 4. phrygische do.
41. pubescens W. 4. weichhaarige do.

Centaurea. *delphinium* **Flockenblume.**

42. pulcherrima W. 24. schönste Fr.
43. pullata L. ♂. schwarzbraune do.
44. ragusina L. ♀. ragusinische C. H.
45. Rhapontica L. 24. pontische Fr.
46. reflexa Lam. 24. krummdornige do.
47. ruthenica Lam. 24. russische do.
48. salmantica L. ⊙. weiße do.
49. scabiosa L. 24. scabiosenartige do.
50. sempervirens L. 24. immergrüne Fr. et C. H.
51. seridis L. 24. spanische Fr.
52. sphaerocephala L. 24. kugliche do.
53. spinosa W. 24. dornige Fr. et C. H.
54. splendens L. ♂. schimmernde Fr.
55. Stoebe L. 24. Stöbische do.
56. sulphurea W. ⊙. schwefelgelbe do.
57. tatarica L. 24. tatarische do.
58. tenuiflora Fisch. 24. zartblühende do.
59. uniflora L. 24. einblumige do.

Centranthus. **Centranthus.**

1. Calcitrapa R. S. ⊙. portugiesischer Fr.
Valeriana Calcitrapa L.
2. ruber. Dec. 24. rother Fr.
Valeriana rubra W. En.

Cephalanthus. **Knopfbaum.**

1. occidentalis L. ♀. abendländischer Fr.

Cephalophora. **Kopfträger.**

1. glauca Cav. 24. meergrüner C. H.

Cerastium. **Hornkraut.**

1. arvense L. 24. ackerliebendes Fr.
2. latifolium L. 24. breitblättriges Fr.
3. pensylvanicum Horn. 24. pensylvanisches Fr.
4. strictum Dec. 24. steifes Fr.
5. tauricum L. 24. taurisches Fr.
6. tenuifolium Pursch. 24. feinblättriges Fr.
7. tomentosum L. 24. filziges Fr.
8. viscosum L. ⊙. klebriges Fr.
9. vulgatum L. ⊙. gemeines Fr.

Ceratonia. **Johannisbrod.**

1. *siliqua* L. ☞. gemeines C. H.

Ceratanthera. **Ceratanthere.**

1. *amomoides* Hornem. 4. ingwerblättrige w. H.
Globba marantina Link.

Cerbera. **Schellenbaum.**

1. *Manghas* L. ☞. ostindischer w. H.
2. *Thevetia* L. ☞. westindischer w. H.

Cercis. **Judasbaum.**

1. *canadensis* L. ☞. canadischer Fr.
2. *siliquastrum* L. ☞. europäischer Fr.
3. — b. fl. alb. mit weissen Blumen.

Ceresia. **Ceresie.**

1. *elegans* Pers. 4. schöne w. H.
Paspalum membranaceum Lam.

Cerinth. **Wachsbume.**

1. *aspera* Roth. ☉. rauhblättrige Fr.
2. *major* L. ☉. grosse Fr.
3. *minor* L. ☉. kleine Fr.

Ceropegia. **Leuchterblume.**

1. *dichotoma* Haw. ☞. gabelförmige w. H.
2. *sagittata* L. ☞. pfeilblättrige w. H.

Cestrum. **Hammerstrauch.**

1. *auriculatum* Herit. ☞. beöhrter w. H.
2. *cauliflorum* Jacq. ☞. stammbühender w. H.
3. *diurnum* L. ☞. tagblühender w. H.
4. *foetidissimum* Jacq. ☞. stinkender w. H.
5. *hirsutum* Jacq. haariger w. H.
6. *laurifolium* Herit. ☞. lorbeerblättriger w. H.
C. grandiflorum Hortul.
7. *macrophyllum* Vent. ☞. grossblättriger w. H.
8. *odontospermum* Jacq. ☞. zahnfrüchtiger w. H.
9. *Parqui* Herit. ☞. ehilischer C. H.
10. *pendulinum* Jacq. ☞. hängender w. H.
11. *salicifolium* Jacq. ☞. weidenblättriger w. H.

Cestrum. Hammerstrauch.

12. tinctorium Jacq. ♀. Färberhammerst. w. H.
13. undulatum R. Br. ♀. wellenblättriger w. H.
14. vespertinum L. ♀. abendblühender w. H.

Jxora alternifolia Jacq.

Chaerophyllum. Kälberkropf.

1. hirsutum L. 4. haariger Fr.
2. sylvestre L. 4. Wald Fr.
3. temulum L. 4. berauschender Fr.

Chamaerops. Zwergpalme.

acaulis vid. Sabal.

excelsa vid. Rhapis.

1. humilis L. ♀. kleine w. H. et C. H.

Phoenix humilis Cav.

Cheilanthes. Schuppenfarn.

1. ferruginea Link. 4. rostfarbiger w. H.
2. lentigera Sw. 4. linsenförmiger w. H.
3. odora Sw. 4. riechender w. H.
4. pteroides Sw. 4. saumfarnartiger w. H.

Cheiranthus. Levcoje.

1. annuus L. ☉. jährige Fr. mit vielen Abarten.
2. callosus Thunb. ♀. dickblättrige C. H.
3. Cheiri L. ♂. ♀. Lack oder gelbe Viole Fr.
4. decumbens W. En. ♂. liegende C. H.
5. erysimoides L. ♂. hederichartige Fr.

Erysimum Cheiranthus Pers.

6. fenestralis L. ♂. Zwerg Fr.

Mathiola fenestralis R. Br.

7. fruticulosus L. ♂. strauchartige Fr.

8. helveticus Jacq. 4. schweizer Fr.

9. ibericus M. B. 4. iberische Fr.

10. incanus L. ♂. Winterleycoje C. H.

— b. mit vielen Abarten.

11. littoreus L. ☉. Uferlevcoje Fr.

Malcolmia littorea Ait.

12. maritimus L. ☉. Meerstrands Fr.

Malcolmia maritima Ait.

13. ochroleucus Hall. ♀. weißgelbe C. H.

14. parvisflorus W. ☉. kleinblüthige Fr.

Mathiola parvisflora R. Br.

Cheiranthus. Leucoje.

15. scoparius Brouss. h. besenartige C. H.
16. sinuatus L. ♂. ausgebogene Fr.
Mathiola sinuata R. Br.
17. tricuspidatus L. ⊙. dreyspitzige Fr.
Mathiola tricuspidata R. Br.
18. tristis L. h. traurende C. H.
Mathiola tristis Ait.

Cheiranthodendron. Cheiranthodendron.

1. platanifolium Humb. h. Platanusblättriger C. H.

Chelidonium. Schöllkraut.

- corniculatum vid. Glaucium.
1. majus L. 4. gemeines Fr.
 2. — b. laciniatum Mill. mit geschlitzten Blättern.

Chelone. Krottenschild.

1. barbata Cav. 4. bartiger Fr.
2. glabra L. 4. glatter Fr.
3. — b. flore albo 4. mit weißer Blume Fr.
4. obliqua L. 4. schiefer Fr.
C. purpurea Mill.

Chenolea. Chenolie.

1. diffusa W. En. h. liegende C. H.
Kochia sericea Ait.
Salsola diffusa Thunb.

Chenopodium. Gänsefuß.

1. album L. ⊙. weißer Fr.
2. altissimum Schrad. ⊙. höchster Fr.
Salsola altissima L.
3. ambrosioides L. ⊙. wohlriechender Fr.
4. anthelminticum L. h. wurmtreibender Fr.
5. aristatum L. ⊙. borstiger Fr.
6. Atriplicis L. ⊙. meldenartiger Fr.
7. Bonus Henricus L. 4. guter Heinrich Fr.
8. crassifolium Desf. ⊙. großblättriger Fr.
9. graveolens W. En. ⊙. angenehmriechender Fr.
10. hybridum L. ⊙. stechapfelblättriger Fr.
11. incisum Desf. ⊙. eingeschnittener Fr.
12. maritimum L. ⊙. Meerstrands.

Chenopodium. Gänsefuß.

13. multifidum L. 4. schlitzblättriger Fr.
14. opulifolium Schrad. ☉. schneeballenblättriger Fr.
15. polyspermum L. ☉. vielsämiger Fr.
16. Quinoa W. ☉. chilischer Fr.
17. rubrum L. ☉. rother Fr.
18. serotinum L. ☉. späther Fr.
19. viride L. ☉. grüner Fr.
20. Vulvaria L. ☉. stinkender Fr.

Chiococca. Schneebeere.

1. racemosa L. ♀. traubenblüthige w. H.

Chionanthus. Schneeglöckchen.

1. virginica L. ♀. virginische Fr.

Chironia. Chironie.

1. baccifera L. ♀. beerentragende C. H.
conferta vid. Erythraea.
Centaurium vid. Erythraea.
2. frutescens L. ♀. strauchartige C. H.
3. linoides L. ♀. linienblättrige C. H.

Chloranthus. Grünblume.

1. inconspicuus Sw. ♀. kleinblättrige w. H.
Nigrina spicata Thunb.
2. elatior ♀. hohe w. H.

Chloris. Chloris.

1. ciliata Sw. ☉. gefranzte Fr.
2. compressa Dec. ☉. niedergebogene Fr.
3. petraea Thunb. 4. Felsen w. H.
Schultesia petraea Spr.
Cynosurus paspaloides Vahl.
4. radiata Sw. ☉ gestrahlte Fr.

Chondrilla. Chondrille.

1. juncea L. ♂. binsenartige Fr.
2. Decandolli Spr. ♂. Decandollische Fr.

Chlorophyllum. Zaunblume.

1. inornatum Cav. 4. unansehnliche w. H.

Chorizema. Chorizeme.

1. illicifolia Labill. †. hülsenblättrige C. II.

Chrysanthemum. Wucherblume.

1. Achilleae L. 4. schaaſgarbenartige Fr.
2. carinatum Schousb. ☉. keilförmige Fr.
3. coccineum W. 4. purpurrothe Fr.
Pyrethrum roseum M. B.
4. coronarium L. ☉. kronenförmige Fr.
5. corymbosum L. 4. doldenblüthige Fr.
6. heterophyllum W. En. 4. verschiedenblättrige Fr.
7. Leucanthemum L. 4. gemeine Fr.
jndicum vid. Anthemis artemisiaefolia.
8. montanum L. 4. bergliebende Fr.
9. moschatum W. 4. bisamduftende Fr.
10. Myconis L. ☉. spanische Fr.
11. rotundifolium W. et R. 4. buntblättrige Fr.
12. sylvestre W. En. 4. waldliebende Fr.

Chrysocoma. Goldhaar.

1. biflora L. 4. zweyblumiges Fr.
2. coma aurea L. †. gemeines C. H.
3. denticulata Jacq. †. gezähntes C. II.
4. graminifolia L. 4. grafsblättriges Fr.
5. Linosyris L. 4. leinblättriges Fr.

Chrysophyllum. Goldblatt.

1. argenteum Jacq. †. ſilberfarbenes w. II.
2. Cainito L. †. Sternapfelbaum w. H.
3. ferrugineum H. Cels. †. roſtfarbiges w. H.
4. glabrum L. †. glattes w. II.

Chrysosplenium. Milzkraut.

1. alternifolium L. 4. wechſelblättriges Fr.
2. oppositifolium L. 4. gegenüberblättriges Fr.

Cicca. Cicca.

1. disticha W. †. zweyzeilige w. H.
Averhoa acida L.

Cicer. Kicher.

1. arietinum L. ☉. gemeine Fr.
2. punctatum H. Vind. ☉. punctirte Fr.

Cichorium. Cichorie.

1. divaricatum Schousb. ☉. ausgesperrte Fr.
2. Endivia L. ☉. Endivie Fr.
3. Intybus L. 4. gemeine Fr.
4. pumilum Jacq. ☉. niedrige Fr.

Cicuta. Wasserschieferling.

1. virosa L. 4. giftiger Fr.

Cimicifuga. Wanzenkraut.

1. foetida W. 4. stinkendes Fr.
Actaea Cimicifuga L.

Cinchona. Fiebertindenbaum.

1. floribunda Sw. St. Luciae w. H.
2. caribaea Vahl h. caribaeischer w. H.
Exostemma caribaea Jacq.

Cineraria. Aschenpflanze.

1. alpina W. 4. Alpen Fr.
Senecio alpinus L.
2. amelloides L. h. amellerartige C. H.
3. aurita W. h. geöhrte C. H.
C. populifolia Herit.
4. bicolor W. h. zweyfarbige C. H.
5. campestris Retz. 4. gemeine Fr.
C. integrifolia pratensis Jacq.
6. cordifolia L. 4. herzblättrige Fr.
7. cruenta W. En. 4. blutige C. H.
C. aurita Andr.
8. elatior Bouché h. hohe C. H.
9. geifolia L. h. geumblättrige C. H.
10. hybrida W. h. Bastard C. H.
11. lanata Herit. h. wollige C. H.
12. — b. fl. alb. h. mit weissen Blumen C. H.
13. maritima L. h. Meerstrands C. H.
14. parviflora Ait. h. kleinblumige C. H.
C. canescens Wendl.
15. Petasites Sims. h. Pestwurzblättrige C. H.
16. praecox Cav. abgestutzte C. H.
17. repanda W. h. ausgeschweifblättrige C. H.
Brachyglottis repanda Forsk.
18. sibirica L. 4. sibirische Fr.

Circaea. Hexenkraut.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. lutetiana L. 4. gemeines Fr.

Cirsium vid. **Cnicus.**

Cissus. Klimme.

1. acida L. 4. saure w. H.
Sicyos trifoliata W. Sp. pl.
2. antarctica Vent. 4. polarische C. H.
C. glandulosa Polr.
3. orientalis Lam. 4. morgenländische C. H.
4. quadrangularis L. 4. viereckige w. H.
5. sicyoides L. 4. stichlingartige w. H.
6. vitiginea L. 4. weinartige w. H.

Cissampelos. Grieswurz.

1. capensis Thunb. capische C. H.

Cistus. Cistenrose.

1. albidus L. 4. weißliche C. H.
2. crispus L. 4. krause C. H.
3. creticus W. 4. cretische C. H.
4. incanus L. 4. bestäubte C. H.
5. ladaniferus L. 4. Ladanum C. H.
6. laurifolius L. 4. lorbeerblättrige C. H.
7. laxus Ait. 4. schlaffe C. H.
8. monspeliensis L. 4. französische C. H.
9. mutabilis Jacq. 4. veränderliche C. H.
10. populifolius L. 4. pappelblättrige C. H.
11. purpureus Lam. 4. purpurrothe C. H.
12. reticulatus Hort. Monac. 4. netzförmige C. H.
13. salvifolius L. 4. salbeyblättrige C. H.
14. vaginatus L. 4. scheidenartige C. H.
C. symphitifolius Lam.
15. villosus L. 4. rauhe C. H.
C. undulatus Moench.

Citharexylon. Geigenholz.

1. caudatum L. 4. ausgerandetes w. H.
C. erectum Sw.
2. cinereum L. 4. graues w. H.
C. teres Jacq. 4.
3. pentandrum Vent. 4. fünsmänniges w. H.
4. quadrangulare L. 4. viereckiges w. H.

Citrus. Orange.

1. Aurantium L. ꝑ. gewöhnliche C. H.
2. — b. dulcis L. ꝑ. süsse C. H.
3. — c. foliis variegatis ꝑ. mit bunt. Blättern C. H.
4. — d. pumilum ꝑ. niedrige C. H.
5. — e. rubrum ꝑ. mit rothem Fleisch C. H.
6. — f. salicifolium ꝑ. weidenblättrige C. H.
Nebst mehreren andern Abarten C. H.
7. decumana L. ꝑ. Pompelmus C. H.
8. japonica Thunb. ꝑ. japanische C. H.
9. medica L. ꝑ. gemeine Citrone C. H.
10. — b. cedra L. ꝑ. Citronat C. H.
11. — c. macrocarpa Hort. ꝑ. grossfrüchtige C. H.
12. — d. microcarpa ꝑ. kleinfrüchtige C. H.
13. — e. paradisiaca L. ꝑ. Paradiesapfel C. H.
14. — f. undulata L. ꝑ. wellenförmige C. H.
15. — g. Limonia L. ꝑ. Limonie C. H.
16. — h. Bergamotta ꝑ. Bergamotten C. H.
17. — i. dulcis ꝑ. süsse Limonie C. H.
18. — k. — fl. plen. gefülltbl. Limonie C. H.
19. trifoliata L. ꝑ. dreyblättrige C. H.
20. stricta H. Cels. ꝑ. steife C. H.
21. Hystrix Dec. ꝑ. vieldornige C. H.

Claytonia. Claytonie.

1. perfoliata W. ☉. durchwachsene Fr.
2. sibirica W. ꝑ. sibirische Fr.

Clematis. Waldrebe.

1. angustifolia Jacq. ꝑ. schmalblättrige Fr.
2. calycina Ait. ꝑ. gekelchte C. H.
C. balearica Lam.
3. cirrhosa L. ꝑ. einfachblättrige C. H.
4. crispa L. ꝑ. krausblättrige C. H.
5. erecta L. ꝑ. aufrechte Fr.
6. flammula L. ꝑ. scharfe Fr.
7. florida Thunb. ꝑ. grossblüthige C. H.
Atragene florida Pers.
— *indica Desf.*
8. glauca W. ꝑ. meergrüne Fr.
9. integrifolia L. ꝑ. einfache Fr.
10. maritima All. ꝑ. Meerstrands Fr.
11. ochroleuca Ait. ꝑ. weifsgelbe Fr.

Clematis. Waldrebe.

12. orientalis L. ♀. morgenländische Fr.
13. sibirica Dec. ♀. sibirische Fr.
14. viorna L. ♀. glockenblüthige Fr.
15. virginiana L. ♀. virginische Fr.
16. Vitalba L. ♀. gemeine Fr.
17. Viticella L. ♀. italienische Fr.
18. — b. fl. plen. blaugefülltblühende Fr.
19. — c. fl. rubr. purpurrothblühende Fr.

Cleome. Cleome.

1. aculeata L. ☉. stachliche w. H.
2. arabica L. ☉. arabische w. H.
3. dodecandra L. ☉. zwölfädige w. H.
4. gigantea L. ♂. riesenartige w. H.
5. icosandra L. ☉. zwanzigädige w. H.
6. pentaphylla L. ☉. fünfblättrige w. H.
7. pungens W. ☉. brennende w. H.
8. spinosa L. ☉. dornige w. H.
9. violacea L. ☉. violette w. H.
10. viscosa L. ☉. klebrige w. H.

Clerodendrum. Loosbaum.

1. fortunatum L. ♀. glücklicher w. H.
2. fragrans W. ♀. wohlriechender C. H.
Volkameria japonica Jacq.
3. phlomoides W. ♀. phlomisartiger w. H.
4. violaceum H. Cels. ♀. violetter w. H.
5. viscosum W. ♀. klebriger w. H.

Clethra. Clethra.

1. alnifolia L. ♀. erlenblättrige Fr.
2. acuminata Mich. ♀. zugespitzte Fr.
3. arborea Ait. ♀. baumartige C. H.
C. maderiensis H. Cels.
4. pubescens W. ♀. weichhaarige Fr.
C. incana Pers.
C. glauca Hortul.

Cliffortia. Cliffortie.

1. illicifolia L. ♀. hülsenblättrige C. H.
2. obcordata Thunb. ♀. verkehrtherzförmige C. H.
3. trifoliata L. ♀. dreyblättrige C. H.

Clinopodium. Wirbelborste.

1. aegyptiacum Lam. 24. ägyptische Fr.
2. incanum Mich. 24. bestäubte Fr.
3. vulgare L. 24. gemeine Fr.
4. — b. fl. alb. mit weissen Blumen.

Clitoria. Clitorisblume.

1. multiflora Sw. 5. vielblüthige w. H.
2. Ternatea L. 24. molukische w. H.
3. virginiana L. 24. virginische C. H.

Clusia. Clusie.

1. flava L. 5. gelbe w. H.
2. rosca L. 5. rothe w. H.

Cluytia. Cluytie.

1. alaternoides L. 5. schmalblättrige C. H.
2. daphnoides W. En. 5. seidelbastblättrige C. H.
3. hirta W. 5. rauhe C. H.
4. polygonoides L. 5. heydekornblättrige C. H.
5. pulchella L. 5. schöne C. H.

Clypeola. Schildkraut.

1. Jonthlaspi L. ☉. liegendes Fr.
maritima vid. Alyssum maritimum.

Cneorum. Zeiland.

1. tricoccon L. 5. dreyköpfiger C. H.

Cnicus. Kratzkraut.

1. Acarna W. ♂. spanisches Fr.
Cirsium Acarna Dec.
2. afer. W. ♂. afrikanisches Fr.
Carduus diacanthus Pers.
3. ambiguus 24. zweifelhaftes Fr.
Cirsium Ambiguum Dec.
4. Casabonae L. ♂. seitenblüthiges Fr.
Cirsium Casabonae Dec.
5. centauroides W. 24. flockenblumenartiges Fr.
6. eriophorus Bernh. wollköpfiges Fr.
7. erysithales W. 24. klebriges Fr.
Carduus erysithales Jacq.

Cnicus. **Kratzkraut.**

8. giganteus W. 4. riesen Fr.
Carduus giganteus Desf.
9. heterophyllus W. 4. verschiedenblättriges Fr.
Carduus heterophyllus L.
10. monspessulanus W. 4. französisches Fr.
Carduus monspessulanus L.
11. munitus M. B. 4. Bach Kratzblume Fr.
12. ochroleucus W. 4. weißgelbes Fr.
13. pannonicus Jacq. ungarisches Fr.
14. rigens W. 4. steifes Fr.
15. stellatus W. ☉. sternförmiges Fr.
Carduus stellatus L.
16. tataricus W. 4. tartarisches Fr.
Carduus tataricus L.

Cobaea. **Cobaea.**

1. scandens Cav. ♀. klimmende C. H.

Coccoloba. **Seetraube.**

1. excoriata L. ♀. rindenlose w. H.
2. latifolia Lam. ♀. breitblättrige w. H.
C. rheifolia Desf.
3. laurifolia Jacq. ♀. lorbeerblättrige w. H.
4. fagifolia Jacq. ♀. buchenblättrige w. H.
5. macrophylla Desf. ♀. großblättrige w. H.
6. pubescens L. ♀. Behaarte w. H.
C. grandifolia Jacq.
7. punctata L. ♀. Punctirte w. H.
C. coronata Jacq.
8. uvifera L. ♀. gemeine w. H.

Cochlearia. **Löffelkraut.**

1. Armoracea L. 4. gemeiner Meerretig Fr.
coronopus vid. *Senebiera*.
2. danica L. ♂. dänisches Fr.
3. draba L. 4. stielumfassendes Fr.
4. glastifolia W. ♂. thurmkrautblättriges Fr.
5. macrocarpa W. et K. 4. großfrüchtiges Fr.
6. officinalis L. ☉. ächtes Löffelkraut Fr.

Cocos. **Cocospalme.**

1. nucifera L. ♀. gemeine w. H.

Coffea. Caffee.

1. arabica L. ♀. gemeiner w. H.

Coix Thränengras.

1. Lacryma L. ☉. gemeines Fr.

Colchicum. Zeitlose.

1. autumnale L. ♀. Herbst Fr.
— b. fl. plen. mit gefüllten Blumen Fr.
2. byzantinum Gawl. ♀. byzantinische C. H.

Collinsonia. Collinsonie.

1. canadensis W. ♀. canadische Fr.

Columnea vid. Trevirana.

Colutea. Blasenstrauch.

1. arborescens L. ♀. baumartiger Fr.
2. cruenta W. ♀. rother Fr.
C. orientalis Duroi.
3. frutescens W. ♂. strauchartiger C. H.
Sutherlandia frutescens Ait.
herbacea vid. Lessertia.
perennans vid. Lessertia.
4. Pocokii Ait. ♀. Pocokische Fr.

Comarum. Comarum.

1. palustre L. ♀. sumpfliebendes Fr.

Commelina. Commeline.

1. africana L. ♀. afrikanische C. H.
2. caroliniana Walt. ♀. carolinische C. H.
3. erecta W. ♀. aufrechte C. H.
4. japonica Thunb. ♀. japanische C. H.
5. pallida W. ♀. Blafsblaue C. H.
6. polygama Roth. ☉. zwitterblüthige Fr.
7. tuberosa L. ♀. knollige C. H.

Comptonia. Comptonie.

1. asplenifolia Ait. ♀. strichfarnblättrige Fr.
Liquidambar asplenifolia L.

Conchium vid. Hakea.

Conium.

Schierling.

1. croaticum W. et K. ♂. croatischer Fr.
2. maculatum L. ♂. gefleckter Fr.
3. sibiricum Pall. ♂. sibirischer Fr.

Convallaria.

Mayblume.

1. bifolia L. 4. zweyblättrige Fr.
2. japonica L. 4. japanische Fr.
Ophiopogon japonicus Ker.
3. latifolia Jacq. 4. breitblättrige Fr.
Polygonatum latifolium Desf.
4. majalis L. 4. gemeine Fr.
5. — b. fl. plen. mit gefüllter Blume Fr.
6. — c. — rubro. mit rother Blume Fr.
7. multiflora L. 4. vielblumige Fr.
8. Polygonatum L. 4. weifswurzliche Fr.
Polygonatum vulgare Desf.
9. racemosa L. 4. traubenblüthige Fr.
10. stellata L. 4. sternförmige Fr.

Convolvulus.

Winde.

1. althaeoides L. 4. eibischartige C. H.
2. arvensis L. 4. Ackerliebende Fr.
3. Batatas L. 4. Bataten w. H.
4. bryoniaefolius W. ♀. zaunrübenblättrige C. H.
5. cantabrica L. ♀. cantabrische C. H.
6. Cneorum L. ♀. candische C. H.
7. elongatus W. ⊙. verlängerte Fr.
8. evolvuloides Desf. ⊙. evolvulusähnliche Fr.
9. farinosus L. ⊙. mehliges Fr.
10. hermaniae W. ♀. weifsblättrige C. H.
11. lineatus L. 4. gestrichelte Fr.
12. maximus W. ♀. größte w. H.
13. Nil W. ⊙. ägyptische Fr.
Ipomea Nil L.
14. pentapetaloides L. ⊙. fünfblättrige Fr.
15. pescaprae L. ⊙. zweyspaltige Fr.
16. purpureus L. ⊙. purpurfarbene Fr.
17. reniformis Poir 4. nierenförmige C. H.
Calystegia reniformis R. Br.
18. Scammonia L. ♀. Purgier Winde C. H.

Convolvulus. Winde.

19. sepium L. 4. Zaun Winde Fr.
Calystegia Sepium R. Br.
20. sicularis L. ☉. sicilische Fr.
21. Soldanella W. 4. Meerstrands Fr.
22. speciosus W. 4. prächtige w. H.
C. nervosus Burm.
Ipomea speciosa Roth.
23. tricolor L. ☉. dreyfarbige Fr.

Conyza. Dürrwurz.

1. aegyptiaca W. ☉. ägyptische Fr.
2. axillaris W. 4. achselblättrige Fr.
3. bifrons W. 4. spatelblättrige Fr.
4. ciliaris Spr. 4. gefranzte C. H.
5. Gouani W. ☉. Gouans Fr.
Erigeron Gouani L.
6. saxatilis L. 4. Stein Dürrwurz C. H.
7. squarrosa L. ♂. deutsche Fr.
8. thapsoides W. 4. königskerzenartige Fr.
9. verbascifolia W. 4. königskerzenblättrige C. H.

Coptis. Coptis.

1. trifoliata Salisb. 4. dreyblättrige Fr.
Helleborus trifolius L.

Cookia. Cookie.

1. punctata Jacq. 4. punctirte w. H.

Corchorus. Muspflanze.

1. aestuans L. ☉. weisse w. H.
2. capsularis L. ☉. rundfrüchtige w. H.
3. hirsutus Jacq. ☉. zottige w. H.
4. japonicus Thunb. 4. japanische Fr.
Kerria japonica Dec.
Rubus japonicus L.
5. trilocularis L. ☉. dreyfächrige Fr.

Cordia. Brustbeere.

1. denticata Poir 4. gezahnte w. H.
2. Sebestena L. 4. Sebesten w. H.
3. scabra Desf. 4. rauhe w. H.

Coreopsis. Wanzenblume.

1. alata Cav. 2. geflügelte C. H. et Fr.
 2. alternifolia L. 2. wechselblättrige Fr.
 3. auriculata L. 2. geöhrte Fr.
 4. ferulaefolia Jacq. 2. steckenkrautblättrige C.H.etFr.
 5. procera W. 2. hohe Fr.
 6. tinctoria ☉. Färber Fr.
 7. tenuifolia Ehrh. 2. feinblättrige Fr.
 8. tripteris L. 2. dreyblättrige Fr.
 9. — b. undulata 2. wellenförmige Fr.
 10. verticillata L. 2. wirtelblättrige Fr.
- C. delphinifolia* Lam.

Coriandrum. Coriander.

1. sativum L. ☉. gemeiner Fr.
2. testiculatum L. ☉. wilder Fr.

Coriaria. Gerberstrauch.

1. myrtifolia L. Mas. et Foem. ʒ. myrtenblättrig. C.H.

Coris. Erdkiefer.

1. monspeliensis L. ♂. Blauer C. H.

Corispermum. Wanzensaame.

1. canescens W. et K. ☉. grauer Fr.
2. hyssopifolium L. ☉. ysopblättriger Fr.
3. squarrosum L. ☉. sparrichter Fr.

Cornucopiae. Füllhorngras.

1. cucullatum L. ☉. orientalisches Fr.

Cornus. Hartriegel.

1. alba L. ʒ. weißer Fr.
 2. — b. foliis varieg. mit bunten Blättern Fr.
 3. albida Ehrh. ʒ. weißlichter Fr.
- C. paniculata* Herit.
4. alternifolia L. ʒ. wechselblättriger Fr.
 5. canadensis L. 2. canadischer Fr.
 6. circinata Herit. ʒ. rundblättriger Fr.
- C. verrucosa* Hortul.
7. fastigiata Mich. ʒ. hoher Fr.
- C. stricta* Herit.

Cornus. *Hartriegel.*

8. florida L. ♀. schönblühender Fr.
 9. mascula L. ♀. gemeine Cornel Kirsche Fr.
 10. — b. fructu luteo. mit gelber Frucht Fr.
 11. — c. foliis variegatis. mit bunten Blättern Fr.
 12. sanguinea L. ♀. rother Fr.
 13. — b. foliis varieg. mit bunten Blättern Fr.
 14. sericea L. ♀. rostfarbiger Fr.
- C. amomum Duroi.*

Cornutia vid. *Hosta.*

Coronilla. *Kronwicke.*

1. coronata L. 4. gekrönte Fr.
C. fruticosa Jacq.
2. cretica L. ☉. cretische Fr.
3. Emerus L. ♀. Scorpionssenne Fr.
4. glauca L. ♀. eisengraue C. H.
5. iberica M. B. 4. iberische Fr.
6. juncea W. En. ♀. binsenartige C. H.
7. minima L. ♀. kleinste C. H.
8. securidaca L. ☉. beilkrautartige Fr.
9. valentina L. ♀. valentinische C. H.
10. varia L. 4. bunte Vogelwicke Fr.

Correa. *Correa.*

1. alba Andr. ♀. weisse C. H.
 2. speciosa Andr. ♀. prächtige C. H.
 3. virens Smith. ♀. grünende C. H.
- C. viridiflora Andr.*

Corrigiola. *Hirschsprung.*

1. littoralis L. ☉. Sand Fr.

Cortusa. *Cortusc.*

1. Mathioli L. 4. europäische Fr.

Corydalis. *Kappenmohn.*

1. aurea W. ♂. goldner Fr.
Fumaria aurea Mühlbg.
2. bulbosa W. 4. holzwurzliger Fr.
Fumaria bulbosa L.

Corydalis. Kappenmohn.

3. capnoides W. ☉. weißer Fr.
Fumaria capnoides L.
4. Formosa Pursch. 24. prächtiger Fr.
5. fungosa W. ♂. kletternder Fr.
Fumaria fungosa L.
6. lutea W. 24. gelber Fr.
Fumaria lutea L.
7. nobilis W. 24. edler Fr.
Fumaria nobilis L.
8. sempervirens W. ♂. immergrüner Fr.
Fumaria sempervirens L.

Corylus. Haselnufs.

1. americana Mich. ♀. amerikanische Fr.
2. Avellana L. ♀. gemeine Fr.
3. — b. oblonga ♀. Mandel Fr.
4. — c. fructu rubro ♀. mit rother Frucht Fr.
5. — d. fructu maximo ♀. Lampertsnuß Fr.
6. Columna L. ♀. türkische Fr.
7. cornuta Duroi. ♀. gehörnte Fr.
C. rostrata Ait.

Corypha minor vid. Sabal.

Cosmea. Cosmee.

1. bipinnata Cav. ☉. doppeltgefiederte Fr.
2. parviflora W. ☉. kleinblüthige Fr.
Coreopsis parviflora Cav.
3. sulphurea Cav. ☉. schwefelgelbe Fr.
Coreopsis artemisiaefolia Jacq.

Costus. Costwurz.

1. speciosus Smith. 24. schöne w. H.
Amomum hirsutum Lam.
Costus arabicus L.

Cotula. Laugenblume.

1. anthemoides W. ☉. kamillenartige Fr.
2. coronopifolia L. ☉. krähensfußblättrige Fr.
3. cuneifolia W. ☉. keilblättrige Fr.

Cotyledon. **Nabelkraut.**

1. canaliculata Haw. ♀. rinnenförmiges C. H.
2. coccinea Cav. ♀. scharlachrothes C. H.
3. fascicularis W. ♀. büschelförmiges C. H.
4. jasminiflora Hort. Dyk. jasminblüthiges C. H.
5. haemisphaerica W. ♀. halbkugelförmiges C. H.
6. lutea W. ♀. gelbes C. H.
7. maculata Hort. Dyk. ♀. geflecktes C. H.
8. oblonga Haw. ♀. gezogenblättriges C. H.
9. ovata Haw. ♀. eyrundblättriges C. H.
10. orbiculata Haw. ♀. kreisblättriges C. H.
11. papillaris Thunb. ♀. warzentragendes C. H.
12. ramosissima Hort. Dyk. ♀. vielästiges C. H.
13. reflexa W. ♀. rückwärtsgebogenes C. H.

C. caespitosa Haw.

14. spuria Haw. ♀. Bastard C. H.
15. tuberculata Dec. ♀. warziges C. H.
16. umbilicus W. ♀. gemeines C. H.
17. unguolata Dec. ♀. hufblättriges C. H.

Crambe. **Meerkohl.**

1. cordifolia Jacq. 4. herzblättriger Fr.
2. filiformis Jacq. ☉. fadenförmiger Fr.
3. hispanica L. ☉. spanischer Fr.
4. maritima L. 4. gemeiner Fr.
5. strigosa Herit ♀. strieglichter C. H.

Crassula. **Dickblatt.**

1. acutifolia W. ♀. spitzblättriges C. H.
 2. arborescens W. Haw. ♀. baumartiges C. H.
- C. cotyledon* Jacq.
3. capitata Dum. Cours. ♀. kopfförmiges C. H.
 4. ciliata Haw. ♀. gefranztes C. H.
 5. columnaris Haw. ♀. strunkartiges C. H.
 6. cordata W. Haw. ♀. herzblättriges C. H.
 7. corymbulosa Hort. Berol. ♀. doldentraubiges C. H.
 8. cultrata W. Haw. ♀. messerförmiges C. H.
 9. dejecta Jacq. ♀. abwärtsgebogenes C. H.
- falcata* vid. Rochea.
10. imbricata W. ♀. schuppenförmiges C. H.
 11. marginalis W. Haw. hautrandiges C. H.
 12. mollis Haw. ♀. weiches C. H.
 13. nudicaulis W. Haw. ♀. nacktstängliges C. H.
- odoratissima* vid. Rochea.

Crassula. Dickblatt.

14. obvallata W. h. verschanztes C. H.
15. orbicularis W. h. sternblättriges C. H.
16. perforata W. h. durchstochenes C. H.
C. perfossa Dec.
C. perfilata Haw.
17. ramiflora Hort. Berol. astblumiges C. H.
18. rubens W. Haw. h. röthliches C. H.
19. scabra Haw. h. rauhaariges C. H.
20. spathulata W. Haw. h. spatelblättriges C. H.
21. squammulosa Haw. h. schuppiges C. H.
22. tetragona W. h. viereckiges C. H.

Crataegus vid. Mespilus.

Crataeva. Crataeve.

1. capparoides Andr. h. cappernartige w. H.
C. fragrans Curt.
2. gynandra L. h. westindische w. H.

Cremastostemon. Hängfaden.

1. capense Jacq. h. capischer w. H.

Crepis. Pippau.

1. albida Vill. 4. weißer Fr.
2. alpina L. ☉. Alpen Fr.
Borkhausia alpina Dec.
3. aspera L. ☉. scharfstieliger Fr.
barbata vid. Tolpis.
4. biennis L. ♂. zweyjähriger Fr.
5. croatica W. K. ☉. croatischer Fr.
6. Gmelini S. et R. ☉. Gmelinischer Fr.
7. hispida W. et K. ☉. borstiger Fr.
8. leontodontoides W. ♂. löwenzahnblättriger Fr.
Lagoseris leontodontoides Link.
9. pinnatifida W. ☉. schlitzblättriger Fr.
10. rigida W. et K. 4. steifer Fr.
rubra vid. Tolpis.
11. Sprengeriana W. ☉. ausgebreiteter Fr.
12. tauriensis W. ☉. taurinischer Fr.
13. tectorum L. ☉. gemeiner Fr.

Crescentia. Kürbisbaum.

1. Cujete L. h. großfrüchtiger w. H.
2. cucurbitina L. h. kleinfrüchtiger w. H.

Crinum. Hakenlilie.

1. americanum L. 4. amerikanisch w. H.
2. asiaticum L. 4. asiatische w. H.
africanum vid. Agapanthus.
3. bracteatum W. 4. beblätterte w. W.
4. Commelini Jacq. 4. schmalblättrige w. H.
5. erubescens Ait. 4. kleine w. H.
6. moluccanum Ker. 4. moluckische w. H.

Crithmum. Bacille.

1. maritimum L. 4. Meerstrands C. H.

Crocus. Safran.

1. maesiacus Curt. 4. Mäsanischer Fr.
2. sativus L. 4. ächter Fr.
3. vernus Smith 4. Frühlings Fr.
Mit vielen Abarten

Crotalaria. Klapperschote.

1. arborescens Lam. 4. baumartige C. H.
C. capensis Thunb.
2. incana L. 4. graue Fr.
3. pubera Vahl 4. behaarte Fr.
4. retusa L. 4. ausgerandete w. H.
5. sagittalis L. 4. pfeilförmige Fr.
6. verrucosa L. 4. vierkantige Fr.

Croton. Krebsblume.

1. lacerum Desf. 4. geschlitztblättrige w. H.
C. palmatum H. Cels.
2. penicillatum Vent. 4. pinseldrüsig w. H.
3. pungens Jacq. 4. purgirende w. H.
4. sebiferum L. 4. talgtragende w. H.
5. tomentosum H. Cels. 4. filzige w. H.
6. variegatum L. 4. bunte w. H.

Crowea. Crowee.

1. saligna Vent. 4. weidenblättrige C. H.

Crucianella. Kreuzblatt.

1. angustifolia L. 4. schmalblättriges Fr.
2. — b. spicata Lam.

Crucianella. **Kreutzblatt.**

3. ciliata Lam. ☉. gefranztes Fr.
4. maritima L. ☿. Meerstrands Fr.
5. molluginoides W. 4. weichlingblättriges Fr.
6. monspeliaca L. ☉. französisches Fr.
7. patula L. ☉. ausgebreitetes Fr.

Crypsis. **Scheidenähre.**

1. aculeata Ait. ☉. dornige Fr.
Schoenus aculeatus L.
2. alopecuroides W. En. ☉. fuchsschwanzähnliche Fr.
3. schoenoides W. En. ☉. kameelhennartige Fr.
Phleum schoenoides L. ☉.

Cryptostegia. **Cryptostegie.**

1. grandiflora R. Br. ☿. großblumige w. H.
Nerium grandiflorum Desf.

Cucubalus. **Taubenkropf.**

1. Behen L. 4. aufgeblasener Fr.
2. catholicus W. 4. sicilianischer Fr.
3. fimbriatus M. B. 4. gefranzter Fr.
4. mollissimus L. 4. weicher Fr.
Silene mollissima Pers. }
5. multiflorus W. En. ♂. vielblüthiger Fr.
6. Otites W. En. 4. feldliebender Fr.
7. parviflorus W. En. 4. kleinblühender Fr.
8. pilosus W. et R. ♂. haariger Fr.
9. sibiricus L. 4. sibirischer Fr.
10. stellatus L. 4. sternförmiger Fr.
11. tataricus W. En. 4. tatarischer Fr.
12. viscosus W. En. 4. klebriger Fr.

Cucumis. **Kukummer.**

1. anguinus L. ☉. Schlangengurke Fr.
2. Chate L. ☉. arabische Fr.
3. Colocynthis L. ☉. Coloquinten Fr.
4. Dudaim L. ☉. Persische Fr.
5. flexuosus L. ☉. türkische Fr.
6. Melo L. ☉. Melone Fr.
7. prophetarum L. ☉. Prophetengurke Fr.
C. grossularioides Hortul.
8. sativus L. ☉. gemeine Fr.

Cucurbita. Kürbis.

1. aurantiaca W. ☉. goldgelbe Fr.
2. Citrullus L. ☉. Wassermelone Fr.
3. hispida L. ☉. haarige Fr.
4. lagenaria L. ☉. Flaschenkürbis Fr.
5. Pepo L. ☉. gemeine Fr.
— b. vulgaris oblongus, pyriformis, ovatus turbinatus etc.

Mit länglichen, hirnförmigen, eyrunden Früchten etc.

6. verrucosa L. ☉. Warzenkürbis Fr.

Cuminum. Kreuzkümmel.

1. Cyminum L. ☉. römischer Fr.

Cunnighamia. Cunnighamie.

1. sinensis H. Cels. ☿. chinesische C. H.

Cuphea. Cuphea.

1. decandra Ait. ☿. zehenmännige w. H.
Lythrum ciliatum Sw.
2. viscosissima Jacq. ☉. klebrige Fr.
Lythrum Cuphea L.

Cupressus. Cypresse.

1. africana Mill. ☿. africanische C. H.
2. bacciformis W. ☿. beerige C. H.
3. disticha L. ☿. zweyzeilige Fr.
C. americana Catesb.
4. juniperoides L. ☿. wachholderartige C. H.
5. pendula Herit. ☿. hängende C. H.
C. lusitanica Mill.
6. sempervirens L. ☿. gemeine C. H.
7. — b. horizontalis ☿. wagerechte C. H.
— *C. expansa* H. Par.
8. thyoides L. ☿. weisse Fr.

Curcuma. Curcume.

1. longa L. ♀. lange w. H.
Amomum Curcuma Murr.
2. rotunda L. ♀. runde w. H.
3. speciosa Hort. angl. ♀. prächtige w. H.
C. Zedoaria Rosc.
C. Zerumbet Roxb.

Curtisia. **Curtisie.**

1. faginea Thunb. h. buschblättrige C. H.

Cussonia. **Cussonie.**

1. quercifolia H. C. h. eichblättrige w. H.
2. spicata Thunb. h. lanzettblättrige C. H.
3. thyrsiflora Thunb. h. kleinblättrige C. H.

Cycas. **Sagopalme.**

1. circinalis L. h. gemeine w. H.
2. revoluta Thunb. h. zurückgerollte w. H.

Cyclamen. **Erdscheibe.**

1. coum Ait. 4. rundblättrige C. H.
2. europaeum L. 4. europäische C. H.
3. hедераefolium Ait. 4. epheublättrige C. H.
4. persicum Mill. 4. persische C. H.

Cydonia. **Quitte.**

1. chinensis Thouin. h. chinesische Fr.
Pyrus sinensis Poir.
2. japonica Pers. h. japanische C. H.
Pyrus japonica Thunb.
3. — b. flore albo h. mit weißer Blume C. H.
4. vulgaris W. En. h. gemeine Quitte Fr.
5. — b. lusitanica h. portugiesische Fr.
6. — c. pomiformis h. Apfel Fr.
7. — d. pyriformis h. Birn Fr.

Cymbidium. **Kahnlippe.**

1. aloifolium W. 4. aloeblättrige w. H.
Epidendron aloifolium Pers.
2. altum W. 4. hohe.
Limodorum altum L.
3. ensifolium Sw. 4. schwerdblättrige w. H.
Epidendrum ensifolium L.
4. sinense W. 4. chinesische w. H.
Epidendron sinense Andr.
5. verecundum Sw. 4. faltige w. H.
Limodorum verecundum Salisb.
Bletia verecunda Ait.

Cynanchum.

Hundswürger.

1. acutum L. 4. spitziger Fr.
2. erectum L. 5. aufrechter Fr.
3. fuscum Link 4. brauner Fr.
Asclepias fuscata W.
4. nigrum R. Br. 4. schwarzer Fr.
Asclepias nigra L.
5. sibiricum R. Br. 4. sibirischer Fr.
Asclepias sibirica L.
6. suberosum L. 4. korkstieliger Fr.
7. Vincetoxicum R. Br. 4. gemeiner Fr.
Asclepias Vincetoxicum L.

Cynara.

Artischoke.

1. Cardunculus L. ♂. spanische Fr.
2. Scolymus L. 4. gemeine Fr.

Cynoglossum.

Hundszunge.

1. bicolor W. En. ♂. zweyfarbige Fr.
2. cheirifolium L. ♂. leucojenblättrige Fr.
3. clandestinum Desf. ♂. heimlichblühende Fr.
4. linifolium L. ☉. flachsblättrige Fr.
Omphalodes linifolia Fl. Port.
5. officinale L. ♂. gemeine Fr.
6. omphalodes L. 4. Frühlingsvergiftsmeinnicht Fr.
Omphalodes verna. Fl. Port.
7. pictum Ait. ♂. bunte Fr.
8. virginicum L. ♂. virginische Fr.

Cynosurus.

Kammgras.

1. aureus L. ☉. goldenes Fr.
Chrysurus cynosuroides Pers.
2. cristatus L. 4. gemeines Fr.
3. echinatus L. ☉. hackenförmiges Fr.

Cyperus.

Cyperngras.

1. alopecuroides Rothb. 4. fuchsschwanzartiges C.H.
2. alternifolius L. 4. wechselblättriges w. H.
3. articulatus L. 4. gegliedertes w. H.
C. nodosus W. En.
4. compressus L. 4. niedergedrücktes Fr.
5. conglomeratus Roth. ☉. gehäuftkrautiges Fr.
6. dives Delil. 4. kostbares w. H.

Cyperus. Cypcrngras.

7. esculentus L. 4. essbares C. H.
8. globosus All. 4. kugeliges Fr.
9. longus L. 4. langwurzliches C. H. et Fr.
10. mucronatus Vahl. 4. spitziges w. H.
11. Papyrus L. 4. Papiergras w. H.
Papyrus antiquorum Humb.
12. Paramatta Mart. ☉. prächtiges w. H.
C. spectabilis Schreb.
13. polycephalus Link. 4. vielköpfiges C. H.
14. polystachyus Rottb. 4. vielähriges C. H.
15. scaber H. Madr. ☉. rauher Fr.
16. strigosus L. 4. strigeliges Fr.
17. tenuiflorus Jacq. 4. zartblühendes C. H.
18. vegetus W. 4. lebhaftes C. H.
19. viscosus Sw. 4. klebriges w. H.

Cypripedium. Frauenschuh.

1. Calceolus L. 4. gemeiner Fr.

Cyrilla. Cyrille.

- pulchella vid. Trevirana coccinea.
1. racemiflora L. 4. rispenblühende C. H.
Itea Cyrilla Sw.
— *caroliniana* Lam.
spinosa vid. Bursaria.

Cyrtanthus. Bogenlilie.

1. angustifolius Ait. 4. schmalblättrige w. H.
Crinum angustifolium L.
2. obliquus Ait. 4. großblüthige w. H.
Amaryllis umbellatus Herit.

Cysticapnos. Blasenrauch.

1. africana W. En. ☉. africanischer Fr.
Fumaria vesicaria L.

Cytisus. Bohnenbaum.

1. alpinus W. 4. Alpen Fr.
C. Laburnum b. latifolium Pers.
2. argenteus L. 4. silberfarbner C. H.
3. austriacus L. 4. österreichischer Fr.
4. biflorus Ait. 4. zweyblumiger Fr.

Cytisus. **Bohnenbaum.**

5. *Cajan* L. ♀. indischer w. H.
 Cajanus flavus Dec.
6. *capitatus* Jacq. ♀. kopfförmiger Fr.
7. *elongatus* W. et K. ♀. banatischer Fr.
8. *falcatus* W. et K. ♀. sichelartiger Fr.
9. *foliosus* Herit. ♀. beblätterter C. H.
 Adenocarpus foliosus Dec.
10. *hirsutus* L. ♀. haariger C. H.
11. *Laburnum* L. ♀. gemeiner Fr.
12. — b. *quercifolius* ♀. mit Eichblättern Fr.
13. *nigricans* L. ♀. schwärzlicher Fr.
14. *proliferus* L. ♀. sprossender C. H.
15. *purpureus* Scop. ♀. rother Fr.
16. *sericeus* W. ♀. seidenartiger C. H.
17. *sessilifolius* L. ♀. italienischer Fr.
18. *supinus* Jacq. ♀. niedriger Fr.
 tener vid. *Spartium*.
19. *wolgaricus* L. ♀. Wolgarischer Fr.

Calycotome vid. *Spartium*.

D.

Dactylis. **Knaulgras.**

1. *glomerata* L. 4. gemeines Fr.
2. *glaucescens* W. En. 4. gräulichtes Fr.
3. *hispanica* W. En. 4. spanisches Fr.

Dahlia vid. **Georgina.**

Dais. **Dais.**

1. *cotinifolia* L. ♀. perückenbaumblättrige C. H.
 Dais laurifolia Jacq.

Dalbergia. **Dalbergie.**

1. *arborea* W. ♀. baumartige w. H.
2. *scandens* . ? ♀. klimmende w. H.

Dalea. **Dalea.**

1. *alopecuroides* W. ☉. fuchsschwanzartige Fr.
 Psoralea leporina Ait.
3. *Thouini* Schrk. ☉. Thouinische Fr.

Dalechampia. Dalechampie.

1. scandens L. ♀. kletternde w. H.

Dalibarda. Dalibarde.

1. fragarioides Mich. 2. erdbeerblättrige Fr.
Dryas trifoliata Pall.

Danthonia vid. Avena.

Daphne. Seidelbast.

1. alpina L. ♀. Alpen Fr.
2. altaica Pall. ♀. sibirischer Fr.
3. Cneorum L. ♀. rosmarinblättriger Fr.
4. b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
5. collina Smith. ♀. stumpfblättriger C. H.
6. Gnidium L. ♀. rispenblüthiger C. H.
7. Laureola L. ♀. lorbeerblättriger Fr.
8. Mezereum L. ♀. gemeiner Fr.
9. — b. fl. alb. ♀. mit weissen Blumen Fr.
10. odora Thunb. ♀. wohlriechender C. H.
11. — b. marginata H. Cels ♀. mit gelbrandigen Blättern C. H.
12. oleifolia L. ♀. olivenbaumblättriger C. H.
13. pontica L. ♀. pontischer C. H.
14. Tartonraira L. ♀. silberblättriger C. H.
15. villosa L. ♀. wolliger C. H.

Datisca. Strichkraut.

1. cannabina L. 2. hanfartiges Fr.

Datura. Stechapfel.

1. arborea L. ♀. baumartiger C. H.
Brugmansia candida Pers.
2. ceratocaula Jacq. ☉. gehörnter Fr.
3. fastuosa L. ☉. schöner Fr.
4. ferox L. ☉. langdorniger Fr.
5. laevis L. ☉. glattfrüchtiger Fr.
6. Metel L. ☉. weisser Fr.
7. stramonium L. ☉. gemeiner Fr.
8. Tatula L. ☉. blafsblauer Fr.

Daucus. Mohrrübe.

1. Carota L. ♂. gemeine Fr.
2. Gingidium L. ☉. französische Fr.

Daucus. Mohrrübe.

3. — b. polygamus Jacq. ☉. vielweibige Fr.
 4. hispidus Desf. ☉. haarige Fr.
 5. lucidus L. ☉. glänzende Fr.
 6. mauritanicus L. ☉. mauritanische Fr.
 7. muricatus L. ☉. stachelsaamige Fr.
 8. Visnaga W. ☉. glattsamige Fr.
- Ammi Visnaga Lam.*

Davallia. Davallie.

1. canariensis Smith 4. canarische C. H.
Trichomanes canariensis L.
2. pixidata Sw. 4. büchsentragende w. H.

Decumaria. Decumarie.

1. barbara L. 5. gemeine C. H.
2. sarmentosa Bosc. 5. kletternde C. H.
Forsythia scandens Walt.

Delphinium. Rittersporn.

1. Ajacis L. ☉. Garten Fr.
2. — b. fl. plen. ☉. mit gefüllten Blumen Fr.
3. azureum Mich. 4. himmelblauer Fr.
D. carolinianum Walt.
4. cheilanthum Fisch. 4. schuppenartiger Fr.
5. Consolida L. ☉. Feld Rittersporn Fr.
6. elatum W. 4. hohe Fr.
7. exaltatum Ait. 4. amerikanischer Fr.
D. tridactylum Mich.
8. formosum Hort. Monac. 4. schöner Fr.
9. grandiflorum L. 4. großblüthiger Fr.
10. — b. fl. plen. 4. mit gefüllten Blumen Fr.
11. — c. chinense Fisch. 4. chinesischer Fr.
12. hirsutum Roth 4. rauher Fr.
13. hybridum W. 4. Bastard Fr.
14. intermedium Ait. 4. mittlerer Fr.
15. — b. alpinum Dec. 4. Alpen Fr.
16. laxiflorum Dec. 4. schlaffblüthiger Fr.
17. palmatifidum Dec. 4. handförmiger Fr.
18. pictum W. ♂. bunter Fr.
19. puniceum Pall. 4. rothbrauner Fr.
20. Requierii Dec. ♂. Requierischer Fr.
21. revolutum Dec. 4. zurückgerollter Fr.

Delphinium. Rittersporn.

- 22. speciosum M. B. 4. prächtiger Fr.
- 23. spurium Fisch. 4. unächter Fr.
- 24. staphysagria L. ♂. scharfer Fr.
- 25. urceolatum Jacq. 4. becherförmiger Fr.

Dentaria. Zahnwurz.

- 1. bulbifera L. 4. knollentragende Fr.
- 2. pentaphyllos L. 4. fünfblättrige Fr.

Desmanthus. Büschelzopf.

- 1. natans W. ☉. schwimmender w. H.
- 2. virgatus W. En. ♀. ruthenförmiger w. H.
Acacia virgata Gaert.
A — angustisiliqua Desf.
- 3. diffusus W. En. ♀. ausgebreiteter w. H.
Mimosa pernambucana L.

Dianella. Dianelle.

- 1. coerulea W. En. 4. blaue w. H.
- 2. nemorosa Lam. 4. schattige w. H.
Dracaena ensifolia L.

Dianthus Nelke.

- 1. aggregatus Poir. 4. gehäufte Fr.
- 2. arboreus L. ♀. baumartige Fr.
- 3. arenarius L. 4. Sandnelke Fr.
- 4. atrorubens All. 4. dunkelrothe Fr.
- 5. barbatus L. 4. Bart Fr.
- 6. bicolor M. B. 4. zweifarbig Fr.
- 7. campestris M. B. 4. Ackernelke Fr.
- 8. capitatus M. B. 4. kopfförmige Fr.
- 9. Carthusianorum L. 4. Carthäuser Fr.
- 10. Caryophyllus L. 4. Gartennelke Fr.
- 11. caucasicus M. B. 4. caucasische Fr.
- 12. chinensis L. ♂. Chinesernelke Fr.
- 13. collinus W. et K. 4. Hügelnelke Fr.
- 14. crinitus Smith. 4. haarförmige Fr.
- 15. deltoides L. 4. Grasnelke Fr.
- 16. diutinus W. et K. 4. ausdauernde Fr.
- 17. furcatus Balb. ♀. gabelförmige Fr.
- 18. glaucus L. 4. graue Fr.
- 19. hortensis Schrad. 4. Gartennelke Fr.

Dianthus. Nelke.

20. japonicus Thunb. 4. japanische Fr.
21. monspeliacus L. 4. französische Fr.
22. montanus M. B. 4. Berg Fr.
23. plumarius L. 4. Feder oder Pfingstnelke Fr.
Mit vielen Abarten.
24. petraeus M. B. Felsen Fr.
25. pungens L. 4. stechende Fr.
26. superbis L. 4. prächtige Fr.
27. sylvestris Wulff. 4. Wald Fr.

Dichondra. Zweikorn.

1. argentea Humb. 4. silberfarbenes C. H.
2. rotundifolia Link. 4. rundblättriges C. H.
3. sericea Sw. 4. seidenartiges C. H.

Dicksonia. Dicksonie.

1. arborea W. 4. baumartige w. H.

Dictamnus. Diptam.

1. albus L. 4. weißwurzlicher Fr.
Dictamnus fraxinella Lam.
2. — b. purpureus 4. mit rother Blume Fr.

Diervilla. Dierville.

1. canadensis W. 4. canadische Fr.
Lonicera Diervilla L.

Digitalis. Fingerhut.

1. ambigua W. En. 4. blaßgelber Fr.
D. ochroleuca Jacq.
D. grandiflora Lam.
2. canariensis L. 4. canarischer C. H.
3. ferruginea L. 4. rostfarbener Fr.
4. lanata W. et K. 4. wolliger Fr.
D. orientalis Lam.
D. Winterli Roth.
5. laevigata W. et K. 4. glatter Fr.
6. lutea L. 4. gelber Fr.
7. micrantha Schrad 4. kleinblumiger Fr.
8. purpurea L. 4. purpurrother Fr.
9. — b. flore albo. mit weißer Blume Fr.
10. Sceptrum L. 4. schopftragender C. H.
11. Thapsi L. 4. geflügelter Fr.

Digitaria. Fingergras.

1. aegyptiaca Retz. ☉. ägyptisches Fr.
Panicum filiforme Jacq.
2. sanguinalis W. En. ☉. blutrothes Fr.
Panicum sanguinale Desf.

Dillenia. Dillenie.

- scandens vid. Hibbertia.
1. speciosa Thunb. ☿. prächtige w. H.

Dinacba. Dinacba.

1. arabica Jacq. ☉. arabische Fr.
Dactylis paspaloides W.

Dioscorea. Yamswurz.

1. alata L. ♀. geflügelte w. H.
2. bulbifera L. ♀. knollentragende w. H.
3. polygonoides H. et B. knöterigartige w. H.
4. sativa L. ♀. gemeine Fr.

Diosma. Göttergeruch.

- acuminata vid. Agathosma.
brunioides vid. Agathosma.
1. capitata L. ☿. kopfförmiger C. H.
 2. ciliata L. ☿. gefranzter C. H.
 3. cupressina L. ☿. cypressenartiger C. H.
 4. capensis Murr ☿. feinbehaarter C. H.
Bucco hispida Thunb.
 5. ericoides L. ☿. heidenartiger C. H.
D. aspalathoides Lam.
 6. foetidissima H. Cels ☿. stinkender C. H.
 7. fragrans Sims. ☿. wohlriechender C. H.
 8. hirsuta L. ☿. haariger C. H.
imbricata vid. Agathosma.
 9. longifolia Wendl. ☿. langblättriger C. H.
obtusata Thunb. vid. Agathosma.
 10. oppositifolia L. ☿. paarblättriger C. H.
 11. orbicularis Thunb. ☿. rundblättriger C. H.
patula vid. Agathosma.
 12. purpurea H. Cels. ☿. purpurrother C. H.
 13. rubra L. ☿. rother C. H.
speciosa vid. Adenandra.
 14. tenuifolia W. ☿. dünnblättriger C. H.

Diosma. Göttergeruch.

15. tetragona L. ♀. viereckiger C. H.
Bucco tetragona Thunb.
uniflora vid. Adenandra.
villosa vid. Agathosma.

Diospyros. Dattelpflaume.

1. lotus L. ♀. italienische Fr.
2. Kaki L. ♀. japanische C. H.
3. virginiana L. ♀. virginische Fr.

Diotis vid. Santolina.

Diploaxis vid. Sisymbrium.

Dipsacus. Karden.

1. ferox. Desl. ♂. dornige Fr.
2. fullonum L. ♂. Weber Fr.
3. laciniatus L. ♂. zerschlitzte Fr.
4. sylvestris W. En. ♂. wilde Fr.

Dirca. Lederholz.

1. palustris L. ♀. sumpfliebendes Fr.

Disandra. Disandra.

1. prostrata L. 4. liegende Fr.

Dischidia. Dischidie.

1. lanceolata Hort. Berol. ♀. lanzettblättrige w. H.

Dodartia. Dodartie.

1. orientalis L. 4. morgenländische Fr.

Dodecatheon. Götterblume.

1. Meadia L. 4. virginische Fr.

Dodonaea. Dodonaea.

1. angustifolia L. ♀. schmalblättrige C. H.
2. cuneata Rudg. ♀. keilblättrige C. H.
3. triquetra Wendl. ♀. dreykantige C. H.
4. viscosa L. ♀. klebrige C. H.
Ptelea viscosa W. Sp. pl.

Dolichos.

Phaseole.

1. biflorus L. ☉. zweyblüthige Fr.
2. capensis L. ☉. capische Fr.
3. Catjang L. ☉. schmalfrüchtige Fr.
4. farinaceus Mart. ☉. mehlichte Fr.
5. Lablab L. ☉. ägyptische Fr.
6. — b. fl. albo ☉. mit weißer Blume Fr.
7. lignosus L. ☿. holzige C. H.
8. minimus L. ☉. kleinste Fr.
9. sesquipedalis L. ☉. langfrüchtige Fr.
10. Soja L. ☉. Sojabohne Fr.
11. tranquebaricus Jacq. ☉. tranquebarische Fr.
12. violaceus Hort. Berol ☉. violette Fr.

Dombeya.

Dombeye.

1. ferruginea Cav. ☿. rostbraune w. H.
2. nivea H. Cels. weisse w. H.
3. rosea? H. Cels ☿. rothe w. H.

Donia vid. Aster.

Dondia vid. Astrantia.

Doodia.

Doodie.

1. aspera R. Br. 4. rauhe w. H.

Doronicum.

Gemswurz.

1. altaicum Pall. 4. hohe Fr.
2. austriacum W. 4. österreichische Fr.
3. macrophyllum Bernh. 4. großblättrige Fr.
4. orientale W. En. 4. morgenländische Fr.
D. caucasicum M. B.
5. Pardalianches L. 4. größte Fr.
D. cordatum Lam.

Dorstenia.

Dorstenie.

1. arifolia Lam. 4. aronblättrige w. H.
2. Contrayerva L. 4. wurmtreibende w. H.

Dorycnium.

Dorycnium.

1. latifolium W. ☿. breitblättriges C. H.
Lotus latifolius Sib.
2. fruticosum Pers. ☿. strauchartiges C. H.
Lotus Dorycnium L.

Draba. Hungerblümchen.

1. aizoides L. 4. immergrünes Fr.
2. androsacea W. 4. mannsschildartiges Fr.
D. ciliata Scop.
3. hirta L. 4. behaartes Fr.
4. incana L. ♂. graues Fr.
5. — b. contorta Ehrh. gedrehtes Fr.
6. lasiocarpa Rochel 4. mattes Fr.
7. nivalis Dec. 4. Schnee Fr.
8. rupestris Ait. 4. felsenhungerblümchen Fr.
9. verna L. ☉. Frühlings Fr.

Dracaena. Drachenbaum.

1. arborea Fisch. ♀. baumartiger w. H.
Boscii vid. Littaea.
2. Draco L. ♀. gemeiner w. H.
3. ferrea L. ♀. eisenfester w. H.
ensifolia vid. Dianella.
marginata vid. Lomatophyllum.
4. reflexa Lam. ♀. rückwärtsgebogener w. H.
5. umbraculifera Jacq. ♀. Schattenreicher w. H.

Dracocephalum. Drachenkopf.

1. austriacum L. ♂. österreichischer Fr.
2. canescens L. ☉. grauer Fr.
3. canariense L. ♀. canarischer C. H.
4. denticulatum Ait. 4. gezählter Fr.
5. moldavica L. ☉. türkischer Fr.
6. nutans L. 4. hängender Fr.
7. peregrinum L. 4. fremder Fr.
8. Ruischiana L. 4. schwedischer Fr.
9. sibiricum L. 4. sibirischer Fr.
10. thymiflorum L. ☉. thymianblättriger Fr.
11. virginicum L. ☉. virginischer Fr.

Dracontium. Zehrwurz.

1. cordifolium H. Nymph ♀. herzblättrige w. H.
2. pertusum L. ♀. durchbohrte w. H.
Calla Dracontium Meyer.

Drimia. Giftlilie.

1. ciliaris Jacq. 4. gefranzte C. H.
2. lanceifolia Cav. 4. lanzettblättrige C. H.

Dryas. *gebirgshirschwurz* **Hirschwurz.**

1. octopetala L. 4. Alpen Fr.

Duranta. *durante* **Durante.**

1. Ellisia L. h. ellisische w. H.
2. microphylla Desf. h. kleinblättrige w. H.
3. Plumieri L. h. plumierische w. H.

E.

Echinops. *kugeldistel* **Kugeldistel.**

1. paniculatus Jacq. 4. rispenförmige Fr.
2. Ritro L. 4. italienische Fr.
3. sphaerocephalus L. 4. gemeine Fr.
4. tauricus W. 4. taurische Fr.

Echites. *klammerstrauch* **Klammerstrauch.**

1. biflora Jacq. h. zweyblüthiger w. H.
2. difformis Walth. h. ungestalteter C. H.

Echium. *natterkopf* **Natterkopf.**

1. australe Lam. ☉. australischer Fr.
2. candicans Jacq. h. weißlicher C. H.
3. fruticosum L. h. strauchartiger C. H.
4. giganteum L. h. höchster C. H.
5. italicum L. ♂. italienischer Fr.
6. macranthum R. S. ☉. großblüthiger Fr.
7. plantagineum L. ☉. wegetrittblättriger Fr.
8. rubrum Jacq. ☉. rothblühender Fr.
9. salmanticum Lagasc 4. portugiesischer Fr.
10. simplex Dec. h. einfacher C. H.
11. strictum L. ♂. steifer C. H.
12. violaceum L. ☉. violetter Fr.
13. virescens Dec. h. grünender C. H.
14. vulgare L. 4. gewöhnlicher Fr.

Eclyp ta. *mehlblume* **Mehlblume.**

1. erecta L. ☉. aufrechte Fr.
2. latifolia L. ☉. breitblättrige Fr.
3. prostrata L. ☉. gestreckte Fr.
4. punctata L. ☉. punctirte Fr.

Edwardisia vid. Sophora.

Ehretia. Ehretie.

1. laxa Jacq. h. schlaffe w. H.
2. tinifolia L. h. lorbeerblättrige w. H.

Ehrharta. Ehrharte.

1. panicea Smith. 4. Fennigartige C. H.

Elaeagnus. Oleaster.

1. angustifolia L. h. schmalblättriger Fr.
2. latifolia L. h. breitblättriger w. H.
3. orientalis L. h. morgenländischer Fr.

Elaeodendrum. Oelstrauch.

1. orientale Jacq. h. morgenländischer w. H.
Rubentia olivina Juss.
R. — longifolia Desf.
2. — b. angustifolium h. schmalblättriger w. H.

Elais. Oelpalme.

1. Guineensis L. h. guineische w. H.

Elate. Tannenpalme.

1. sylvestris L. h. wilde w. H.

Elephanthopus. Elefantenfufs.

1. scaber L. 4. scharfer w. H.

Eleusine. Eleusine.

1. coracana Pers. ☉. dreyährige Fr.
Cynosurus coracanus L.
2. domingensis Pers. 4. ruthenförmige w. H.
Cynosurus domingensis Jacq.
Leptochloa domingensis Paliss.
3. indica Pers. ☉. indische Fr.
Cynosurus indicus L.

Ellisia. Ellisie.

1. Nyctelaea W. ☉. virginische Fr.
Polemonium Nyctelaea L.

Elichrysum. Strohblume.

1. argenteum W. ♀. silberweise C. H.
Xeranthemum argenteum Thunb.
2. bracteatum W. ♂. afterblättrige Goldsonne C. H.
Xeranthemum bracteatum Vent.
3. fulgidum W. ♀. glänzende C. H.
Xeranthemum fulgidum L.
4. retortum W. ♀. gedrehte C. H.
Xeranthemum retortum L.
5. sesamoides W. ♀. schmalblättrige C. H.
Xeranthemum sesamoides L.
6. Staehelina W. ♀. Staehelinische C. H.
Xeranthemum Staehelina L.
7. variegatum W. ♀. bunte C. H.
Xeranthemum variegatum L.

Elscholtzia. Elscholtzie.

1. cristata W. ☉. kammartige Fr.
Hysopus ocymifolius Lam.

Elymus. Haargras.

1. arenarius L. 4. Sandweizen Fr.
2. canadensis L. 4. canadisches Fr.
3. Caput Medusae W. En. ♂. Medusenblättr. Fr.
4. crinitus Schreb. 4. behaartes Fr.
Hordeum jubatum Dec.
5. geniculatus Smith. 4. gegliedertes Fr.
6. giganteus W. En. 4. höchstes Fr.
E. macrostachys Spr.
7. Hystrix W. ☉. stachliges Fr.
8. hordeiformis Desf. 4. gerstenähnliches Fr.
9. philadelphicus L. 4. Philadelphisches Fr.
10. ramosus Desf. 4. ästiges Fr.
11. sibiricus L. 4. sibirisches Fr.
12. villosus Mühlenb. 4. haariges Fr.
E. hirsutus Schreb.
13. virginicus L. 4. virginisches Fr.

Elytraria. Elytrarie.

1. virgata Mich. 4. ruthenförmige Fr.
Justicia squamosa Soland.

Embothrium vid. Hackea

Embryopteris. *Embryopteris*.

1. glutinifera Roxb. ♂. Klebrige w. H.

Diospyros Embryopteris Pers.

Empetrum. *Rauschbeere*.

1. album L. ♂. weisse Fr.

2. nigrum L. ♂. schwarze Fr.

Epacris. *Felsbusch*.

1. grandiflora W. ♂. großblumiger C. H.

2. pulchella Cav. ♂. schöner C. H.

3. juniperina Forst ♂. wachholderblättriger C. H.

Ephedra. *Rossschwanz*.

1. altissima Desf. ♂. hoher C. H.

2. distachya L. ♂. zweyjähriger Fr.

3. monostachya L. ♂. einjähriger Fr.

Epidendrum. *Schmarozbaum*.

1. ciliare L. 4. gefranzter w. H.

2. cochleatum L. 4. kochlöffelförmiger w. H.

3. elongatum Jacq. 4. verlängerter w. H.

sinense vid. *Cymbidium*.

4. umbellatum Sw. 4. doldenblüthiger w. H.

Vanilla vid. *Vanilla*.

Epigaea. *Grundstrauch*.

1. repens L. ♂. kriechender Fr.

Epilobium. *Weidenröschen*.

1. alpestre L. 4. Acker Fr.

2. angustissimum L. 4. schmalblättriges Fr.

E. rosmarinifolium Haenk.

3. coloratum Mühlenb. 4. farbiges Fr.

4. hirsutum L. 4. haariges Fr.

E. grandiflorum All.

5. incanum Pers. 4. graues Fr.

6. latifolium L. 4. breitblättriges Fr.

7. montanum L. ♂. Berg Fr.

8. spicatum Lam. 4. ährentragendes Fr.

Epimedium. Sockenblume.

1. alpinum L. 4. Alpen Fr.

Epipactis. Sumpfwurz.

1. latifolia W. En. 4. breitblättrige Fr.
Serapias latifolia L.
2. rubra W. En. 4. rothe Fr.
Serapias rubra L.

Equisetum. Schachtelhalm.

1. arvense L. 4. Ackerliebendes Fr.
2. fluviatile L. 4. flussliebendes Fr.
E. eburneum Roth.
E. Telmateja Erh.
3. hyemale W. 4. Polier Fr.
4. palustre W. En. 4. Sumpf Fr.
5. sylvaticum W. En. 4. Wald Fr.
6. variegatum All. 4. buntes Fr.

Eranthemum. Menderle.

1. bicolor Schrk. 4. zweyfarbige w. H.
Justicia bicolor Bot. Mag.
2. parvifolium R. Br. kleinblättrige w. H.
Justicia microphylla L.

Eranthis vid. **Helleborus.**

Erica. Heide.

1. abietina L. h. tannenartige C. H.
2. — b. speciosa Wendl. h. prächtige C. H.
3. aggregata Wendl. h. angehäuften C. H.
4. albens L. h. weißliche C. H.
5. amoena Wendl. h. angenehme C. H.
6. arborea L. h. baumartige C. H.
7. — b. parviflora h. mit kleinen Blumen C. H.
8. australis L. h. südliche C. H.
9. baccans L. h. beerenförmige C. H.
10. blanda Ait. h. angenehme C. H.
11. caffra L. h. kaffersche C. H.
12. capitata L. h. kopfförmige C. H.
13. cerinthoides L. h. wachsblumenartige C. H.
14. ciliaris L. h. gefranzte C. H.
15. cinnerea L. h. graue C. H.
16. — b. alba. mit weißer Blume C. H.

Erica. Heide.

17. *coccinea* L. h. hochrothe C. H.
18. *concinna* L. h. nette C. H.
19. *conspicua* Ait. h. langblüthige C. H.
20. *costata* Andr. h. gerippte C. H.
21. *conferta* Andr. gehäufte C. H.
22. *cruenta* Ait. h. dunkelrothe C. H.
23. *culcitaeflora* Salisb. h. wollblüthige C. H.
24. *curvisflora* L. h. krummblüthige C. H.
25. *cylindrica* Thunb. h. cylindrische C. H.
- Daboecia* vid. *Menziesia polifolia*.
26. *divaricata* h. ausgesperrte C. H.
27. *empetrifolia* L. h. rauschbeerblättrige C. H.
28. *erubescens* Ait. h. rothe C. H.
29. *Everana* Ait. h. Everanische C. H.
- E. Uhria* Andr.
30. *fascicularis* Ait. h. kronenblüthige C. H.
- E. octophylla* W.
- E. coronata* Andr.
31. *gilva* Wendl. h. fahlgelbe C. H.
- E. gelida* Hortul.
32. *gnaphaloides* L. h. ruhrkrautartige C. H.
33. *gracilis* Wendl. h. schlanke C. H.
34. *herbacea* L. h. krautartige C. H.
35. — b. *carnea* Scop h. m. Fleischfarb. Blum. C. H.
36. *hirta* Thunb. h. rauhe C. H.
37. *hispidula* L. h. feinhaarige C. H.
38. *hybrida* Lee et Kenedy. Bastard C. H.
39. *ignescens* Wendl. h. feurige C. H.
40. *imbricata* Thunb. h. schuppige C. H.
41. *incarnata* Thunb. h. incarnatrothe C. H.
42. *laevis* Wendl. h. glatte C. H.
43. *laniflora* Wendl. h. wollenblüthige C. H.
44. *linearis* Ait. h. linienblättrige C. H.
45. *longifolia* Donn. h. langblättrige C. H.
46. *lutea* W. h. gelbe C. H.
47. *mammosa* L. h. zitzenförmige C. H.
48. *margaritacea* W. h. perlenartige C. H.
- E. cristata* Thunb.
49. *mediterranea* L. h. mittelländische C. H.
50. *minima* H. Cels. kleinste C. H.
51. *Monsonia* L. fil. h. Monsonische C. H.
52. *multiflora* L. h. vielblüthige C. H. et Fr.
53. — b. *flor. alb.* mit weissen Blumen C. H.

Erica.

Heide.

54. Muscari W. h. wohlriechende C. H.
 55. nigrita L. h. Ierchenbaumblättrige C. H.
 56. parviflora L. h. kleinblüthige C. H.
 57. passerina Thunb. h. vogelkopfartige C. H.
 58. pellucida Ait. h. leuchtende C. H.
 59. pendula Wendl. h. hängende C. H.
 60. persoluta L. h. ausgebreitete C. H.
 61. — b. rubra h. mit rothen Blumen C. H.
 62. Petiverii L. h. Petiverische C. H.
 63. phyllicoides Wendl. h. heidenartige C. H.
 64. Pluckenetii L. h. Pluckenetische C. H.
 65. polytrichifolia H. Cels. h. haarmosartige C. H.
 66. procumbens Wendl. h. niedergestreckte C. H.
 67. pubescens Wendl. h. behaarte C. H.
 68. purpurascens L. h. italienische C. H.
 69. pyrolaeiflora Pers. h. wintergrünblüthige C. H.
 70. quadriflora Wendl. vierblumige C. H.
 71. ramentacea L. h. rankende C. H.
 72. regerminans L. h. sprossende C. H.
 73. rubens Thunb. h. röthliche C. H.
 74. scoparia L. h. pfriemenartige C. H.
 75. Sehana Ait. h. Sebanische C. H.
 76. sessiliflora L. Suppl. h. ungestielte C. H.
 77. spumosa Thunb. h. schaumige C. H.
 78. stricta Donn. h. steife C. H.
 79. taxifolia Ait. h. taxusblättrige C. H.
 80. tenella Ait. h. zartblättrige C. H.
 81. tenuifolia L. h. dünnblättrige C. H.
 82. tetralix L. h. Sumpf Heide C. H. et Fr.
 83. — b. rosea h. mit rosenroth. Blumen C. H.
 84. — c. speciosa h. mit prächtigen Blumen C. H.
 85. tubiflora Wendl. h. rohrblüthige C. H.
 86. triflora L. h. dreyblumige C. H.
 87. — b. purpurea h. mit purpurrothen Blum. C. H.
 88. urceolaris W. En. h. becherförmige C. H.
 89. vagans L. h. zerstreutstielige C. H.
 90. versicolor Andr. h. bunte C. H.
 91. verticillata Andr. h. quirlförmige C. H.
 92. viridipurpurea L. h. grünlichrothe C. H.
- vulgaris vid. Calluna.

Erigeron.

Allmanuskraut.

1. acre L. ☉. scharfes Fr.

Erigeron. Allmannskraut.

2. alpinum L. ☉. Alpen Fr.
 3. bonariense W. ☉. südamerikanisches Fr.
 4. canadense L. ☉. canadisches Fr.
 5. caucasicum M. B. 4. caucasisches Fr.
 6. jamaicense Sw. ☉. jamaicenisches Fr.
 7. laevigatum Rich. ♂. glattes Fr.
 8. philadelphicum L. 4. philadelphisches Fr.
 9. purpureum Ait. 4. purpurrothes Fr.
 10. Villarsii Bell. 4. villarsisches Fr.
- E. atticum Vill.*

Erinus. Leberbalsam.

1. alpinus L. 4. Alpen Fr.

Eriocephalus. Wollkopf.

1. africanus L. ♀. afrikanischer C. H.

Eriophorum. Wollgras.

1. angustifolium L. 4. schmalblättriges Fr.
2. polystachyum L. 4. vielähriges Fr.
3. vaginatum L. 4. scheidentragendes Fr.

Eriostemum. Eriosteme.

1. dendatum H. Cels. ♀. gezahnte C. H.

Erodium. Reiherschnabel.

1. alpinum Herit. 4. Alpen Fr.
Geranium alpinum Cav.
2. chamaedryoides Ait. 4. niedriger C. H.
3. ciconium Ait. ☉. langschnablicher Fr.
4. cicutarium Ait. ☉. schierlingsblättriger Fr.
5. Goussini Tenore. ♀. Goussinischer C. H.
6. gruinum Ait. ☉. candischer Fr.
7. hirtum W. ♀. rauher C. H.
8. hymenoides Herit. 4. dreytheiliger C. H.
Geranium trifolium Cav.
9. incarnatum W. ♀. incarnatrother C. H.
Geranium incarnatum Cav.
10. malacoides Ait. ☉. malvenartiger Fr.
11. moschatum W. ☉. bisamduftender Fr.
12. romanum Ait. ☉. römischer Fr.

Ervum. Linse.

1. hirsutum Lour. ☉. zottige Fr.
2. Lens. L. ☉. gemeine Fr.
3. tetraspermum L. ☉. viersaamige Fr.

Eryngium. Mannstreu.

1. alpinum L. 4. Alpen Fr.
2. amethystinum W. et K. 4. doppeltgefiederte Fr.
E. azureum H. Par.
3. asperifolium Delar. 4. rauhblättrige Fr.
4. Bourgati Gouan. 4. weisstacheliche Fr.
5. corniculatum Lam. 4. gehörnte C. H.
E. suaveolens H. Par.
E. cornutum Donn.
6. giganteum M. B. 4. hohe Fr.
7. planum L. 4. flachblättrige Fr.
8. pusillum L. 4. kleine Fr.
9. rostratum Cav. 4. schnabelförmige Fr.
10. tricuspidatum L. 4. dreyspitzige Fr.

Erysimum. Hederich.

1. Alliaria L. ♂. knoblauchduftiger Fr.
2. bicornis W. ☉. zweyhörniger Fr.
Notoceras canariensis R. Br.
3. Barbarea L. ☉. stumpfblättriger Fr.
4. cheiranthoides L. ☉. leucojenartiger Fr.
5. diffusum Ait. ☉. verworrener Fr.
6. hieracifolium L. ♂. habichtskrautartiger Fr.
7. junceum W. ♂. pfriemenartiger Fr.
8. repandum L. ☉. ausgeschweiffter Fr.

Erythraea. Erythraee.

1. Centaurium Pers. ☉. Tausendguldenkraut Fr.
Chironia Centaurium W. Sp. pl.
Gentiana Centaurium L.
2. conferta Pers. ☉. gehäufte C. H.
Chironia conferta L.
3. palustris Schrad. ☉. Sumpf Fr.
Gentiana palustris Lam.

Erythrina. Korallenbaum.

1. abyssinica W. ♂. abyssinischer w. H.
2. castra Thunb. ♂. cafferscher w. H.

Erythrina. Korallenbaum.

3. carnea Ait. h. fleischfarbener w. H.
4. Corallodendron L. h. gemeiner w. H.
5. glauca W. h. graugrüner w. H.
6. herbacea L. 4. krautartiger w. H.
7. indica Lam. h. indischer w. H.
8. picta L. h. bunter w. H.
9. speciosa Ait. h. prächtiger w. H.
10. velutina W. h. samtartiger w. H.

Erythronium. Hundszahn.

1. dens canis W. 4. gemeiner Fr.

Eucalyptus. Schönmütze.

1. aromatica H. Cels. h. wohlriechende C. H.
2. capitellata Smith. h. kopfförmige C. H.
3. corymbosa Smith. h. doldenblühende C. H.
4. discolor Desf. h. verschiedenfarbige C. H.
5. glauca H. Cels. h. graugrüne C. H.
6. globosa H. Cels. h. kugelrunde C. H.
7. microphylla W. h. kleinblättrige C. H.
8. obliqua Herit. h. schiefblättrige C. H.
9. oppositifolia Desf. h. paarblättrige C. H.
10. perfoliata Nois. h. durchbohrte C. H.
11. piperita Smith. h. pfefferartige C. H.
12. populifolia H. Cels. h. pappelbaumblättrige C. H.
13. pulverulenta Link. H. Cels. h. bestäubte C. H.
resinifera vid. Leptospermum.
14. robusta Smith. h. hohe C. H.
15. saligna Smith. h. weidenblättrige C. H.
16. scabra Nois. h. rauhblättrige C. H.
17. viminalis Labill. h. ruthenartige C. H.

Euclea. Euclea.

1. racemosa L. h. traubenblüthige C. H.
2. undulata Thunb. h. wellenförmige C. H.

Eucomis. Schöpflilie.

1. nana Jacq. 4. Zwerch C. H.
Fritillaria nana L.
2. punctata Herit. 4. punctirte C. H.
3. regia Ait. 4. königliche C. H.
Fritillaria regia L.

Eugenia. Jambusenbaum.

1. australis Wendl. h. australischer C. H.
2. baruensis Jacq. h. Baruscher w. H.
 eliptica vid. *Metrosideros*.
3. Jambos L. h. gemeiner w. H.
4. malaccensis L. h. malaccinischer w. H.
5. nova species h. ex Brasilien w. H.
6. uniflora L. h. einblüthiger w. H.
 Plinia pedunculata L. fil.

Eupatorium. Wasserdost.

1. album L. 4. weißer Fr.
2. ageratoides L. 4. ageratumartiger Fr.
3. altissimum Jacq. 4. höchster Fr.
4. cannabinum L. 4. hanfartiger Fr.
5. coelestinum L. 4. himmelblauer Fr.
6. cordifolium Sw. h. herzblättriger w. H.
7. deltoideum Jacq. 4. deltablättriger Fr.
8. maculatum L. 4. gefleckter Fr.
9. perfoliatum L. 4. durchbohrter Fr.
10. purpureum L. 4. purpurrother Fr.
11. sessilifolium L. 4. ungestielter Fr.
12. syriacum Jacq. 4. syrischer Fr.
13. trifoliatum L. 4. dreyblättriger Fr.

Euphorbia. Wolfsmilch.

1. amygdaloides L. h. pfirsingblättrige C. H.
2. Anacantha W. h. dreyzählige w. H.
3. angulata Jacq. 4. eckichte Fr.
4. antiquorum L. h. wahre w. H.
5. atropurpurea W. En. schwarzpurpurfarbene C. H.
6. balsamifera W. h. balsamische w. H.
7. biglandulosa W. h. zweydrüsige w. H.
8. canariensis W. h. canarische w. H.
9. caespitosa Tenor. 4. rasenbildende Fr.
10. Caput Medusae W. h. Medusenhaupt w. H.
11. cereiformis L. h. fackeldistelartige w. H.
12. Characias L. h. Thal-Wolfsmilch C. H.
13. Commelini Dec. h. commelinenartige w. H.
14. cotinifolia L. h. perückenbaumblättrige w. H.
15. cyathophora W. ♂. geigenblättrige w. H.
 E. heterophylla Jacq.
16. dulcis L. 4. süsse Fr.

Euphorbia. Wolfsmilch.

17. *echinata* H. Dyk. ♀. stachlige w. H.
18. *erosa* W. ♀. ausgebissenblättrige w. H.
- E. polygona* Hortor.
19. *Esula* L. 4. gemeine Fr.
20. *exigua* L. ☉. kleine Fr.
21. *falcata* L. ☉. zugespitzte Fr.
22. *genistoides* L. ♀. ginsterartige C. H.
23. *Gerardiana* L. 4. Gerardische Fr.
24. *glareosa* Pall. 4. auf kieswachsende Fr.
25. *helioscopia* L. ☉. Sonnenzeiger Fr.
26. *heptagona* W. ♀. siebenneckige w. H.
27. *Humboldtii* W. 4. Humboldtische Fr.
28. *hypericifolia* L. ☉. johanniskrautblättrige Fr.
29. *Hystrix* W. ♀. vieldornige w. H.
30. *junceae* Ait. 4. binsenartige C. H.
31. *laeta* Haw. ♀. schöne C. H.
32. *Lathyris* L. ♂. Springkraut Fr.
33. *lucida* W. et H. 4. glänzende Fr.
34. *mammillaris* W. ♀. zizenförmige w. H.
35. *mauritanica* W. ♀. mauritanische w. H.
36. *melifera* W. ♀. honigbringende C. H.
37. *melosformis* Dec. ♀. melonenförmige w. H.
38. *micrantha* M. B. ☉. kleinblumige Fr.
39. *myrsinites* W. ♀. südliche C. H.
40. *neapolitana* Tenor ☉. neapolitanische Fr.
41. *nereifolia* W. ♀. oleanderblättrige w. H.
42. *nicaeensis* Jacq. 4. nicaeische C. H.
43. *nudiflora* Jacq. ♀. nacktblüthige w. H.
44. *nummularifolia* Jacq. ♀. pfennigkrautblättrige C. H.
45. *officinarum* W. ♀. harzbringende w. H.
46. *palustris* L. 4. Sumpf Fr.
47. *Paralias* L. 4. dickblättrige C. H.
48. *Peplis* L. ☉. Meerstrands Fr.
- E. dichotoma* Forsk.
49. *Peplus* L. ☉. Garten Fr.
50. *picta* Jacq. 4. bunte w. H.
51. *pilosa* L. 4. rauhfrüchtige Fr.
52. *piscatoria* Ait. ♀. Fischer w. H.
53. *portlandica* L. ♀. englische C. H.
54. *procera* M. B. 4. hohe Fr.
55. *prunifolia* Jacq. ☉. prunusblättrige Fr.
- E. geniculata* Orteg.
56. *pubescens* L. 4. tunetanische w. H.

Euphorbia. mello // Wolfsmilch.

57. retusa Cav. ☉. eingedrückte Fr.
58. salicifolia Host. 4. weidenblättrige Fr.
59. segetalis L. ☉. ackerliebende Fr.
60. spartioides Jacq. h. pfriemenartige C. H.
61. spinosa W. h. stächtige w. H.
E. pungens Lam.
62. Tirucalli W. h. malabarische w. H.
63. tithymaloides L. h. saftige w. H.
64. trigona Haw. dreyeckige w. H.
65. tuberculata Jacq. h. warzige w. H.
66. uncinata Dec. h. hakige w. H.
67. villosa W. et K. 4. filzige w. H.
68. verrucosa L. ♂. warzige Fr.
69. virgata Desf. h. ruthenförmige Fr.

Euphrasia. // Augentrost.

1. Odontites L. ☉. rother Fr.
2. officinalis L. ☉. gemeiner Fr.

Eutaxia. // Eutaxie.

1. myrtifolia R. Br. h. myrtenblättrige C. H.
Dillwynia obovata Labill.
— — *myrtifolia* Smith.

Evonymus. // Spindelbaum.

1. americanus L. h. amerikanischer Fr.
2. atropurpureus Jacq. h. dunkelrother Fr.
E. carolinensis M. B.
3. europaeus L. h. europäischer Fr.
4. — b. foliis variegatis. mit bunten Blättern Fr.
5. — c. fructu albo. mit weißer Frucht.
6. latifolius Jacq. h. breitblättriger Fr.
7. verrucosus L. h. warziger Fr.

Evosma. // Evosme.

1. latifolia Sterl. h. breitblättrige w. H.
Coussaboa latifolia Aubl.

Exacum. // Bitterblatt.

- vaginale vid. Logania.
1. viscosum Smith ♂. klebriges C. H.
Gentiana viscosa Ait.

F.

Fabricia. Fabricie.

1. laevigata Smith. h. glatte C. H.
1. myrtifolia Gaert. h. myrtenblättrige C. H.

Fagara. Fagare.

1. Pterota L. h. geflügelte w. H.

Fagonia. Fagonie.

1. cretica L. ♂. cretische C. H.

Fagus. Buche.

castanea vid. Castanea.

1. sylvatica L. h. gemeine Fr.
2. — b. asplenifolia Hortul. h. strichfarnbltrg. Fr.
3. — c. atropurpurea h. Blutbuche Fr.
4. — d. cristata h. gekrauste Fr.

Falkia. Falkie.

1. repens L. 4. kriechende C. H.
- Convolvulus Falkia* Thunb.

Fedia W. En. Valerianella Dec. Fedie.

1. coronata Gaert. ☉. gekrönte Fr.
 2. denticata W. En. ☉. gezähnte Fr.
- Valeriana Locusta* b. L.
3. dioscoidea W. En. ☉. zwölfzählige.
 4. echinata W. En. ☉. stachelige Fr.
 5. radiata W. ☉. strahlende Fr.
 6. uncinata M. B. ☉. hackenförmige Fr.
 7. vesicaria W. En. ☉. Blasen Fr.

Ferraria. Ferrarie.

1. undulata L. 4. wellenblättrige C. H.

Ferula. Seckenkraut.

1. communis L. 4. gemeines Fr.
2. glauca L. 4. graues Fr.

Ferula. Seckenkraut.

3. nodiflora L. 4 knotenblüthiges Fr.
4. tatarica Fisch. 4. tartarisches Fr.
5. tingitana L. ♂. tangarisches Fr.

Festuca. Schwingel.

1. amethystina Host. ☉. amethystfarbener Fr.
2. bromoides W. En. Supl. ☉. trespenartiger Fr.
3. calycina W. ☉. kelchiger Fr.
Schismus marginatus Paliss.
4. diandra Mich. ☉. zweymänniger Fr.
5. fascicularis Lam. ☉. buscheliger Fr.
fluitans L. vid. *Poa fluitans* W. En.
6. glauca W. En. 4. grauer Fr.
7. Myurus W. En. ☉. mausschwanzartiger Fr.
Mygalurus Caudatus Link.
8. poaeformis Host. 4. rispengrasförmiger Fr.
9. pratensis W. En. 4. Wiesen Fr.
10. pumila Host. ☉. niedriger Fr.
11. rigida Roth ☉. steifer Fr.
12. rubra L. 4. rother Fr.
13. scabra Vahl. 4. rauher Fr.
14. tenella W. En. ☉. zarter Schwingel Fr.
15. vaginata W. et K. 4. scheidiger Fr.

Ficus. Feigenbaum.

1. americana Aubl. ♀. westindischer w. H.
2. aquatica König ♀. wasserfeige w. H.
F. denticulata Vahl.
F. heterophylla L.
3. benghalensis L. ♀. bengalischer w. H.
4. benjamina L. ♀. Banianen w. H.
5. capensis Thunb. ♀. capischer w. H.
6. Carica L. ♀. gemeiner Fr.
F. comunis Lam.
mit vielen genießbaren Abarten.
7. citrifolia Lam. ♀. citronenblättriger w. H.
8. elastica Roxb. ♀. elastischer w. H.
9. glandulosa H. Cels. ♀. drüsiger w. H.
10. glaucophylla Pers. ♀. graublättriger w. H.
F. cordata Thunb.
11. indica L. ♀. indischer w. H.
12. insectoria W. ♀. farbgebender w. H.

Ficus. Feigenbaum.

13. laurifolia Lam. h. lorbeerblättriger w. H.
F. martinicensis W.
14. macrophylla Desf. h. großblättriger w. H.
15. mauritiana Lam. h. Erdfeige w. H.
16. nitida Thunb. h. glänzender w. H.
17. nymphaeifolia L. h. seerosenblättriger w. H.
18. Lichtensteinii Link h. Lichtensteinischer w. H.
19. oppositifolia Roxb. h. paarblättriger w. H.
F. scabra Jacq.
F. hispida L.
20. pertusa L. h. durchlöcherter w. H.
21. populnea W. h. pappelblättriger w. H.
F. populifolia Desf.
22. pumila W. Sp. pl. h. niedrige Feige C. H.
23. racemosa L. h. traubiger w. W.
24. religiosa L. h. heiliger w. H.
25. salicifolia Vahl. h. weidenblättriger w. H.
26. stipulata Thunb. h. beblätterter w. H.
F. scandens Lam.
27. Sycomorus L. h. ägyptischer w. H.
28. trigona L. h. Nabel-Feigenbaum w. H.
29. ulmifolia Lam. h. ulmenblättriger w. H.
30. venosa W. En. h. adriger w. H.
F. leucotoma Poir.

Filago vid. Gnaphalium.

Flacourtia. Flacourtie.

1. Ramontchi Herit. h. genießbare w. H.

Flaveria. Flaverie.

1. angustifolia Cav. ☉. schmalblättrige Fr.
2. contrayerva W. ☉. peruvianische Fr.
Milleria contrayerva Lam.

Flemingia. Flemingie.

1. congesta Roxb. h. gedrängtblühende w. H.

Flüggea. Flüggie.

1. Leucopyrus W. h. weisbeerige w. H.
Phyllanthus Leucopyrus Koen.

Fontanesia. Fontanesie.

1. phylliracoides Labill. †. lanzetblättrige Fr.

Fothergilla. Fothergille.

1. alnifolia Lam. †. erlenblättrige Fr.

F. Gardeni Mich.

2. — b. lanceolata †. lanzetblättrige Fr.

Forskohlea. Forsköhlie.

1. angustifolia Retz. ☉. schmalblättrige Fr.

2. tenacissima L. ☉. zäheste Fr.

Fragaria. Erdbeere.

1. chiloensis Ehrh. ‡. chilische Fr.

2. collina Ehrh. ‡. harte Fr.

3. indica Bot. Rep. ‡. indische Fr.

Duchesnia fragariformis Smith.

4. monophylla Duch. ‡. einblättrige Fr.

5. vesca L. ‡. essbare Fr.

plur. var. mit mehreren Abarten Fr.

Frankenia. Frankenie.

1. laevis L. †. glatte C. H.

2. pulverulenta L. ☉. bestäubte Fr.

Franseria. Franserie.

1. artemisioides W. †. beyfussartige C. H.

Xanthium fruticosum L.

Fraxinus. Esche.

1. americana L. †. amerikanische Fr.

F. — acuminata Lam.

F. — concolor Mich.

2. aurea W. En. †. Gold-Esche Fr.

3. caroliniana W. †. carolinische Fr.

4. excelsior L. †. gemeine Fr.

5. — b. crispa W. †. krausblättrige Fr.

F. atrovirens Pers.

6. — c. jaspidea †. mit jaspisgestreift. Rinde Fr.

7. — d. pendula †. mit hängenden Zweigen Fr.

8. epiptera Vahl. †. stielflügliche Fr.

F. discolor Mich.

Fraxinus.

Esche.

9. juglandifolia Vahl. ♀. wallnufsblättrige Fr.
10. lentiscifolia Desf. ♀. tamarindenblättrige Fr.
F. parvifolia Lam.
F. tamariscifolia Vahl.
11. — b. monophylla ♀. einblättrige Fr.
12. nana W. En. ♀. niedrige Fr.
13. Ornus L. ♀. blumentragende Fr.
F. paniculata Lam.
14. parvifolia W. ♀. kleinblättrige Fr.
15. platycarpa Vahl. ♀. breitfrüchtige Fr.
16. pubescens Lam. ♀. weichhaarige Fr.
F. nigra Duroi.
17. — b. longifolia W. ♀. mit langen Blättern Fr.
18. quadrangulata Mich. ♀. viereckige Fr.
19. rotundifolia W. ♀. rundblättrige Fr.
20. salicifolia H. Cels. ♀. weidenblättrige Fr.
21. sambucifolia W. ♀. hollunderblättrige Fr.
22. simplicifolia W. ♀. einfachblättrige Fr.
F. monophylla Desf.
F. heterophylla Vahl.
23. verrucosa W. En. Supl. ♀. warzige Fr.

Fritillaria.

Schachblume.

1. imperialis L. 4. Kaiserkrone Fr.
 plures varietates. mit mehreren Abarten.
2. Meleagris L. 4. gemeine Fr.
3. persica L. 4. persische Fr.

Fuchsia.

Fuchsie.

1. coccinea Ait. ♀. scharlachrothe C. H.
2. lycioides Andr. ♀. boxdornartige C. H.

Fumaria.

Erdrauch.

1. capreolata L. ☉. rankender Fr.
2. officinalis L. ☉. gemeiner Fr.
3. prehensilis W. et K. ☉. mittlerer Fr.
F. media Desl.
 nobilis vid. Corydalis.
 vesicaria vid. Cysticapnos.

G.

Gaertnera.

Gaertnere.

1. racemosa Roxb. ♀. traubenblüthige w. H.

Galanthus.

Schneeglöckchen.

1. nivalis L. 4. gemeines Fr.
2. — b. flore pleno 4. mit gefüllter Blume Fr.

Galega.

Geisraute.

1. Heyniana Roxb. 4. Heynische C. H.
2. ochroleuca Jacq. 4. gelblichweisse w. H.
3. officinalis L. 4. gemeine Fr.
4. orientalis Lam. 4. morgenländische Fr.
5. stricta Ait. ♀. aufrechte C. H.

Galeobdolon.

Galeobdolon.

1. luteum W. En. 4. gelbblühendes Fr.
Galeopsis Galeobdolon L.

Galeopsis.

Hohlzahn.

1. Ladanum L. ☉. schmalblättriger Fr.
2. Tetrahit L. ☉. gemeiner Fr.

Galinsoga.

Galinsoge.

1. parviflora Cav. ☉. kleinblumige Fr.
2. triloba Cav. ☉. dreylappige Fr.

Galium.

Labkraut.

1. anglicum Huds. 4. englisches Fr.
G. parisiense Lam.
2. Aparine Pall. 4. klebendes Fr.
G. glabrum Hoffm.
3. austriacum Jacq. 4. österreichisches Fr.
4. boreale L. 4. nördliches Fr.
5. cinereum All. 4. aschgraues Fr.
6. divaricatum Lam. 4. buntes Fr.
7. fruticosum W. ♀. strauchartiges Fr.
8. glaucum L. 4. graugrünes Fr.
G. campanulatum Vill.

Galium.

Labkraut.

9. hircynicum Weig. ☉. harzisches Fr.
10. hispidum W. ☉. borstiges Fr.
11. linifolium Ait. 4. leinblättriges Fr.
12. Mollugo L. 4. weisses Fr.
13. purpureum L. 4. purpurrothes Fr.
14. rotundifolium L. 4. rundblättriges Fr.
15. rubioides L. 4. krappartiges Fr.
16. tinctorium L. 4. Färber Fr.

Gardenia.

Gardenie.

1. florida Ait. 5. vollblüthige w. H.
2. — b. flore pleno 5. mitgefüllter Blume w. H.
Jasminum capense Mill.
3. latifolia Ait. 5. breitblättrige w. H.
4. longifolia R. et Pav. 5. langblättrige w. H.
5. micrantha Thunb. 5. kleinblumige w. H.
6. Mussaenda L. 5. schöne w. H.
Mussaenda formosa Jacq.
7. radicans Thunb. 5. wurzelnde w. H.
Randia vid. *Randia*.
8. Thunbergia L. 5. Thunbergische w. H.
Gardenia crassicaulis Salisb.
9. tubiflora Andr. 5. röhrenförmige w. H.
Oxyanthus speciosus Dec.

Garidella.

Garidelle.

1. Nigellastrum L. ☉. schwarzkümmelartige Fr.

Garuga.

Garuga.

1. pinnata Roxb. 5. flügelblättrige w. H.

Gastrolobium.

Gastrolobium.

1. bilobum Ait. 5. zweylappiges C. H.

Gaudinia vid. Avena.

Gaultheria.

Gaultherie.

1. procumbens L. 5. niederliegende Fr.

Gaura.

Prachtkerze.

1. biennis L. ♂. krautartige C. H.
2. mutabilis Cav. 5. veränderliche C. H.
3. tripetala Cav. 5. dreyblättrige C. H.

G a z a n i a. **G a z a n i e.**

1. pavonia R. Br. h. pfauenartige C. H.
Gorteria pavonia H. Cant.
2. rigens Ait. h. liegende C. H.
Gorteria rigens L.
3. pectinata h. kammförmige C. H.
Gorteria pectinata Thunb.

G e n i s t a. **G i n s t e r.**

1. anglica L. h. englischer Fr.
2. candicans L. h. weißlicher C. H.
3. decumbens L. h. niederliegender Fr.
4. Germanica L. h. deutscher Fr.
5. linifolia L. h. leinblättriger C. H.
Spartium linifolium Desf.
6. ovata W. et K. h. eyrundblättriger Fr.
7. pilosa L. h. haariger Fr.
8. sagittalis L. h. geflügelter Fr.
9. tinctoria L. h. färbender Fr.

G e n t i a n a. **E n z i a n.**

1. acaulis L. 4. stielloser Fr.
2. asclepiadeca L. 4. schwalbenwurzartiger Fr.
3. ciliata L. ☉. gefranzter Fr.
4. cruciata L. 4. kreuzblättriger Fr.
5. lutea L. 4. gelber Fr.
6. macrophylla Pall. 4. großblättriger Fr.
7. Pneumonanthe L. 4. dreyblumiger Fr.
8. punctata L. 4. punctirter Fr.
9. purpurea L. 4. rother Fr.
10. saponaria L. 4. seifenkrautartiger Fr.
11. utriculosa L. 4. bauchiger Fr.
12. verna L. 4. Frühlings Fr.

G e o d o r u m. **G e o d o r u m.**

1. pictum Pl. sel. Hort. berol. 4. bemaltes w. H.

G e o r g i n a. **G e o r g i n e.**

1. coccinea W. 4. scharlachrothe C. H.
Dahlea coccinea Cav.
2. — b. crocea W. 4. safrangelbe C. H.
3. — c. flava W. 4. gelbe C. H.
4. variabilis W. 4. veränderliche C. H.
plures varietates simplicis et plenis. mit vielen ein-
fachen und gefüllten Spielarten.

Geranium. Storchschnabel.

1. aconitifolium Herit. 4. eisenhutblättriger Fr.
2. anemonifolium Herit. 5. anemonenblättriger C. H.
3. bohemicum L. ☉. böhmischer Fr.
4. carolinianum L. ☉. carolinischer Fr.
5. collinum Steph. 4. auf hügelwachsender Fr.
6. divaricatum Ehrh. ☉. ausgebreiteter Fr.
7. dissectum L. ☉. zerschlissener Fr.
8. fuscum L. 4. brauner Fr.
9. macrorhizum L. 4. großwurzlicher Fr.
10. palustre L. 4. Sumpf Fr.
11. phaeum L. 4. rothbrauner Fr.
12. pratense L. 4. Wiesen Fr.
13. pusillum L. ☉. niedriger Fr.
14. pyrenaicum L. 4. pyrenäischer Fr.
15. reflexum L. 4. zurückgebogener Fr.
16. robertianum L. ☉. stinkender Fr.
17. rotundifolium L. ☉. rundblättriger Fr.
18. sanguineum L. 4. blutrother Fr.
19. striatum L. 4. gestreifter Fr.
20. sylvaticum L. 4. Wald Fr.
21. tuberosum L. 4. knolliger Fr.

Geropogon. Graubart.

1. glabrum L. ☉. glatter Fr.

Gesneria. Gesnerie.

1. aggregata Ker. 5. gehäufte w. H.
2. bulbosa Bot. Reg. 4. knollige w. H.
3. sp. nov. ex Brasilien 4. w. H.
4. tomentosa L. 5. filzige w. H.

G. erecta R. Br.

pulchella vid. Trevirana.

Geum. Geum.

1. album W. 4. weißes Fr.
2. canadense Murr. 4. canadisches Fr.
3. helveticum Schl. 4. schweizerisches Fr.
4. hirsutum Mühlenb. 4. haariges Fr.
5. intermedium W. 4. mittleres Fr.
6. macrophyllum W. En. 4. großblättriges Fr.
7. montanum L. 4. Berg Fr.
8. potentilloides W. 4. fingerkrautblättriges Fr.

Geum.

Geum.

9. pyrenaicum W. 24. pyrenäisches Fr.
10. rivale L. 24. wasserliebendes Fr.
11. urbanum L. 24. gemeines Fr.

Ginkgo vid. Salisburia.

Gladiolus.

Siegwurz.

1. cardinalis W. En. 24. prächtige C. H.
2. communis L. 24. gemeine Fr.
3. hastatus W. En. 24. schmalblättrige C. H.
G. angustifolius L.
4. hirsutus Jacq. 24. haarige C. H.
5. longiflorus L. 24. langblüthige C. H.
Ixia longiflora Ait.
6. tristis L. 24. traurige C. H.
7. tubiflorus L. 24. langröhrige C. H.
8. villosus Vahl. 24. zottige C. H.
9. Watsonius Jacq. 24. frühblühende C. H.
G. praecox Andr.

Glaucium.

Hörnermohn.

1. phoeniceum W. En. ☉. purpurrother Fr.
Chelidonium Corniculatum L.
2. luteum W. En. ♂. gelber Fr.
Chelidonium Glaucium L.

Glaux.

Milchkraut.

1. maritima L. 24. Meerstrands Fr.

Glechoma.

Gundelrebe.

1. hederacea L. 24. gemeine Fr.
2. hirsuta W. et K. 24. haarige Fr.

Gleditschia.

Gleditschie.

1. caspica Desf. ♀. caspische Fr.
2. horrida W. ♀. grofsdornige Fr.
3. macrocantha Desf. ♀. grofsdornige Fr.
4. monosperma Walt. ♀. einsaamige Fr.
G. caroliniensis Lam.
5. sinensis Lam. ♀. chinesische Fr.
6. triacanthos L. ♀. dreydornige Fr.
7. — b. inermis ohne Stacheln. Fr.

Glinus. Glinus.

1. lotoides L. ☉. schotenkleeartige Fr.

Globba. Globbe.

1. nutans L. 4. hängende w. H.
Alpinia nutans Redout.

Globularia. Kugelblume.

1. cordifolia L. 4. herzblättrige Fr.
2. longifolia Ait. 5. langblättrige C. H.
G. salicina Lam.
3. vulgaris L. 4. gemeine Fr.

Gloriosa. Prachtlilie.

1. superba L. 4. stolze w. H.
Methonica superba Redout.

Gloxinia. Gloxinie.

1. formosa Ait. 4. schöne w. H.
2. maculata Herit. 4. gefleckte w. H.
Martinia perennis L.

Glyceria vid. Poa.

Glycine. Erdnufs.

1. Apios L. 4. knollige Fr.
2. bituminosa L. 4. harzige Fr.
3. caribaea Jacq. 5. caraibische w. H.
4. chinensis Bot. Mag. 5. chinesische Fr.
5. frutescens L. 5. strauchartige Fr.
monophylla vid. *Kennedia*.
6. precatoria W. En 5. Paternoster (Glycine) Fr.
7. tomentosa L. 4. filzige Fr.

Glyzirrhiza. Süßholz.

1. echinata L. 4. stächliches Fr.
2. foetida Desf. 4. stinkendes Fr.
3. glabra W. 4. gemeines Fr.
Liquiritia officinalis Pers.

Gmelina. Gmeline.

1. sinuata Hort. Herrn. 5. buchtige w. H.

Gnaphalium. **Ruhrkraut.**

1. arenarium L. 24. Sand Fr.
2. aureum. Thunb. ♂. goldfarbiges C. H.
3. carniolicum Bernh. ♀. kärnthisches Fr.
4. congestum Lam. ♀. gedrängtblüthiges C. H.
5. crassifolium L. ♀. dickblättriges C. H.
6. cymosum L. ♀. afterdoldentragendes C. H.
7. ericoides L. ♀. heidenartiges C. H.
8. ferrugineum Juss. ♀. rostfarbenes C. H.
9. foetidum L. ☉. ♂. stinkendes Fr.
10. germanicum W. En. ☉. deutsches Fr.
Filago germanica L.
11. glomeratum L. 24. knaulförmiges Fr.
12. linarifolium Wendl. ♀. schmalblättriges C. H.
13. margaritaceum L. 24. perlartiges Fr.
14. orientale L. ♀. morgenländisches C. H.
15. patulum L. ♀. ausgebreitetes C. H.
16. pyramidatum W. En. ☉. pyramidenförmiges Fr.
Filago pyramidata L.
17. retortum H. Cels. ♀. zurückgekrümmtes C. H.
18. rigidum Wendl. ♀. steifes C. H.
19. sphaericum W. En. 24. kugelrundes C. H.
20. Stoechas L. ♀. gemeines Fr.
21. undulatum L. ☉. wellenförmiges Fr.

Gnidia. **Gnidie.**

1. aurea Wendl. ♀. goldfarbige C. H.
2. simplex L. ♀. einfache C. H.

Gomphocarpus. **Gomphocarpus.**

1. arborescens R. Br. ♀. baumartiger C. H.
Asclepias arborescens L.
2. fruticosus R. Br. ♀. weidenblättriger C. H.
Asclepias fruticosa L.

Gomphrena. **Winterblume.**

1. aggregata Humb. 24. gehäufte w. H.
2. brasiliensis Jacq. ♀. brasilische w. H.
3. decumbens Jacq. ☉. liegende w. H.
4. globosa L. ☉. kugelamaranth Fr.
5. — b. flor. alb. ☉. mit weissen Blumen Fr.
6. — c. carnea ☉. mit fleischfarbenen Blumen.
7. interrupta Sw. ☉. unterbrochenährige Fr.
Celosia procumbens Jacq.

Goodenia. Goodenie.

1. calendulacea Andr. ♀. ringelblumenartige C. H.
Scaevola suaveolens R. Br.
2. grandiflora W. En. ♂. großblumige C. H.
G. appendiculata Jacq.
3. ovata Smith. ♀. eiförmige C. H.

Goodia. Goodie.

1. lotifolia R. Br. ♀. schotenkleeartige C. H.
2. pubescens Sims. ♀. weichhaarige C. H.

Goodyera vid. Neottia.

Gordonia. Gordonie.

1. Lasianthus L. ♀. langstielige Fr.
2. pubescens Lam. ♀. behaarte Fr.
Franklinia americana Marsch.

Gorteria.

- ciliaris vid. Berkheya.
rigens vid. Gazania.

Gossypium. Baumwolle.

1. barbadense L. ♂. westindische w. H.
2. herbaceum L. ☉. krautartige w. H.
3. religiosum L. ♂. gelbe w. H.

Gratiola. Purgierkraut.

1. officinalis L. 4. ächtes Fr.

Grewia. Grewie.

1. occidentalis L. ♀. afrikanische C. H.
2. orientalis L. ♀. ostindische C. H.

Grewillea. Grewillee.

1. sericea R. Br. ♀. silberweise w. H.

Grindelia. Grindelie.

1. inuloides W. ♀. alantähnliche Fr.

Gristea. Griste.

1. tomentosa Roxb. ♀. filzige w. H.

Gronovia.

Gronovic.

1. scandens L. ☉. klimmende Fr.

Guajacum.

Franzosenholz.

1. officinale L. ☿. vierblättriges w. H.
2. sanctum L. ☿. heiliges w. H.

Guazuma vid. Bubroma.

Guettarda.

Guettarde.

1. speciosa L. ☿. prächtige w. H.

Gunnera.

Gunnere.

1. perpensa W. 4. capische w. H.

Guilandina.

Schusserbaum.

1. Bonduc L. ☿. gemeiner w. H.
2. — b. Bonducella L. ☿. w. H.
dioica vid. Gymnocladus.

Gymnocladus.

Schusserbaum.

1. canadensis Mich. ☿. canadischer Fr.
Guilandina dioica L.

Gypsophila.

Gypskraut.

1. acutifolia Fisch. 4. spitzblättriges Fr.
2. altissima L. 4. höchstes Fr.
3. arenaria W. et K. 4. Sand Fr.
4. dubia W. 4. zweifelhaftes Fr.
5. fastigiata L. 4. langstieliges Fr.
6. paniculata L. 4. rispenblüthiges Fr.
7. prostrata L. 4. liegendes Fr.
8. saxifraga L. 4. steinbrechartiges Fr.
9. Steveni Fisch. 4. Stevenisches Fr.
10. Struthium L. 4. salzkrautblättriges Fr.
11. viscosa L. ☉. klebriges Fr.

Gyrocarpus.

Kreiselfrucht.

1. americanus Jacq. ☿. amerikanische w. H.

H.

Haemanthus. Blutblume.

1. albiflos Jacq. 24. weisse w. H.
2. ciliaris L. 24. gefranzte w. H.
3. coccineus L. 24. scharlachrothe w. H.
4. hyalocarpus Jacq. 24. glasfrüchtige C. H.
5. pubescens L. 24. weichhaarige w. H.
6. puniceus L. 24. dunkelrothe w. H.

Haematoxylon. Blutholz.

1. campechianum L. 7. westindisches w. H.

Hakea. Hakea.

1. acicularis Smith. 7. nadelblättrige C. H.
Banksia tenuifolia Salisb.
Conchium aciculare W.
Hakea sericea Wendl.
2. dactyloides Cav. 7. fingerförmige C. H.
H. nervosa Knight.
Banksia dactyloides Gaert.
Conchium nervosum Smith.
3. florida R. Br. 7. blüthenreiche C. H.
4. gibbosa Cav. 7. höckerige C. H.
H. pubescens Wendl.
H. pinifolia Salisb.
Banksia gibbosa White.
Conchium sphaeroideum Smith.
C. cornutum Gaert.
5. microcarpa R. Br. 7. kleinfrüchtige C. H.
6. nitida R. Br. 7. glänzende C. H.
7. — b. latifolia H. Cels. 7. mit breiten Blättern C. H.
8. oleifolia Smith 7. ölbaumblättrige C. H.
H. ligustrifolia Salisb.
9. prostrata R. Br. 7. niedergebogene C. H.
10. pugioniformis Cav. 7. dolchförmige C. H.
H. glabra Wendl.
Conchium corniculatum Smith.
Lambertia teretifolia Gaert.
11. saligna R. Br. 7. weidenblättrige C. H.
Embothrium salignum Andr.
E. salicifolium Vent.
Conchium salicifolium Gaert.

H a k e a.

H a k e a.

12. suaveolens R. Br. ♀. wohlriechende C. H.
H. heterophylla H. Cels.
H. pinnata Hortul.

H a l l e s i a.

H a l l e s i e.

1. diptera L. ♀. zweyflügliche Fr.
2. tetraptera L. ♀. vierflügliche Fr.

H a l l e r i a.

H a l l e r i e.

1. lucida L. ♀. glänzende C. H.

H a l l i a.

H a l l i e.

1. imbricata Thunb. ♀. dachziegelblättrige C. H.
Hedysarum imbricatum L.

H a l o r a g i s.

M e e r t r ä u b l e i n.

1. Cercodia Ait. ♀. sägeblättriges C. H.

H a m a m e l i s.

Z a u b e r n u f s.

1. virginica L. ♀. virginische Fr.
H. coryllifolia Moench.

H a m e l i a.

H a m e l i e.

1. Chrysantha Sw. ♀. gelbe w. H.
2. patens L. ♀. ausgebreitete w. H.

H a r r a c h i a.

H a r r a c h i e.

1. speciosa Jacq. ♀. prächtige w. H.

H a s s e l q u i s t i a.

H a s s e l q u i s t i e.

1. aegyptiaca L. ☉. ägyptische Fr.
2. cordata L. ☉. herzblättrige Fr.

H e b e n s t r e i t i a.

H e b e n s t r e i t i e.

1. denticata Thunb. ☉. gezähnte Fr.
2. erinoides Thunb. ☉. leberbalsamartige Fr.
3. tenuifolia Schrad. ♂. feinblättrige Fr.

H e d e r a.

E p h e u.

1. Helix L. ♀. gemeiner Fr.
2. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
quinquefolia vid. Vitis.
arborea vid. Aralia.

Hedychium. Kranzblume.

1. coccineum Link. 4. scharlachrothe w. H.
2. coronarium König 4. schöne w. H.

Hedypnois. Röhrleinkraut.

1. cretica W. ☉. cretisches Fr.
2. mauritanica W. ☉. mauritanisches Fr.
3. monspeliensis W. ☉. französisches Fr.
4. pendula W. ☉. hängendes Fr.
5. tubaeformis Tenor. ☉. röhrenartiges Fr.

Hedysarum, Hahnenkopf.

1. abyssinicum W. En. ♀. abyssinischer Fr.
2. alpinum L. 4. Alpen Fr.
3. arenarium W. 4. Sand Fr.
4. canadense L. 4. canadischer Fr.
5. caput galli L. ☉. gemeiner Fr.
6. carpaticum W. et K. 4. carpatischer Fr.
7. coronarium L. ♂. italienischer Fr.
8. H. — flore albo ♂. mit weißer Blume Fr.
9. crista Galli. L. ☉. hahnenkammartiger Fr.
10. flexuosum L. ☉. bogigfrüchtiger Fr.
11. frutescens L. ♀. strauchartiger C. H.

Lespedeza fruticosa Pers.

12. gangeticum L. ☉. gangetischer w. H.
13. glomeratum Dietr. ♀. knaulförmiger w. H.
14. gyrans L. ♂. beweglicher w. H.
15. hamatum L. ♀. hackenförmiger w. H.

Stylosanthes procumbens Sw.

16. junceum L. 4. binsenartiger Fr.

Lespedeza juncea Pers.

17. latifolium Fisch. 4. breitblättriger w. H.
18. lineatum Mich. ♂. linienartiger C. H.
19. muricatum Jacq. 4. weichspitziger Fr.
20. obscurum L. 4. Gebirgs Fr.

H. alpinum Jacq.

21. Onobrychis L. 4. Esparsett Fr.
22. Pallasii W. En. 4. Pallasischer Fr.
23. paniculatum L. 4. rispenblüthiger Fr.
24. rotundifolium. Mich. 4. rundblättriger w. H.
25. saxatile L. 4. Stein Fr.
26. styracifolium L. ♀. styraxblättriger w. H.
27. Vespertilionis L. ♂. fledermausartiger w. H.

Heimia.

Heimie.

1. salicifolia Link et Otto ḡ. weidenblättrige C. H.

Helenium.

Helenie.

1. autumnale L. 4. Herbst Fr.
2. pumilum W. En. 4. niedrige Fr.
3. quadridentatum W. En. ☉. vierzählige Fr.
Rudbekia alata Jacq.

Helianthemum.

Sonnengürtel.

1. apenninum W. En. ḡ. apenninischer C. H.
2. barbatum W. En. ḡ. bartiger Fr.
3. fumana W. En. ḡ. dünner Fr.
4. guttatum W. En. ☉. gedüpfelter Fr.
5. halimifolium Pers. ḡ. meldenartiger C. H.
6. laevipes W. En. ḡ. glattstrunkiger C. H.
7. ledifolium W. En. ☉. porstblättriger Fr.
8. pilosum Pers. ḡ. behaarter C. H.
9. pulverulentum Pers. ḡ. staubartiger C. H.
10. salicifolium Pers. ☉. weidenblättriger Fr.

Helianthus.

Sonnenblume.

1. altissimus L. 4. höchste Fr.
2. annuus L. ☉. jährige Fr.
3. atrorubens L. 4. dunkelscheibige Fr.
4. decapetalus L. 4. zehnstrahlige Fr.
H. dodecapetalus Jacq.
5. diffusus Moench. 4. hingestreckte Fr.
6. divaricatus L. 4. ausgebreitete Fr.
7. giganteus L. 4. riesensonnenblume Fr.
8. indicus L. ☉. Indische Fr.
9. linearis Cav. 4. linienblättrige C. H.
10. macrophyllus W. En. 4. großblättrige Fr.
11. missuricus Spr. 4. missurische Fr.
12. mollis W. En. 4. weiche Fr.
H. pubescens Vahl.
13. multiflorus L. 4. vielblumige Fr.
14. — b. fl. plen. 4. mit gefüllten Blumen.
15. prostratus W. En. 4. liegende Fr.
16. trachelifolius W. En. 4. halskrautblättrige Fr.
17. tuberosus L. 4. knollige Fr.

Heliconia. Heliconie.

1. Bihai Sw. 4. spitzblättrige w. H.
Musa Bihai L.
2. humilis L. 4. niedrige w. H.
3. psittacorum L. 4. papagayen w. H.

Helicteres. Schraubenbaum.

1. jamaicensis L. 4. jamaicensischer w. H.
2. Jsora L. 4. westindischer w. H.
3. verbascifolia Link. 4. nachtkerzenbl. w. H.

Heliophila. Sonnenfreund.

1. amplexicaulis L. ☉. stielumfassender Fr.
2. crithmifolia L. ☉. meersenchelblättriger Fr.
3. pendula L. ☉. hängender Fr.

Heliopsis vid. Bupthalmum.

Heliotropium. Sonnenwende.

1. curassavicum L. ☉. curassavische Fr.
2. europaeum L. ☉. europäische Fr.
3. grandiflorum H. Par. 4. großblumige C. H.
4. indicum L. ☉. indische Fr.
5. peruvianum L. 4. peruvianische C. H.

Helleborus. Christwurz.

1. foetidus L. 4. stinkende Fr.
2. hyemalis L. 4. Winter Fr.
Eranthis hymealis Dec.
3. lividus Ait. 4. schmutzigweise Fr.
H. triphyllus Lam.
4. niger L. 4. schwarze Fr.
5. — b. latifolius Dec. 4. mit breiten Blättern Fr.
6. odorus W. et K. 4. wohlriechende Fr.
7. purpurascens W. et K. 4. röthliche Fr.
trifolius vid. *Coptis*.
8. viridis L. 4. grüne Fr.

Helmintha. Wurmsalat.

1. echioides Gaert. ☉. scharfblättriger Fr.

Helonias. *Helonias* Schwindblume.

1. bullata L. 24. glockenblüthige Fr.
H. latifolia Mich.
borealis vid. Anthericum.
2. graminea Gawl. 24. grasblättrige Fr.

Hemerocallis. Tagblume.

1. alba Andr. 24. weisse Fr.
Lilium japonicum L.
2. coerulea Andr. 24. blaue Fr.
Lilium cordifolium Thunb.
3. flava L. 24. gelbe Fr.
4. fulva L. 24. braunrothe Fr.
5. — b. foliis variegatis 24. mit bunten Blättern Fr.
6. graminea Andr. 24. grasblättrige Fr.

Hemimeris. Halbblume.

1. coccinea W. 7. scharlachrothe C. H.
H. linearis Pers.
Celsia linearis Jacq.
2. — b. intermedia 7. mit breiten Blättern C. H.
3. urticaefolia W. 7. nesselblättrige C. H.

Hemionitis. Netzfarn.

1. dealbata W. En. 24. weisblättriger w. H.
2. palmata Sw. 24. fünfflappicher w. H.

Heracantha vid. Carthamus.

Hepatica. Leberkraut.

1. triloba Dec. 24. dreylappiges Fr.
Anemone hepatica L.
fl. alb. coerul. et rub. 24. mit weissen, blauen und rothen Blumen Fr.

Heracleum. Heilkraut.

1. alpinum L. 24. Alpen Fr.
2. angustifolium L. 24. schmalblättriges Fr.
3. elegans Jacq. ☉. schönes Fr.
4. flavescens W. 24. gelblichtblüthiges Fr.
5. giganteum Fisch. ☉. hohes Fr.
6. gumiferum W. ♂. gummiartiges Fr.
7. Panaces L. ♂. grosses Fr.

Heracleum. Heilkraut.

8. pyrenaicum Lam. ♂. pyrenäisches Fr.
9. sibiricum W. ♂. sibirisches Fr.
10. sphondylium L. 2. gemeines Fr.
11. — b. longifolium 2. mit langen Blättern Fr.
12. — c. angustifolium 2. mit schmalen Blättern Fr.
13. tauricum Fisch. 2. taurisches Fr.
14. villosum Fisch. 2. zottiges Fr.

Heritiera. Heritiere.

1. elaeagnoides Nois ♀. ölbaumblättrige w. H.
2. littoralis W. ♀. uferwachsende w. H.

Hermannia. Hermannie.

1. alnifolia L. ♀. erlenblättrige C. H.
2. althaeoides L. ♀. eibischblättrige C. H.
H. aurea Jacq.
3. angularis Jacq. ♀. eckige C. H.
4. cuneifolia Jacq. ♀. keilförmige C. H.
5. denudata L. ♀. glatte C. H.
6. dissermaefolia Jacq. ♀. wellenblättrige C. H.
7. flammea Jacq. ♀. feuerfarbene C. H.
8. hirsuta Wendl. ♀. behaarte C. H.
9. holosericea Jacq. ♀. sammetartige C. H.
10. hyssopifolia L. ♀. jsofblättrige C. H.
11. incana Cav. ♀. bestäubte C. H.
12. lavandulaefolia L. ♀. lavendelblättrige C. H.
13. micans Wendl. ♀. glänzende C. H.
14. multiflora Jacq. ♀. vielblumige C. H.
15. plicata Ait. ♀. gefaltene C. H.
16. procumbens Cav. ♀. niederliegende C. H.
17. rotundifolia Jacq. ♀. rundblättrige C. H.
18. scabra Cav. ♀. scharfblättrige C. H.
19. scordifolia Jacq. ♀. gamanderblättrige C. H.

Hernandia. Hernandie.

1. ovigera L. ♀. eyförmige w. H.
2. sonora L. ♀. tönende w. H.

Herniaria. Bruchkraut.

1. glabra L. ☉. glattes Fr.
2. hirsuta L. ☉. haariges Fr.
3. incana Lam. 2. bestäubtes Fr.
4. millegrana Pall. 2. tausendkörniges Fr.

Hesperis. Nachtviole.

1. africana L. ☉. afrikanische Fr.
Malcolmia africana Dec.
2. inodora L. ♂. geruchlose Fr.
3. matronalis L. ♂. rothe Fr.
4. ramosissima Desf. ☉. ästige Fr.
5. runcinata W. et K. ♂. schrotsägenartige Fr.
6. tristis L. ♂. wahre Fr.
7. verna L. ☉. Frühlings Fr.

Heterospermum. Doppelsaame.

1. pinnatum Cav. ☉. gefiederter Fr.

Heuchera. Heuchere.

1. americana L. 4. amerikanische Fr.
2. caulescens Pursch. ♀. stammartige C. H.

Heynia. Heynie.

1. trijuga Roxb. ♀. dreyjochige w. H.

Hibbertia. Hibbertie.

1. Crenata Andr. ♀. gekerbte C. H.
H. grossulariaefolia Bot. Mag.
2. volubilis Andr. ♀. windende C. H.
Dillenia scandens W.

Hibiscus. Eibisch.

1. Abelsonchus L. ♀. Bisam w. H.
2. acerifolius Hort. Schönbr. ♀. ahornblättriger w. H.
3. Bammia Tozett ☉. Bammischer w. H.
H. esculentus Cav.
4. cannabinus L. ☉. hanfartiger w. H.
5. diversifolius Jacq. ♀. verschiedenblättriger w. H.
H. ficulneus Cav.
6. elatus Sw. ♀. hoher w. H.
7. ficulneus L. ♀. feigenartiger w. H.
8. fugax. Mart. 4. abfallender w. H.
9. furcatus W. ☉. gabelkelchiger w. H.
10. heterophyllus Vent. ♀. verschiedenblättriger C. H.
11. Lampas Cav. ♀. phillippinischer w. W.
12. Manihot. L. ♀. schwefelfarbener w. H.
13. macrophyllus Roxb. ♀. großblättriger w. H.
H. vulpinus Reinw.

Hibiscus. Eibisch.

14. *militaris* Cav. ♀. glatter w. H.
15. *mutabilis* L. ♀. veränderlicher w. H.
16. *palustris* L. 4. sumpfliebender Fr.
17. *pentacarpus* L. ♀. fünffrüchtiger w. H.
18. *phoeniceus* L. ♀. schönrother w. H.
19. *populneus* L. ♀. pappelblättriger w. H.
20. *pruriens* Jacq. ☉. brennender w. H.
21. *radiatus* Cav. ☉. gestrahlter w. H.
22. *rosa sinensis* L. ♀. chinesische Rose w. H.
23. — — b. flor. lut. plen. ♀. mit gelbgf. Blum. w. H.
24. — — c. fl. rubr. plen. ♀. mit rothgf. Blum. w. H.
25. *Sabdariffa* L. ☉. dreytheiliger w. H.
26. *syriacus* L. ♀. syrischer Fr.

Ketmia syriaca Scop.

27. — b. flor. alb. plen. ♀. mit weißgef. Blum. Fr.
28. — c. flor. rubr. plen. ♀. mit rothgf. Blum. Fr.
29. — d. foliis variegatis ♀. mit bunt. Blättern Fr.
30. *tiliaceus* L. ♀. lindenblättriger w. H.
31. *Trionum* L. ☉. stundenblühender Fr.
32. *vesicarius* Cav. ☉. aufgeblasener Fr.
33. *virgatus* Hort. Berol. ☉. ruthenartiger w. H.

Hieracium. Habichtskraut.

1. *aurantiacum* L. 4. pomeranzenfarbiges Fr.
2. *aureum* Vill. 4. goldfarbiges Fr.

Leontodon aureum L.

3. *blattarioides* L. 4. schabenkrautartiges Fr.
4. *cerinthoides* L. 4. wachsblumenblättriges Fr.
5. *cydoniaefolium* Vill. 4. quittenblättriges Fr.
6. *fallax* W. 4. betrügliches Fr.

H. cymosum Desf.

7. *foliosum* W. et K. 4. blättriges Fr.
8. *fruticosum* W. ♀. strauchartiges C. H.
9. *glaucum* Dec. 4. graues Fr.
10. *Halleri* Vill. 4. hallerisches Fr.
11. *hirsutum* Bernh. 4. rauhes Fr.
12. *humile* Host. 4. niedriges Fr.

H. Jacquini Vill.

H. humile Host.

13. *intybaceum* Jacq. 4. cichorienartiges Fr.

H. albidum Vill.

14. *Lachenalii* Gmel. fl. bad. 4. Lachenalisches Fr.
15. *laevigatum* W. En. 4. glattes Fr.
16. *murorum* L. 4. Mauer Fr.

Hieracium. Habichtskraut.

17. nigrescens W. En. 4. schwärzliches Fr.
18. ovatum Schl. 4. eiförmiges Fr.
19. paniculatum L. 4. rispiges Fr.
20. pallescens W. et K. 4. bleiches Fr.
21. Pilosella L. 4. einblumiges Fr.
22. piloselloides Vill. 4. behaartes Fr.
23. porrifolium L. 4. lauchblättriges Fr.
24. prostratum Dec. 4. gestrecktes Fr.
25. praemorsum L. 4. abgebissenes Fr.
26. racemosum W. et K. 4. traubenartiges Fr.
27. ramosum W. et K. 4. ästiges Fr.
28. sabaudum L. 4. savoisches Fr.
29. scabrum Desf. 4. scharfes Fr.
30. sibiricum W. En. 4. sibirisches Fr.

Crepis sibiricum L.

31. speciosum Hornem. 4. schönes Fr.
32. staticaefolium All. 4. grasnelkenblättriges Fr.
33. tubulosum Lam. 4. hohles Fr.
34. umbellatum L. 4. doldenförmiges Fr.
35. undulatum Ait. 4. wellenblättriges.
36. virgatum Pursch. 4. ruthenförmiges.

Hippia. Hippie.

1. frutescens L. h. strauchartige C. H.

Hippocrepis. Pferdehuschote.

1. balearica Jacq. h. strauchartige C. H.
2. ciliata W. ☉. gefranzte Fr.
3. comosa L. 4. schopfge Fr.
4. multisiliquosa L. ☉. vielschotige Fr.
5. unisiliquosa L. ☉. einschotige Fr.

Hippomane vid. **Sapium.**

Hippophae. Sanddorn.

1. canadensis L. h. canadischer Fr.
2. rhamnoides L. h. gemeiner Fr.

Hippuris. Tannenwedel.

1. vulgaris L. 4. gemeiner Fr.

Hoffmannseggia. Hoffmannseggie.

- falcaria Cav. h. sichelblättrige w. H.

Holcus. Rofsgras.

1. bulbosus Schrad. 4. zwiebeltragendes. Fr.
2. lanatus L. 4. wolliges. Fr.
3. mollis L. 4. weiches. Fr.

Holosteum. Sparre.

1. cordatum L. ☉. herzblättrige. Fr.

Homalium. Homalie.

1. racemosum Jacq. ♀. traubige. w. H.

Hopea. Hope.

1. tinctoria L. ♀. färbende. C. H.
- Symplocos tinctoria Herit.*

Hordeum. Gerste.

1. bulbosum L. 4. knollige. Fr.
2. distychon L. ☉. zweyzeiliche. Fr.
- b. nudum. ☉. nackte. Fr.
3. hexastichon L. ☉. sechszeiliche. Fr.
4. jubatum L. ☉. männenartige. Fr.
5. maritimum W. En. ☉. Meerstrands. Fr.
6. murinum L. ☉. Mäuse. Fr.
7. nigrum L. ♂. schwarze. Fr.
8. vulgare L. ☉. gemeine. Fr.
9. Zeocriton L. ☉. Bart Gerste. Fr.

Horminum. Scharlachkraut.

1. pyrenaicum L. 4. pyrenäisches. Fr.
- Melissa pyrenaica Scop.*

Hornemannia. Hornemannie.

1. bicolor W. ☉. zweyfarbige. C. H.
2. ovata Link. ☉. eyrunde. Fr.
3. viscosa W. ☉. klebrige. Fr.

Hosta. Hoste.

1. coerulea Jacq. ♀. blaue. w. H.
- Cornutia punctata W.*

Hottonia. Hottonie.

1. palustris L. 4. Sumpf. Fr.

Houstonia. Houstonie.

1. coccinea W. En. ♀. scharlachfarbene. C. H.
Jxora americana Jacq.
Bouvardia triphylla Salisb.
2. crocea H. Cels. ♀. safranfarbene. C. H.

Houttuynia. Houttuynie.

1. cordata Thunb. 4. herzblättrige. C. H. et Fr.

Hovenia. Hovenie.

1. dulcis Thunb. ♀. süsse. C. H.

Hoya. Høye.

1. carnosa R. Br. ♀. dickblättrige. w. H.
Schollia carnosa Schrank.
Asclepias carnosa L.
2. viridiflora R. Br. ♀. grünblumige. w. H.
Schollia volubilis Jacq.
Asclepias volubilis L. fil.

Hura. Sandbüchsenbaum.

- crepitans L. ♀. gemeiner. w. H.

Humea. vid. Calomera.

Humulus. Hopfen.

1. Lupulus L. 4. gemeiner. Fr.

Hutchinsia vid. Lepidium.

Hyacinthus. Hyacinthe.

1. amethystinus L. 4. amethystfarbene. Fr.
botryoides vid. Muscari.
2. dubius Gouss. 4. zweifelhafte. Fr.
Muscari vid. *Muscari*
3. non scriptus W. En. 4. englische. Fr.
4. orientalis L. 4. gemeine. Fr.
mit vielen gefüllten und einfachen Abarten. Fr.

Hydrangea. Hydrangea.

1. arborescens L. h. baumartige Fr.
2. hortensis L. h. schönblühende C. H.
Hortensia mutabilis Hortul.
— *opuloides* Lam.
3. quercifolia Bartr. h. eichenblättrige C. H.
4. radiata W. h. herzblättrige C. H.
H. nivea Mich.

Hydrastis. Hydrastis.

1. canadensis L. 4. canadische C. H.

Hydrochaeris. Hydrochaeris.

1. Morsus ranae L. 4. Froschbiss Fr.

Hydrocotyle. Wassernabel.

1. americana L. 4. amerikanischer Fr.
2. asiatica L. 4. asiatischer Fr.
3. repanda Pers. 4. ausgeschweiftblättriger Fr.
H. cordata Walt.
4. Sibthorpioides Lam. 4. sibthorpienartiger Fr.
H. ranunculoides L.
5. vulgaris L. 4. gemeiner Fr.

Hydrolea. Kletter.

1. spinosa L. ☉. stachlicher w. H.

Hydroglossum. Wasserzunge.

1. japonicum W. 4. japanische C. H.
Lygodium japonicum Sw.
Ophioglossum japonicum Thunb.

Hydrophyllum. Rinnenblume.

1. canadense L. 4. canadische Fr.
2. magellanicum Lam. 4. Magellanische Fr.
3. virginicum L. 4. virginische Fr.

Hymenaea. Heuschreckenbaum.

1. Curbaril L. h. gemeiner w. H.

Hyoscyamus. **Bilsenkraut.**

1. albus L. ☉. weisses Fr.
 2. agrestis W. et K. ☉. Acker Fr.
 3. aureus L. ☿. goldfarbenes C. H.
 4. niger L. ♂. schwarzes Fr.
 5. orientalis M. B. ♀. morgenländisches Fr.
 6. pallidus W. et K. ☉. blasses Fr.
 7. physaloides L. ♀. schlottenartiges Fr.
 8. pictus Bernh. ☉. gemaltes Fr.
 9. pusillus L. ☉. kleines Fr.
 10. reticulatus L. ☉. netzförmiges Fr.
 11. Scopolia L. ♀. glockenförmiges Fr.
- Scopolia carniolica Jacq.*

Hyoseris. **Schweinsalat.**

1. arenaria W. En. ☉. Sand Fr.
 2. lucida L. ☉. glänzender Fr.
 3. scabra L. ☉. rauher Fr.
 4. taraxacoides Lam. ☉. löwenzahnartiger Fr.
- virginica vid. Krigia.*

Hypocoum. **Lappenblume.**

1. procumbens L. ☉. liegende Fr.

Hypericum. **Johanniskraut.**

1. aegyptiacum L. ☿. ägyptisches C. H.
 2. Androsaemum L. ☿. breitblättriges Fr.
 3. Ascyron L. ♀. sibirisches Fr.
 4. attenuatum Link ☿. verdünntes C. H.
 5. balearicum L. ☿. balearisches C. H.
 6. calycinum L. ☿. großblumiges Fr.
 7. Coris L. ☿. vierblättriges C. H.
 8. crispum L. ♀. krauses Fr.
 9. dubium Leers. ♀. zweifelhaftes Fr.
- H. Leersii Gmel. fl. bad.*
10. elatum Ait. ☿. hohes Fr.
 11. elegans Stev. ♀. zierliches Fr.
- H. Kohleanum Spr.*
12. empetrifolium W. ☿. räuschbeerblättriges C. H.
 13. hircinum L. ☿. stinkendes Fr.
 14. humifusum L. ♀. kleines Fr.
 15. Kalmianum Duroi. ☿. Kalmisches Fr.
- H. prolificum L.*

Hypericum. **Johanniskraut.**

16. monogynum L. ♀. indisches C. H.
17. olympicum L. ♀. olympisches C. H.
18. perforatum L. 4. durchwachsenes Fr.
19. — b. veronense 4. veronesisches Fr.
H. veronense Schrank.
20. pulchrum L. 4. schönes Fr.
21. pyramidale Ait. 4. pyramidalisches Fr.
22. quadrangulare L. 4. viereckiges Fr.
23. tomentosum L. ♀. filziges Fr.
24. undulatum Schousb. 4. wellenförmiges Fr.

Hypochaeris. **Ferkelkraut.**

1. Balbisii NoCCA. ☉. balbisisches Fr.
2. glabra L. ☉. glattes Fr.
3. helvetica L. 4. schweizer Fr.
4. hispida W. En. ☉. borstiges Fr.
5. maculata L. 4. geflecktes Fr.
6. radicata L. 4. langwurzliches Fr.

Hypoxis. **Härtling.**

1. alba L. 4. weißer C. H.
2. villosa L. 4. haariger C. H.

Hyptis. **Linksblume.**

1. persica W. En. ♀. persische C. H.
2. radiata W. 4. gestrahlte C. H.

Hyssopus. **Isop.**

1. Lophanthus L. 4. chinesischer Fr.
2. nepetoides L. 4. weißer Fr.
3. officinalis L. ♀. gemeiner Fr.
4. orientalis L. ♀. morgenländischer C. H.
5. scrophulariaefolius L. 4. langgrifflicher Fr.

J.

Jacquinia. **Jacquinie.**

1. aurantiaca Ait. ♀. oranggelbe C. H.
2. mucronata W. ♀. weichstachelige C. H.

Jasione. Scabiose.

1. montana L. ☉. Berg Fr.

Jasminum. Jasmin.

1. azoricum L. ☿. azorischer C. H.
2. flexile Vahl. ☿. biegsamer w. H.
J. heterophyllum Moench.
J. mauritanicum Desf.
3. fruticans L. ☿. strauchartiger Fr.
4. gracile Andr. ☿. schlanker C. H.
J. colubile Jacq.
J. geniculatum Vent.
5. grandiflorum L. ☿. großblüthiger C. H.
6. hirsutum Smith. ☿. haariger w. H.
J. pubescens L.
7. humile L. ☿. niedriger Fr.
8. laurifolium Hort. anglor. ☿. lorbeerblättriger C. H.
9. odoratissimum L. ☿. wohlriechender C. H.
10. officinale L. ☿. gemeiner Fr.
11. — b. foliis variegatis ☿. mit bunten Blättern Fr.
12. revolutum Sims. ☿. zurückgerollter w. H.
J. triumphans bon. jard.
13. Sambac L. ☿. arabischer w. H.
Mogorium Sambac Lam.
14. — b. flore pleno ☿. gefülltblühender w. H.
15. simplicifolium W. ☿. einblättriger w. H.
16. tortuosum W. ☿. gedrehter w. H.
J. flexile Jacq.
17. undulatum L. ☿. wellenförmiger w. H.

Jatropha. Brechnufs.

1. Curcas L. ☿. schwarze w. H.
2. coccinea H. Cels. ☿. scharlachrothe w. H.
3. gossypifolia L. ☿. baumwollenblättrige w. H.
4. napaeifolia W. En. ☿. zerschlitzblättrige w. H.
5. panduraefolia Andr. ☿. geigenblättrige w. H.
6. urens L. ☿. brennende w. H.

Iberis. Baurensenf.

1. amara L. ☉. bitterer Fr.
2. Gibraltarica L. ☿. gibraltarischer C. H.
3. odorata L. ☉. wohlriechender Fr.
4. parviflora Lam. ☉. kleinblüthiger Fr.

Jberis. Baurensenf.

5. pinnata L. ☉. gefiederter Fr.
6. pubescens W. ☿. weichhaariger Fr.
7. semperflorens L. ☿. immerblühender C. H.
8. — b. foliis variegatis ☿. mit bunten Blättern C. H.
9. sempervirens L. ☿. immergrüner Fr.
10. — b. garrexiana All. ☿. garrexianischer Fr.
11. umbellata L. ☉. doldenblüthiger Fr.

Jlex. Stechpalme od. Hülse.

1. aquifolium L. ☿. gemeine Fr.
2. — b. crassifolia Ait. ☿. mit dicken Blättern Fr.
3. — c. echinata ☿. mit stacheligen Blättern Fr.
4. — d. foliis aureis et argenteis variegatis ☿. Fr.
mit gold- und silberbunten Blättern.
5. aestivalis Lam. ☿. Sommer C. H.
J. prinoides Ait.
6. balearica Desf. ☿. balearische C. H.
7. capensis H. Cels. ☿. capische C. H.
8. Cassine L. ☿. lorbeerblättrige C. H.
9. crocea Thunb. ☿. capische C. H.
10. Dahoon Walt. ☿. Dahoonische C. H.
11. opaca Ait. ☿. dunkelblättrige C. H.
12. perado Ait. ☿. Maderische C. H.
J. crassifolia Duham.
13. salicifolia W. ☿. weidenblättrige C. H.

Jllecebrum. Knorpelblume.

1. lanatum L. ☉. filzige w. H.
2. Paronychia L. ♂. glänzende C. H.
3. pubescens Dec. ♀. weichhaarige C. H.
4. serpyllifolium Vill. ♀. quendelblättrige Fr.

Jllicium. Sternanis.

1. anisatum L. ☿. ächter C. H.
2. floridanum L. ☿. unächter C. H.
3. parviflorum Vent. ☿. kleinblüthiger C. H.

Jmpatiens. Balsamine.

1. balsamina L. ☉. gemeine Fr.
mit mehreren Abarten.
2. nolitangere L. ☉. gelbe Waldbalsamine Fr.

Imperatoria.

Meisterwurz.

1. angustifolia Bellard. 4. schmalblättrige Fr.
2. caucasica Spr. 4. caucasische Fr.
Selinum caucasicum M. B.
3. Ostruthium L. 4. gemeine Fr.
Selinum Ostruthium Walt.

Indigofera.

Indigo.

1. Anil L. 5. sichelfrüchtiger w. H.
2. australis W. En. 5. südlicher C. H.
3. hirsuta L. 5. haariger C. H.
4. psoraloides L. 5. psoralienartiger C. H.
5. tinctoria L. 5. gemeiner w. H.
6. viscosa Lam. 6. klebriger w. H.

Jnga.

Jnge.

1. alba W. 5. weisse w. H.
Mimosa alba Sw.
2. foetida Jacq. 5. stinkende w. H.

Inula.

Alant.

1. arabica L. 4. arabischer Fr.
2. bifrons L. 5. geflügelter Fr.
3. britannica L. 4. gelbes Sumpfsternkraut Fr.
4. Bubonium L. 4. knorpliger Fr.
5. crithmifolia L. 4. dickblättriger Fr.
6. ensifolia L. 4. nerviger Fr.
7. germanica L. 4. deutscher Fr.
8. Helenium L. 4. wahrer Fr.
9. hirta L. 4. steifhaariger Fr.
10. oculus Christi L. 4. weifsblättriger Fr.
11. provincialis L. 4. französischer Fr.
12. salicina L. 4. weidenblättriger Fr.
13. squarrosa L. 4. sparriger Fr.

Ipomoea.

Trichterwinde.

1. barbata Roth. 6. bartige Fr.
2. bona nox L. 6. stachliche Fr.
3. carolina L. 6. carolinische Fr.
4. coccinea L. 6. scharlachrothe Fr.
5. hederacea L. 6. behaarte Fr.
6. hirsuta R. Br. 6. haarige Fr.
7. mutabilis Ker. 4. veränderliche Fr.

Ipomoea. Trichterwinde.

8. Nil. Pers. ☉. blaue Fr.
9. Quamoclit L. ☉. gefiederte w. H.
10. ternata Jacq. ☿. gedreyte w. H.
11. tuberosa L. ♀. knollige w. H.
12. violacea L. ☉. violette Fr.

Jresine. Strausfeder.

1. celosioides L. ♀. Floridanische Fr.
2. diffusa Tumb. ☿. ausgebreitete w. H.

Jris. Schwertel.

1. acuta W. En. Supl. ♀. spitziger Fr.
2. arenaria W. et K. ♀. Sand Schwertel Fr.
3. biflora L. ♀. doppelblüthiger Fr.
4. cristata Ait. ♀. kammförmiger Fr.
5. dichotoma Pall. ♀. gabelförmiger Fr.
6. fimbriata Vent. ♀. gefranzter Fr.
- J. chinensis* Curt.
7. florentina L. ♀. Florentinischer Fr.
8. foetidissima L. ♀. stinkender Fr.
9. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
10. germanica L. ♀. deutscher Fr.
11. graminea L. ♀. grasblättriger Fr.
12. güldenstaedtii W. En. Güldenstädtischer Fr.
13. halophila Pall. ♀. Salzschwertel Fr.
14. hungarica W. et K. ♀. ungarischer Fr.
15. longifolia Andr. ♀. langblättriger Fr.
16. lutescens Lam. ♀. gelblicher Fr.
17. mongolica Link. ♀. Mongolischer Fr.
18. Ochroleuca W. ♀. weißgelber Fr.
19. orientalis Thunb. ♀. morgenländischer Fr.
20. pallida L. ♀. blafsblauer Fr.
21. pavonia L. ♀. pfauenschweifiger C. H.
22. persica L. ♀. persischer C. H.
23. Pseud-Acorus L. ♀. wasserlilie Fr.
24. pumila L. ♀. niedriger Fr.
25. sambucina L. ♀. Hollunder Fr.
26. sibirica L. ♀. sibirischer Fr.
27. — b. fl. albis ♀. mit weissen Blumen Fr.
28. Spathulata L. ♀. spathelblättriger Fr.
29. spuria L. ♀. Bastard Fr.
30. squalens L. ♀. gelbbunter Fr.
- J. variegata* Jacq.

Jris. *iris* Schwertel.

31. *susiana* L. 4. prächtiger C. H.
32. *Swertii* L. 4. schwertischer Fr.
33. *variegata* L. 4. bunter Fr.
34. *versicolor* L. 4. vielfarbiger Fr.
35. *virginica* L. 4. virginischer Fr.
36. — b. *flore albo* 4. mit weißer Blume Fr.
37. *Xyphioides* L. 4. englischer Fr.
J. anglica Hortul.
38. *Xyphium* L. 4. spanischer Fr.
J. hispanica Hortul.

Jsatis.

Waid.

1. *armena* L. ♂. armenischer Fr.
2. *praceox* W. et K. ♂. frühblühender.
3. *tinctoria* L. ♂. gemeiner Fr.

Jsnardia.

Jsnardie.

1. *palustris* L. ☉. Sumpf Fr.

Jsopyrum.

Jsopyrum.

1. *fumarioides* L. ☉. erdrauchartiges Fr.
2. *thalictroides* L. 4. wiesenrauteähnliches Fr.

Jtea.

Jtea.

1. *virginica* L. ♀. virginische Fr.
spinosa vid. *Bursaria*.

Juglans.

Wallnufs.

1. *alba* L. ♀. weisse Fr.
J. tomentosa Mich.
2. *cinerea* L. ♀. graue Fr.
J. oblonga Mill.
3. *compressa* Gaert. ♀. zusammengedrückte Fr.
J. squamosa Mich.
4. *fraxinifolia* Lam. ♀. eschenblättrige Fr.
5. *nigra* L. ♀. schwarze Fr.
6. *olivaeformis* Mich. ♀. olivenförmige Fr.
J. angustifolia Ait.
J. Pekan Walt.
7. *porcina* Mich. ♀. schweinsnufs Fr.
8. *regia* L. ♀. gemeine Fr.
9. — b. *fructu maximo* ♀. mit grosser Frucht.
10. *sulcata* W. ♀. gefurchte Fr.

Juncus.

Simse.

1. bottnicus Wahlenb. 4. Bottnische Fr.
2. buffonius L. ☉. kröten Fr.
3. conglomeratus L. 4. kugelrispige Fr.
4. effusus L. 4. weitrispige Fr.
5. fusco ater. Schrad. 4. schwärzliche Fr.
6. glaucus Ehrh. 4. graue Fr.
7. helodes L. 4. fremde Fr.
8. lampocarpus Ehrh. 4. gegliederte Fr.
J. articulatus Schrank.
9. monanthos Jacq. 4. einstachliche Fr.

Juniperus.

Wachholder.

1. barbadensis L. ♀. Barbados C. H.
2. bermudiana L. ♀. bermudischer C. H.
3. communis L. ♀. gemeiner Fr.
4. drupacea Labill. ♀. beeriger C. H.
5. lycia L. ♀. Cypressenwachholder C. H.
6. Oxycedrus L. ♀. spanischer Fr.
7. phoenicea L. ♀. dichtnadtiger C. H.
8. prostrata Mich. ♀. niederliegender C. H.
9. Sabina L. ♀. stinkender Fr.
10. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
11. thurifera L. ♀. Weyrauch C. H.
12. virginiana L. ♀. virginischer Fr.

Justicia.

Justicie.

1. Adhadota L. ♀. treibende C. H.
2. biflora Vahl. ♀. zweyblumige w. H.
3. bracteolata Jacq. ♀. mennigrothe w. H.
4. caracasana Jacq. ♀. caracasaneische w. H.
5. ciliaris L. ☉. gefranzte Fr.
6. coccinea Pers. ♀. scharlachrothe w. H.
7. cristata Jacq. ♀. kammförmige w. H.
8. Echolium L. ♀. grünblühende w. H.
flava vid. Barleria.
9. formosa W. ♀. schöne w. H.
10. Gendarussa L. ♀. weidenblättrige w. H.
11. hyssopifolia L. ♀. isopblättrige C. H.
12. nasuta L. ♀. schnabelförmige w. H.
13. nitida Jacq. ♀. glänzende w. H.
14. orchiodes L. ♀. ginsterblättrige C. H.
15. peruviana Cav. ♀. peruvianische w. H.
J. foliosa Jacq.

Justicia.

Justicie.

16. picta L. h. bunte w. H.
17. quadrifida Vahl. h. vierspaltige C. H.
J. coccinea Cav.
J. virgularis Salisb.
18. — b. latifolia H. et B. h. mitbreiten Blättern:
J. superba latifolia H. Par.
19. Ryani Vahl. h. Ryanische w. H.
bicolor et parvifolia vid. Eranthemum.

Jva.

Jva.

1. frutescens L. h. strauchartige C. H.

Jxia.

Jxie.

1. bulbifera L. 4. zwiebeltragende C. H.
2. corymbosa L. 4. doldentraubige C. H.
3. crocata L. 4. safranfarbige C. H.
Tritonia crocata Ait.
4. — b. fl. aureo 4. goldgelbe C. H.
5. — c. pallida 4. blasse C. H.
6. — d. rosea 4. rosenfarbene C. H.
7. fragrans Jacq. 4. duftende C. H.
8. hyalina W. 4. durchsichtige C. H.
J. fenestrata Jacq.
9. lancea Thunb. 4. lanzenblättrige C. H.
10. maculata L. 4. gefleckte C. H.
11. tricolor Curt. 4. dreyfarbige C. H.
12. villosa Jacq. 4. weifsblaue C. H.
13. — b. florib. purpureis 4. mit rothen Blüthen C. H.

Jxodia.

Jxodie.

1. achillaeoides R. Br. h. schaaftarbenartige C. H.

Jxora.

Jxore.

1. coccinea L. h. scharlachrothe w. H.
2. Pavetta Andr. h. indische w. H.
3. purpurea Fisch. h. purpurrothe w. H.

K.

Kaempferia.

Kaempferie.

1. Galanga L. 4. wahre w. H.

Kaempferia. Kaempferie.

2. — b. angustifolia 4. mit schmalen Blättern.
3. ovata Rose. 4. eiförmige w. H.
4. pandurata Roxb. 4. geigenförmige w. H.
5. rotunda L. 4. gestielte w. H.

Kalmia. Kalmie.

1. angustifolia L. 5. schmalblättrige Fr.
2. — b. oleaefolia Pers. 5. ölbaumblättrige Fr.
3. glauca L. 5. graue Fr.
4. latifolia L. 5. breitblättrige Fr.

Kennedia. Kennedic.

1. coccinea Vent. 5. scharlachrothe C. H.
2. glabra H. C. 5. glatte C. H.
3. monophylla Vent. 5. einblättrige C. H.
Glycine bimaculata Curt.
4. rubicunda Vent. 5. dunkelrothe C. H.
Glycine rubicunda W.

Kiggellaria. Kiggellarie.

1. africana L. 5. gesägte C. H.

Kirganella vid. Phyllanthus.

Kitaibelia. Kitaibelie.

1. vitifolia W. 4. weinblättrige Fr.

Kleinia. Kleinie.

1. Porophyllum W. ☉. durchlöchernte Fr.
Cacalia Porophyllum L.

Knautia. Knautie.

1. orientalis L. ☉. morgenländische Fr.
2. plumosa L. ☉. fedrige Fr.

Knowltonia. Knowltonie.

1. vesicatoria Sims. 4. blasenziehende C. H.
Adonis capensis Lam.
— *laserpitiiifolia* Poir.
Anamenia laserpitiiifolia Vent.

Kochia.

Kochie.

1. arenaria W. et K. ☉. sandwachsende Fr.
Willemetia arenaria Merkl.
2. eriophora Schrad. ☉. wollsaamige Fr.
3. hyssopifolia W. ☉. Isopblättrige Fr.
Salsola hyssopifolia Pall.
4. prostrata W. ☿. niedergestreckte Fr.
Chenopodium villosum Lam.
- 5 scoparia Schrad. ☉. pfriemenartige Fr.
Chenopodium scoparium L.
6. sedoides W. ☉. hauslaubartige Fr.
Salsola cinerea W. et K.
sericea vid. Chenolea.

Koelreuteria.

Koelreuterie.

1. paniculata Laxm. ☿. rispentrage Fr.
Sapindus chinensis L.

Koeleria.

Koelerie.

1. brachystachya Dec. ☉. armige Fr.
2. cristata Pers. ☉. kammförmige Fr.
Aira cristata L.

Krigia.

Krigie.

1. virginica W. En. ☉. virginische Fr.
Hyoseris virginica L.

Kyllingia.

Kyllingie.

1. inodora Link. ☉. geruchlose Fr.
2. monocephala L. ♀. einblättrige Fr.
3. triceps L. ♀. dreyköpfige Fr.

L.

Lachenalia.

Lachenalie.

1. lancaefolia Jacq. ♀. lanzettblättrige C. H.
2. luteola Jacq. ♀. gelbliche C. H.
3. pallida Thunb. ♀. bleiche C. H.
4. pendula Ait. ♀. hängende C. H.
L. quadricolor Jacq.
5. tricolor Ait. ♀. dreyfarbige C. H.

Lachnaea. Lachnaea.

1. eriocephala L. ♀. wollenköpfige C. H.
Passerina eriocephala Thunb.

Lactuca. Salat.

1. crispa Roth. ☉. krauser Fr.
2. elongata W. En. ♂. langähriger Fr.
3. intybacea Jacq. ☉. cichorienartiger Fr.
4. palmata W. ☉. handförmiger Fr.
L. laciniata Roth.
5. perennis L. ♀. ausdaurender Fr.
6. quercina L. ☉. eichenblättriger Fr.
7. sativa L. ☉. gemeiner Kopfsalat Fr.
8. Scariola L. ☉. wilder Fr.
9. stricta W. ♂. gerader Fr.
10. virosa L. ☉. giftiger Fr.

Lagascea. Lagascea.

1. mollis Cav. ☉. weiche Fr.

Lagerstroemia. Lagerstroemie.

1. indica L. ♀. chinesische C. H.
2. reginae Roxb. ♀. prächtige C. H.

Lagoecia. Federknopf.

1. cuminoides L. ☉. kümmelartiger Fr.

Lagosëris vid. Crepis.

Lagunaea. Lagunaea.

1. lobata Willd. ☉. lappige w. H.
Hibiscus Solandra Herit.
2. squamea Vent. ♀. schuppige C. H.
L. Patersonia Pers.
3. sinuata Hornem. ☉. buchtige w. H.

Lagurus. Samtgras.

1. ovatus L. ☉. eyförmiges Fr.

Lamarkea. Lamarkea.

1. dendata?.... ♀. gezahnte w. H.

Lambertia. **Lambertie.**

1. formosa Smith. †. zierliche C. H.
Protea nectarina Schrad.

Lamium. **Bienensaug.**

1. album L. 4. weißer Fr.
2. amplexicaule L. ☉. stengelumfassender Fr.
3. garganicum L. 4. italienischer Fr.
4. maculatum L. 4. gefleckter Fr.
5. Orvala L. 4. großblüthiger Fr.
6. purpureum L. ☉. purpurrother Fr.
7. rugosum Ait. 4. runzlicher Fr.

Lantana. **Lantane.**

1. aculeata L. †. stachliche w. H.
2. alba Mill. †. weiße w. H.
3. annua L. ☉. jährige w. H.
L. trifolia Medic.
4. Camara L. †. veränderliche w. H.
Fiburnum americanum Pluck.
5. involucrata L. †. andornblättrige w. H.
6. lavandulacea W. †. lavendelblättrige w. H.
7. melissaefolia Ait. †. melissenblättrige w. H.
8. mixta L. †. bunte w. H.
9. nivea Vent. †. schneeweiße w. H.
10. odorata L. †. wohlriechende w. H.
11. radula Sw. †. raspelblättrige w. H.
12. salicifolia Jacq. †. salbeyblättrige w. H.
13. stricta Sw. †. aufrechte w. H.
14. trifoliata Ait. †. dreyblättrige w. H.
15. violacea Desf. †. violette w. H.

Lapsana. **Rainkohl.**

1. communis W. En. ☉. gemeiner Fr.
2. lyrata W. En. 4. leyerförmiger Fr.

Laserpitium. **Laserkraut.**

1. angustifolium L. 4. schmalblättriges Fr.
aquilegifolium vid. Siler.
2. archangelica Jacq. 4. archangelisches Fr.
3. caucasicum M. B. 4. caucasisches Fr.
4. ferulaceum L. 4. seckenkrautartiges Fr.
5. hispidum M. B. 4. hackiges Fr.

Laserpitium. **Laserkraut.**

6. latifolium L. 4. breitblättriges Fr.
7. prutenicum W. En. 4. preussisches Fr.
8. silaifolium W. En. 4. silgeblättriges Fr.
- Ligusticum apioides* Spr.
9. Siler L. 4. gebräuchliches Fr.

Lasiopetalum. **Haarblatt.**

1. ferrugineum Smith. h. rostfarbenes C. H.
2. purpureum Ait. h. purpurrothes C. H.
8. quercifolium Andr. h. eichblättriges C. H.
4. solanaceum Sims. h. nachtschattenblättriges C. H.

Latania. **Sammetpalme.**

1. rubra L. h. rothe w. H.

Lathyrus. **Platterbse.**

1. annuus L. ☉. jährige Fr.
2. Aphaca L. ☉. blattlose Fr.
3. articulatus L. ☉. gegliederte Fr.
4. Clymenum L. ☉. orientalische Fr.
5. cornutus Spr. ☉. gehörnte Fr.
6. hirsutus Lam. ☉. haarige Fr.
7. latifolius L. 4. breithlättrige Fr.
8. odoratus L. ☉. wohlriechende Fr.
9. pratensis L. 4. gelbe Fr.
10. sativus L. ☉. essbare Fr.
11. spurius W. ☉. falsche Fr.
12. sylvestris L. 4. Wald Fr.
13. tingitanus Jacq. ☉. afrikanische Fr.
14. tuberosus L. 4. knollige Fr.
15. tumidus Lam. ☉. aufgeblasene Fr.

Laurus. **Lorbeer.**

1. Benzoin L. h. Benzoin Fr.
- L. aestivalis* Wagh.
2. Borbonia L. h. rother C. H.
3. Camphora L. h. Campherbaum C. H.
4. caroliniensis Mich. h. carolinischer C. H.
5. Cassia L. h. Cassien-Lorbeer C. H.
6. Cinamomum L. h. Zimmet C. H.

Laurus. Lorbeer.

7. Culilaban W. ♀. bitterer w. H.
8. foetens Ait. ♀. stinkender C. H.
L. maderiensis Lam.
9. geniculata Walt. ♀. gegliederter C. H.
10. indica L. ♀. indischer C. H.
11. nobilis L. ♀. edler (gemeiner) C. H.
12. — b. foliis undulatis ♀. mit wellenförm. Bltrn. C. H.
13. — c. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern C. H.
14. — d. salicinis ♀. mit weiden Blättern C. H.
15. Sassafras L. ♀. Sassafras-Lorbeer Fr.
16. tomentosa H. Cels. ♀. filziger C. H.

Lavandula. Lavendel.

1. abrotanoides Lam. ♂. stabwurzartiger C. H.
2. denticata L. ♀. gezahnter C. H.
3. latifolia Ehrh. ♀. breitblättriger Fr.
4. multifida L. ♀. vielspaltiger C. H.
5. pinnata L. ♀. gefiederter C. H.
6. Spica L. ♀. gemeiner Fr.
7. Stoechas L. ♀. Schopflavendel C. H.

Lavatera. Lavatere.

1. arborea L. ♂. baumartige C. H.
2. acerifolia Dec. ♀. ahornblättrige C. H.
3. cretica L. ☉. candische Fr.
4. maritima Cav. ♀. Meerstrands C. H.
5. micans L. ♀. schimmernde C. H.
6. neapolitanica Tenore ☉. neapolitanische Fr.
7. Olbia L. ♀. Olbische C. H.
8. Pseudo Olbia Desf. ♀. unächt-olbische C. H.
9. punctata All. ☉. punctirte Fr.
10. triloba L. ♀. dreylappige C. H.
11. trimestris L. ☉. dreymonatliche Fr.
12. thuringiaca L. ♂. Thüringsche Fr.
13. unguiculata Desf. ♀. langnägliche C. H.
L. tomentosa Dum. Cours.

Lawsonia. Alkanna.

1. inermis L. ♀. ächte C. H.
Lausonia inermis Pers.

Lecythis. Topfbaum.

1. bracteata W. ♀. beblätterter w. H.

Lebeckia. Lebeckie.

1. cytisoides Thunb. h. bohnenbaumblättrige C. H.
Spartium cytisoides L.

Ledum. Porst.

1. latifolium Ait. h. breitblättriger Fr.
2. palustre L. h. Sumpf Fr.

Leea. Leea.

1. crispa L. 4. krause w. H.
2. hirta Hornem. h. rauhe w. H.

Leontodon. Löwenzahn.

aureus vid. Hieracium.

1. obovatus W. 4. breitblättriger Fr.
2. serotinus W. et K. 4. späther Fr.
3. Taraxacum L. 4. gemeiner Fr.

Leonurus. Wolfstrapp.

1. Cardiaca L. 4. gemeiner Fr.
2. crispus W. 4. krauser Fr.
3. Marrubiastrum L. 4. andornartiger Fr.
4. multifidus Desf. ☉. geschlitzter Fr.
5. neglectus Schult. ☉. unansehnlicher Fr.
6. tataricus L. ♂. tatarischer Fr.
7. villosus Desf. 4. filziger Fr.

Lepechinia. Lepechinie.

1. spicata W. En. 4. ährenförmige C. H.

Lepidium. Kresse.

1. bonariense L. ☉. brasilianische Fr.
2. crassifolium W. et K. 4. dickblättrige Fr.
3. Iberis L. ☉. Schmalblättrige Fr.
L. Pollichii W.
4. latifolium L. 4. breitblättrige Fr.
5. lyratum L. ☉. leyerblättrige Fr.
6. petraeum L. ♂. Stein-Kresse Fr.
Hutchinsia petraea Ait.
7. sativum L. ☉. gemeine Fr.
8. spinosum L. ☉. spitztheilige Fr.
9. suffruticosum L. h. staudige C. H.
10. virginicum L. ☉. virginische Fr.

Leptochloa: vid. Eleusine.

Leptospermum. Südseemyrte.

1. acuminatum Wendl. h. spitzblättrige C. H.
2. ambiguum Smith. h. zweifelhafte C. H.
Metrosideros corifolia Vent.
3. arachnoideum Smith. h. spinnenwebenartige C. H.
4. attenuatum Smith. h. verdünnte C. H.
5. baccatum Smith. h. beerentragende C. H.
6. canescens Wendl. h. graue C. H.
7. emarginatum Wendl. fil. h. gerandete C. H.
Melaleuca nervosa Hortor.
8. flexuosum Link h. niedergebogene C. H.
Metrosideros flexuosa W. En.
Eucalyptus resinifera Hortor.
Melaleuca paludosa H. Vindeb.
Leptospermum glomeratum Wendl. fil.
9. grandifolium Smith. h. großblättrige C. H.
10. juniperinum Smith. h. wachholderblättrige C. H.
L. tenuifolium Cav.
11. lanigerum Smith. h. wollige C. H.
12. rubricaule H. Cels. h. rothstielige C. H.
13. scoparium Smith. h. besenartige C. H.
14. — b. myrtifolium Ait. h. mit Myrtenblätt. C. H.
15. Thea W. h. theegebende C. H.
L. flavescens Ait.
Melaleuca Thea Schrad.
16. — b. minor. h. kleinere C. H.

Lessertia.

Lessertie.

1. annua Dec. ☉. krautartige Fr.
Colutea herbacea L.
2. perennans. Dec. 4. dauernde C. H.
Colutea perennans Jacq.

Lettsomia.

Lettsomie.

1. splendens?..... h. glänzende w. H.

Leucadendron vid. Protea.

Leucas vid. Phlomis.

Leucojum.

Knotenblume.

1. aestivum L. 4. Herbst Fr.
2. vernalum L. 4. Frühlings Fr.

Leucopogon. Leucopogon.

1. juniperinus R. Br. ♀. wachholderblättriger C. H.
2. lanceolatus R. Br. ♀. lanzettblättriger C. H.
Styphelia lanceolata Smith.
3. obovatus R. Br. ♀. verkehrteyförmiger C. H.

Leysera. Leysere.

1. gnaphaloides L. ♀. ruhrkrautartige C. H.

Liatris. Prachtscharte.

1. graminifolia W. 4. grasblättrige Fr.
2. spicata W. 4. ährenblüthige Fr.
Serratula spicata L.

Ligtfootia. Ligtfootie.

1. oxycoccoides Ait. ♀. moosbeerblättrige C. H.
Lobelia tenella L.

Ligusticum. Liebstöckel.

1. austriacum L. 4. österreichischer Fr.
2. Cervaria Spr. 4. hirschwurzartiger Fr.
Athamanta Cervaria L.
3. condensatum Spr. 4. dichter Fr.
4. Levisticum L. 4. gewöhnlicher Fr.
5. peloponense L. 4. peloponesischer Fr.
6. scoticum L. 4. schottischer Fr.
Angelica scotica Lam.
7. sibiricum Spr. 4. sibirischer Fr.
Athamanta sibirica L.
8. vaginatum Spr. 4. scheidiger Fr.

Ligustrum. Rainweide.

1. japonicum Thunb. ♀. japanische C. H. et Fr.
2. vulgare L. ♀. gemeine Fr.
3. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
4. — c. fructu luteo et albo ♀. mit gelb- und weißer Frucht Fr.
5. — d. fol. latioribus ♀. mit breitem Blättern Fr.

Lilium. Lilie.

1. bulbiferum L. 4. Feuer Fr.
2. camtschaticense L. 4. kamtschatische Fr.

Lilium.

Lilie.

3. canadense L. 4. canadische Fr.
4. candidum L. 4. weisse Fr.
5. chalcedonicum L. 4. chalcedonische Fr.
cordifolium vid. Hemerocallis.
6. japonicum Thunb. 4. japanische C. H.
7. Martagon L. 4. gelbwurzliche Fr.
8. monadelphicum M. B. 4. einbrüdrige Fr.
9. philadelphicum W. 4. philadelphische Fr.
10. pomponicum L. 4. pomponische Fr.
11. pyrenaicum Gouan. 4. pyrenäische Fr.
12. superbum L. 4. stolze Fr.
13. tigrinum Curt. 4. Tieger-Lilie Fr.

Limodorum.

Dingel.

altum vid. Cymbidium.

1. Tankervilliae W. En. 4. chinesischer w. H.
Bletia Tankervilliae R. Br.

Limonia.

Limonelle.

1. trifoliata L. 5. dreyblättrige w. H.

Linaria.

Frauenfläch's.

1. bipartita W. ☉. zweytheiliger Fr.
Anthirrhinum bipartitum Vent.
2. chalepensis L. ☉. aleppischer Fr.
3. cirrhosa L. ☉. rankender Fr.
4. cymbalaria L. 4. eckiger Fr.
5. Elatine W. ☉. liegender Fr.
6. genistifolia W. 4. ginsterblättriger Fr.
Anthirrhinum genistifolium L.
7. littoralis Bernh. ☉. Ufer Fr.
8. lusitanica Vent. 4. lusitanischer Fr.
9. minor. W. En. ☉. kleiner Fr.
Anthirrhinum minus L.
10. purpurea Ait. ☉. rother Fr.
Anthirrhinum purpureum L.
11. simplex W. En. ☉. einfacher Fr.
12. spuria Link ☉. Bastard Fr.
13. triphylla W. En. ☉. dreyblättriger Fr.
Anthirrhinum triphyllum L.
14. tristis W. 4. dunkelfarbiger Fr.
A. triste L.
15. versicolor W. En. ☉. bunter Fr.

Linnaea. Linnea.

1. borealis L. ♀. nordische Fr.

Linum. Flachs.

1. alpinum L. 4. Alpenflachs Fr.
2. angustifolium W. En. 4. schmalblättriger Fr.
3. austriacum L. ♂. österreichischer Fr.
4. decumbens Desf. ☉. niederliegender Fr.
5. diffusum Schrad. 4. ausgebreiteter Fr.
6. fasciculatum Mart. ☉. büscheliger Fr.
7. flavum L. 4. gelber Fr.
8. maritimum L. 4. Meerstrands Fr.
9. nervosum W. et K. 4. gerippter Fr.
10. perenne L. 4. ausdauernder Fr.
11. squamulosum W. En. 4. schuppenförmiger Fr.
12. suffruticosum L. ♀. strauchartiger C. H.
13. trigynum Smith. ♀. dreyweibiger C. H.
14. usitatissimum L. ☉. gemeiner Fr.
15. viscosum L. 4. klebriger Fr.

Liparia. Liparie.

1. sphaerica L. ♀. runde C. H.
2. villosa L. ♀. haarige C. H.

Lippia. Lippie.

1. hirsuta L. ♀. haarige w. H.
2. purpurea Jacq. ♀. purpurrothe w. H.

Liquidambar. Amberbaum.

1. imberbe Ait. ♀. orientalischer Fr.
2. styraciflua L. ♀. fliesender Fr.

Liriodendron. Tulpenbaum.

1. Tulipifera W. ♀. virginischer Fr.
2. — b. integrifolia ♀. mit ganzen Blättern Fr.

Lithospermum. Steinsame.

1. arvense L. ☉. Acker Fr.
2. distichum Pers. 4. zweyzeiliger Fr.
3. officinale L. 4. gemeiner Fr.
4. purpureo-coeruleum L. 4. rother Fr.
5. tenuiflorum L. ☉. kleinblüthiger Fr.

Littaea.

Littaea.

1. geminiflora Tagl. ♀. zweyblüthige w. H.
Bonaparteia juncea W. En. Supl.
Yucca Boscii Desf.
Agave geminiflora Journ. of. science.

Littorella.

Strandling.

1. lacustris L. 4. uferwachsender Fr.

Lobelia.

Lobelie.

1. bellidiflora L. ☉. masliebblüthige Fr.
2. bicolor Curt. 4. zweyfarbige C. H.
3. campanulata Lam. ☉. glockenblumige Fr.
4. cardinalis L. 4. cardinals Fr.
5. coronopifolia L. 4. schlitzblättrige C. H.
6. debilis L. ☉. schwache C. H.
7. crinoides L. ☉. schmalstielige Fr.
8. fulgens W. En. 4. schimmernde Fr.
9. inflata L. ☉. aufgeblasene Fr.
frutescens vid. *Scaevola*.
10. longiflora L. 4. langblüthige w. H.
11. siphilitica L. 4. gemeine Fr.
12. splendens W. En. 4. glänzende Fr.
13. surinamensis L. ♀. surinamische w. H.
14. triquetra L. 4. dreyeckige w. H.
15. urens L. ☉. brennende Fr.

Loddigesia.

Loddigesie.

1. oxalidifolia Ait. ♀. saurkleeblättrige C. H.

Loeflingia.

Loeflingie.

1. hispanica L. ☉. spanische Fr.

Logania.

Loganie.

1. latifolia R. Br. ♀. breitblättr. C. H.
Exacum vaginale. Labill.

Lolium.

Lolch.

1. complanatum Schrad. ☉. plattgedrückter Fr.
2. maximum W. ☉. großer Fr.
3. perenne L. 4. ausdauernder Fr.
4. temulentum L. ☉. betäubender Fr.
5. tenue L. ☉. zarter Fr.

Lomandra vid. Xerotes.

Lomatia. Lomatie.

1. longifolia R. Br. h. langblättrige C. H.
Embothrium myricoides Gaert.
2. silaifolia Smith. h. petersilienblättrige C. H.
Embothrium crithmifolium Smith.

Lomatophyllum. Saumblatt.

1. borbonicum V. h. borbonisches w. H.
Aloe marginalis Dec.
Dracaena marginata Ait.

Lonicera. Lonicere.

1. alpigena L. h. Alpen Fr.
Isika alpigena Borkh.
2. balearica Dec. h. balearische Fr.
Caprifolium balearicum Dum. Cours.
3. caprifolium L. h. durchwachsene Fr.
4. coerulea L. h. blaue Fr.
Isika coerulea Borkh.
Diervilla vid. Diervilla.
5. dioica L. h. graue Fr.
L. media Murr.
L. glauca Moench.
6. etrusca Desl. h. etrurische Fr.
7. flava Sims. h. gelbblühende C. H.
8. grata Ait. h. schöne Fr.
9. japonica Thunb. h. japanische C. H.
Caprifolium japonicum Pers.
10. — b. florib. coccineis Hort. Cels. h. mit scharlachrothen Blumen C. H.
11. iberica M. B. h. iberische Fr.
12. nigra L. h. schwarze Fr.
Xylosteum nigrum Pers.
13. Periclymenum L. h. Deutsche Fr. (Geisblatt.)
14. — b. quercifolium h. mit dem Eichblatt Fr.
15. — c. serotinum Ait. h. spätblühende Fr.
16. — d. fol. varieg. h. mit bunten Blättern Fr.
17. pyrenaica L. h. pyrenäische Fr.
18. sempervirens L. h. immergrüne Fr.
L. coccinea Pers.
19. — b. minor Ait. h. kleine Fr.
Symphoricarpos vid. *Symphoricarpos*.
20. tatarica L. h. tatarische Fr.
21. *Xylosteum* L. h. gemeine Fr.

Lopezia.

Lopezie.

1. coronata Andr. ☉. gekrönte Fr.
2. frutescens Schrank. ☿. strauchartige C. H.
L. miniata Dec.
3. hirsuta Jacq. ☉. haarige Fr.
4. mexicana Cav. ☉. mexicanische Fr.

Lotus.

Schotenklee.

1. angustissimus L. ☉. dünnfrüchtiger Fr.
2. anthylloides Pers. ☿. wollblumenartiger C. H.
3. aristatus Dec. ☉. granniger Fr.
L. coimbrensis Brot.
4. conjugatus L. ☉. gepaarter Fr.
5. corniculatus L. ♀. gemeiner Fr.
6. creticus L. ☿. cretischer C. H.
7. decumbens Dec. ♀. niedergebogener Fr.
8. depressus W. ♀. niedergedrückter Fr.
Dorycnium vid. *Dorycnium*.
9. hirsutus L. ♀. haariger Fr.
10. humifusus W. ♀. niederliegender Fr.
11. jacobaeus L. ♂. schwarzer Fr.
12. maritimus L. ♀. Meerstrands Fr.
13. odoratus Ait. ♀. wohlriechender Fr.
14. ornithopodioides Cav. ☉. vogelfußartiger Fr.
15. peregrinus L. ☉. fremder Fr.
16. prostratus Desf. ♀. hingestreckter Fr.
17. rectus L. ♀. calabrisher Fr.
18. siliquosus L. ♀. wiesen Fr.
19. tenuis W. et K. ♀. dünner Fr.
20. tetragonolobus L. ☉. Spargel Fr.

Loureira.

Loureire.

1. cuneifolia Cav. ☿. keilblättrige w. H.
Mozinna Spathulata Orteg.

Ludia.

Aenderling.

1. sessiliflora Lam. ☿. stiellosblüthiger C. H.

Ludolfia.

Ludolfie.

1. glaucescens W. ♀. graugrüne w. H.
2. macrosperma W. ♀. großfrüchtige w. H.

Luffa.

Luffa.

1. foetida Cav. ☉. stinkende w. H.

Lühea.

Lühea.

1. speciosa W. ♀. ansehnliche w. H.

Lunaria.

Mondviole.

1. annua W. ☉. ♂. stumpffrüchtige Fr.

L. biennis Moench.

2. canescens W. ♀. graue Fr.

3. rediviva L. ♀. spitzfrüchtige Fr.

L. perennis Gmel.

Lupinus.

Feigbohne.

1. albus L. ☉. weisse Fr.

2. arboreus Sims. ♀. baumartige C. H.

3. linifolius Roth. ☉. schmalblättrige Fr.

4. luteus L. ☉. gelbe Fr.

5. nootkatensis Donn. ♀. nootkatensische C. H.

6. perennis L. ♀. ausdaurende Fr.

7. pilosus L. ☉. haarige Fr.

8. varius L. ☉. bunte Fr.

Luzula.

Knotenbinse.

1. albida Dec. ♀. weisliche Fr.

2. nivea Dec. ♀. Schnee Fr.

3. pilosa W. ♀. haarige Fr.

Lychnis.

Lychnis.

1. alpina L. ♀. Alpen Fr.

2. apetala L. ♀. blumenblattlose Fr.

3. brachypetala Fish. ♀. armblättrige Fr.

4. chalcedonica L. ♀. scharlachrothe Fr.

5. — b. flore albo ♀. weisblühende Fr.

6. — c. flore carneo ♀. fleischfarbblühende Fr.

7. — d. — pleno ♀. gefüllte Fr.

8. coronata L. ♀. grossblüthige Fr.

L. grandiflora Jacq.

9. dioica W. ♀. gemeine Fr.

10. — b. flore albo ♀. mit weisser Blume Fr.

11. — c. flore roseo pleno ♀. mit rosenroth. gefüllt. Fr.

12. — d. flore albo pleno ♀. mit weisgef. Blume Fr.

13. floscuculi L. ♀. Kuckucks-Lychnis Fr.

14. — b. flore pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.

15. fulgens H. Monac. ♀. schimmernde Fr.

16. laeta Ait. ☉. angenehme Fr.

17. quadridentata L. ♀. vierzählige Fr.

18. Viscaria L. ♀. klebrige Fr.

19. — b. flore pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.

Lycium. Bocksdorn.

1. afrum L. †. afrikanischer C. H.
2. barbarum L. †. gemeiner C. H.
3. boerhaviaefolium L. †. graublättriger C. H.
Ehretia halimifolia Herit.
4. europaeum L. †. europäischer Fr.
Jasminoides aculeatum Mich.
5. ovatum Pers. †. ecförmiger C. H.
L. chinense Lam.

Lycopodium. Bärlapp.

1. denticulatum W. 4. gezähnte C. H.
2. helveticum L. 4. Schweizer Fr.
3. Selago L. 4. nadelblättrige Fr.

Lycopsis. Krummhals.

1. arvensis W. En. ☉. Wiesen Fr.

Lycopus. Zigeunerkraut.

1. europaeus L. 4. europäisches Fr.
2. exaltatus L. 4. hohes Fr.
3. virginicus L. 4. virginisches Fr.

Lygeum. Nufsgrafs.

1. Spartum L. 4. pfriemenförmiges C. H.

Lygodium vid. Hydroglossum.

Lysimachia. Lysimachie.

1. ciliata L. 4. gefranzte Fr.
2. Ephemerum L. 4. weidenblättrige Fr.
3. Linum stellatum L. ☉. kleinblättrige Fr.
4. hirsuta Mich. 4. rauhe Fr.
L. quadrifolia L.
5. nemorum L. 4. Wald Fr.
6. Nummularia L. 4. rundblättrige Fr.
7. punctata L. 4. punctirte Fr.
8. stricta Ait. 4. aufrechte Fr.
9. thyrsiflora L. 4. büschelblüthige Fr.
10. vulgaris L. 4. gemeine Fr.

Lythrum. Weiderich.

1. alatum Pursch. 4. geflügelter C. H.
L. Vulneraria Dum. Cours.
2. hyssopifolium L. ☉. jsoptblättriger Fr.
3. Salicaria L. 4. gemeiner Fr.
4. verticillatum L. 4. quirlförmiger Fr.
5. virgatum L. 4. ruthenförmiger Fr.

M.

Macrocnemum. Stengelblume.

1. speciosum Jacq. 4. prächtige w. H.
Mussaenda speciosa Poir.

Madia. Madie.

1. mellosa W. ☉. wilde Fr.
2. viscosa Cav. ☉. klebrige Fr.

Magnolia. Bieberbaum.

1. acuminata L. 4. zugespitzter Fr.
2. auriculata Mich. 4. geöhrter Fr.
M. Fraseri Walt.
3. cordata Mich. 4. herzblättriger Fr.
4. fuscata Andr. 4. rostblättriger C. H.
M. fasciata Vent.
M. versicolor Salisb.
5. glauca L. 4. grauer Fr.
M. fragrans Salisb.
6. — b. florib. semiplenis 4. grauer mit halbgefüllten
Blumen Fr.
7. grandiflora L. 4. großblumiger C. H.
8. — b. latifolia 4. mit breiten Blättern C. H.
9. — c. longifolia 4. mit langen Blättern C. H.
10. — d. rotundifolia 4. mit runden Blättern C. H.
11. macrophylla Mich. 4. großblättriger Fr.
12. obovata Thunb. 4. rother C. H.
M. purpurea Curt.
M. discolor Vent.
13. pumila Andr. 4. niedriger C. H.
Liriodendron liliifera L.

Magnolia. *mag-nō-lī-ä* Biecherbaum.

14. pyramidata Pursch. †. pyramidenförmiger C. H.
15. tomentosa Thunb. †. filziger C. H.
M. Kobus Dec.
M. gracilis Salisb.
16. tripetala L. †. dreyblättriger Fr.
M. Umbrella Dec.
M. frondosa Salisb.
17. Yulan Desf. †. Yulans C. H.
M. Precia Correa.
M. conspicua Salisb.

Mahernia. *ma-her-nī-ä* Mahernie.

1. diffusa Jacq. †. ausgebreitete C. H.
Hermannia diffusa L.
2. glabrata Cav. †. glatte C. H.
Herm. glabrata L.
3. incisa Jacq. †. eingeschnittene C. H.
4. odorata Andr. †. wohlriechende C. H.
5. pinnata Cav. †. gefiederte C. H.
Herm. pinnata Mill.

Malachra. *ma-lach-rah* Malachra.

1. alcaefolia Jacq. ☉. stockmalvenblättrige w. H.
2. bracteata Cav. ☉. armförmige w. H.

Malaxis. *ma-lak-sī-ä* Weichkraut.

1. Loeselii W. 2. Lösels Fr.
Ophrys Loeselii L.

Malcolmia vid. *Cheiranthus* et *Hesperis*.

Malope. *ma-lo-pē* Malope.

1. malacoides L. 2. malvenartige C. H.
2. trifida L. ☉. dreytheilige Fr.

Malpighia. *mal-pī-gī-ä* Malpighie.

1. angustifolia L. †. schmalblättrige w. H.
M. ilicifolia Mill.
2. aquifolia L. †. hülsenblättrige w. H.
3. argentea Jacq. †. silberblättrige w. H.
4. coccifera L. †. stachliche w. H.
5. glabra L. †. glatte w. H.

Malpighia. Malpighie.

6. glandulosa Cav. ♀. drüsentragende w. H.
 7. macrophylla Juss. ♀. großblättrige w. H.
 8. nitida L. ♀. glänzende w. H.
 9. tuberculata Jacq. ♀. knopfige w. H.
 10. urens L. ♀. brennende w. H.
 11. — b. latifolia ♀. mit breiten Blättern w. H.
 12. volubilis Sims. ♀. windende w. H.
- M. diphylla* Jacq.

Malva. Malve.

1. abutiloides L. ♀. sidaartige w. H.
2. Alcea L. 4. schlitzblättrige Fr.
3. americana L. ☉. amerikanische w. H.
4. asperrima Jacq. ♀. rauheste C. H.
5. balsamica Jacq. ♀. balsamische C. H.
6. capensis L. ♀. capische C. H.
7. caroliniana L. ☉. carolinische Fr.
8. coromandelina L. ♂. dreyborstige w. H.
9. cretica Cav. ☉. cretische Fr.
10. crispa Cav. ☉. krause Fr.
11. decumbens W. 4. niederliegende C. H.
12. divaricata Andr. ♀. ausgebreitete C. H.
13. grossulariaefolia Cav. ♀. stachelbeerblättrige C. H.
14. gangetica L. ☉. Ganges C. H.
15. lactea Ait. ♀. milchweise C. H.

M. vitifolia Cav.

16. limensis Jacq. ☉. Limasche Fr.
17. maritima Lam. ♀. Meerstrands Fr.

M. Tournefortiana L.

18. mauritiana L. ☉. mauritanische Fr.
19. miniata Cav. ♀. mennigfarbene C. H.
20. moschata L. 4. bisamduftige C. H.
21. parviflora L. ☉. kleinblüthige Fr.
22. peruviana L. ☉. peruvianische Fr.
23. polystachia Cav. ♀. vielährige C. H.
24. rotundifolia L. ☉. rundblättrige Fr.
25. Scherardiana L. 4. Scherardische C. H.
26. umbellata Cav. ♀. doldenblüthige w. H.
27. virgata Murr. ♀. ruthenförmige C. H.

Mammea. Mammei.

1. americana L. ♀. genießbare w. H.

Mandragora. Allraun. (Tollkraut)

1. officinalis W. En. 4. gemeines Fr.
Atropa Mandragora L.

Mangifera. Mango.

1. indica L. 5. indischer w. H.

Manulea. Handblume.

1. foetida W. ☉. stinkende Fr.
Buchnera foetida Andr.
2. oppositifolia Vent. 5. paarblättrige C. H.
3. viscosa W. 5. klebrige C. H.
Buchnera viscosa Ait.

Mappia vid. **Tetracera.**

Maranta. Marante.

1. arundinacea L. 4. rohrartige w. H.
2. Zebrina Link 4. zebrastreifige w. H.

Marica. Morastlilie.

1. paludosa W. 4. sumpfliebende w. H.
Cipura paludosa Aubl.

Mariscus. Bollsimse.

1. aggregatus W. 4. gehäufte w. H.

Marrubium. Andorn.

1. affine Hornem. 4. angränzender Fr.
2. Alyssum L. 4. runzlicher Fr.
3. astracanicum Jacq. 4. astrachanischer Fr.
4. candidissimum L. 4. orientalischer Fr.
5. catariaefolium Lam. 4. Katzenmünzblättriger Fr.
6. hirsutum W. 4. behaarter Fr.
7. Pseudo-Dictamnus L. 5. dostartiger C. H.
8. vulgare L. 4. weißer Fr.

Marsilea. Marsilee.

1. quadrifolia L. 4. vierblättrige Fr.

Martynia. Martynie. (Gemshorn)

1. proboscidea W. En. ☉. langschnabliche Fr.
M. annua L.

Mathiola vid. *Cheiranthus*.

Matricaria. Mutterkraut.

1. *Chamomilla* L. ☉. Chamillen Fr.
2. *pusilla* W. ☉. kleines Fr.

Mauhlia vid. *Agapanthus*.

Maurandia. Maurandie.

1. *antirrhiniflora* W. 4. löwenmaulblüthige C.H.
 2. *semperflorens* Jacq. 4. immerblühende C.H.
- Usteria scandens* Cav.

Medeola vid. *Myrsiphyllum*.

Medicago. Schneckenklee.

1. *aculeata* W. En. ☉. dickstachliger Fr.
2. *apiculata* W. En. ☉. scharfrüchtiger Fr.
3. *applanata* W. ☉. plattgedrückter Fr.
4. *arborea* L. ʒ. baumartiger C. H.
5. *carstiensis* Jacq. 4. kärnthenscher Fr.
6. *catalonica* Schrank. ☉. catalonischer Fr.
7. *elegans* Jacq. ☉. zierlicher Fr.
8. *Gerardi* W. et K. ☉. Gerardischer Fr.
9. *glomerata* Balb. ☉. knaulförmiger Fr.
10. *glutinosa* M. B. 4. klebriger Fr.
11. *intertexta* W. ☉. verwebter Fr.

M. echinus Dec.

12. *laciniata* W. En. ☉. zerschlitzter Fr.
13. *lupulina* L. ☉. hopfenartiger Fr.
14. *marina* L. ʒ. Meerstrands C. H.
15. *minima* W. En. ☉. kleinster Fr.
16. *Murex* W. En. ☉. kurzstachliger Fr.
17. *muricata* W. En. ☉. zackiger Fr.
18. *nigra* W. En. ☉. schwarzer Fr.
19. *orbicularis* L. ☉. tellerförmiger Fr.
20. *polycarpa* W. ☉. vielfrüchtiger Fr.
21. *praecox* Dec. ☉. abgestutzter Fr.
22. *prostrata* Jacq. 4. gestreckter Fr.
23. *radiata* L. ☉. gestrahlter Fr.

Hymenocarpus radiatus Link.

24. *rigidula* W. ☉. steifer Fr.
25. *sativa* L. 4. Luzerner Fr.
26. *tornata* Mill. ☉. gedrechselter Fr.

Medicago.

Schneckenklee.

27. tribuloides Lam. ☉. büszeldorniger Fr.
28. tuberculata W. En. ☉. warziger Fr.
29. turbinata W. En. ☉. kreuselförmiger Fr.
30. uncinata W. ☉. hakenförmiger Fr.

Melaleuca.

Cajaputbaum.

1. armillaris Smith. ☿. ringförmiger C. H.
M. ericifolia Curt. Bot. Rep.
M. alba Hortul.
2. calycina R. Br. ☿. kelchblüthiger C. H.
3. canescens Otto. Hort. Berol. ☿. weißlichgrauer C. H.
Metrosideros incana Bot. Reg.
4. chlorantha H. Cels.? ☿. grünblühender C. H.
5. coronata Andr. ☿. gekrönter C. H.
M. thymifolia Smith.
M. gnidiaefolia Vent.
6. decussata R. Br. ☿. kreuzblättriger C. H.
7. densa R. Br. ☿. gezahnter C. H.
8. diosmaefolia Andr. ☿. duftstrauchblättriger C. H.
9. ericifolia Andr. ☿. heidenblättriger C. H.
10. fulgens R. Br. ☿. leuchtender C. H.
11. genistifolia Smith. ☿. ginsterblättriger C. H.
12. hypericifolia Smith. ☿. johanniskrautblättriger C. H.
13. imbricata Link. ☿. dachziegelförmiger C. H.
14. Leucadendrum L. ☿. weißstämmiger C. H.
Leptospermum Leucadendrum Forst.
15. linarifolia Smith. ☿. linienblättriger C. H.
Metrosideros hyssopifolia Cav.
16. lucidula Hort. Berol. ☿. glänzender C. H.
17. nodosa Smith. ☿. knotiger C. H.
Metrosideros nodosa Cav.
18. parviflora Otto. ☿. kleinblumiger C. H.
19. pulchella R. Br. ☿. schöner C. H.
20. squamea Link. ☿. schuppiger C. H.
21. squarrosa Smith. ☿. sparriger C. H.
M. myrtifolia Vent.
22. subulata.... ☿. pfriemenförmiger C. H.
23. stypheloides Smith. ☿. stechender C. H.
M. obliqua Hortul.
24. tetragona Hort. Berol. ☿. kreuzweisblättriger C. H.
25. thymoides Labill. ☿. thymianblättriger C. H.
26. uniflora Hort. Berol. ☿. einblüthiger C. H.

Melampodium. Geisfuss.

1. longifolium Brouss. ☉. langblättriger Fr.

Melampyrum. Wachtelweizen.

1. arvense L. ☉. Acker Fr.
2. sylvaticum L. ☉. Gebirgs Fr.

Melastoma. Schwarzschlund.

1. cymosa Schrad. ☿. doldentraubiger w. H.
2. Fothergilla Sw. ☿. fothergillischer w. H.
3. hirta Mill. ☿. rauher w. H.
4. Malabathrica L. ☿. malabathrischer w. H.
Rhexia Malabathrica H. et B.
5. quadrangularis Sw. ☿. viereckiger w. H.

Melia. Zedrach.

1. Azedarach L. ☿. glatter C. H.
2. sempervirens L. ☿. immergrüner C. H.

Melianthus. Honigbaum.

1. comosus Vahl. ☿. schopfiger C. H.
2. major. L. ☿. grösser C. H.

Melica. Perlgras.

1. altissima L. 2. höchstes Fr.
2. ciliata L. 2. gefranztes Fr.
3. uniflora Retz. 2. einblumiges Fr.

Melilotus. Steinklee.

1. altissima Hornem. ♂. höchster Fr.
2. coerulea W. En. ☉. blauer Fr.
3. cretica W. En. ☉. candischer Fr.
4. dentata W. En. ☉. gezählter Fr.
Trifolium dentatum W. et K.
5. italica L. ☉. italienischer Fr.
6. Kochiana W. En. ♂. Kochischer Fr.
7. macrorrhiza W. En. 2. grosswurzlicher Fr.
8. mauritanica W. En. ☉. Mauritanischer Fr.
9. messanensis L. ☉. Messinascher Fr.
10. officinalis L. 2. gemeiner Fr.
11. rugulosa W. En. ☉. runzlicher Fr.
12. vulgaris W. En. ♂. gemeiner Fr.

Melissa.

Melisse.

1. cordifolia Pers. 4. herzblättrige Fr.
2. fruticosa L. 4. strauchartige Fr.
3. officinalis L. 4. Citronen Fr.

Melittis.

Melittis.

1. Melissophyllum L. 4. melissenblättrige Fr.

Melochia.

Melochie.

1. caracassana Jacq. 5. caracasische w. H.
2. pyramidata L. 5. pyramiden w. H.
3. tomentosa L. 5. filzige w. H.

Melodinus.

Windeapfel.

1. scandens Forst. 5. rankender w. H.

Menispermum.

Mondsaame.

1. canadense L. 5. canadischer Fr.
2. carolinianum Mich. 5. carolinischer C. H.
Wendlandia populifolia W. En. Altera.
3. virginicum L. 5. virginischer Fr.

Mentha.

Münze.

1. aquatica L. 4. Wasser Fr.
2. — b. fol. variegatis 4. mit bunten Blättern Fr.
3. arvensis L. 4. Acker Fr.
4. austriaca Jacq. 4. Sumpf Fr.
5. badensis Gmel. 4. badische Fr.
6. balsamea W. En. 4. balsamische Fr.
7. cervina L. 4. Hirsch. Fr.
8. citrata Ehrh. 4. Citronen Fr.
9. crispa L. 4. krause Fr.
10. gentilis L. 4. Garten Fr.
11. glabrata Vahl. 4. glatte Fr.
12. incana W. En. 4. graue Fr.
13. lavandulacea W. En. 4. lavendelblättrige Fr.
14. laevigata W. En. 4. glatte Fr.
15. nemorosa W. En. 4. wilde Fr.
M. sylvestris fl. Dan.
16. piperita L. 4. Pfeffer-Münze Fr.
17. pubescens W. En. 4. weichhaarige Fr.
18. Pulegium L. 4. Poley-Münze Fr.

Mentha.

Münze.

19. rotundifolia L. 4. rundblättrige Fr.
20. rubra Smith. 4. rothe Fr.
21. sylvestris L. 4. Wald Fr.
22. undulata W. En. 4. wellenförmige Fr.
23. viridis Walt. 4. grüne Fr.

Mentzelia.

Mentzelië.

1. aspera Cav. 5. rauhe w. H.

Menyanthes.

Zottenblume.

ovata vid. Villarsia.

1. trifoliata L. 4. dreyblättrige (Fiberklee) Fr.

Menziesia.

Menziese.

1. polifolia Juss. 5. poleyblättrige Fr. et C. H.
Erica Daboecia W. Sp. pl.
Andromeda Daboecia L.

Mercurialis.

Bingelkraut.

1. annua L. ☉. jähriges Fr.
2. elliptica L. 5. Elliptisches Fr.
3. perennis L. 4. ausdauerndes Fr.
4. tomentosa L. 5. filziges C. H.

Mesembryanthemum. Zaserblume.

1. acinaciforme Haw. 5. sabelförmige C. H.
2. acutum Haw. 5. spitzblättrige C. H.
3. aduncum W. 5. krummhackige C. H.
4. aequilaterale Haw. 5. gleichseitige C. H.
5. albidum L. 5. weißblättrige C. H.
6. articulatum Jacq. 5. gegliederte C. H.
7. aurantiacum W. 5. orangefarbene C. H.
8. aureum Haw. 5. goldfarbene C. H.
9. australe L. 5. südliche C. H.
10. barbatum Haw. 5. bärtige C. H.
11. — b. hirsutum 5. haarige C. H.
12. bellidiflorum L. 5. maßliebenartige C. H.
13. bicolorum L. 5. zweyfarbige C. H.
M. coccineum Haw.
14. bracteatum Ait. 5. beblätterte C. H.
15. brevifolium Ait. 5. kurzblättrige C. H.

Mesembryanthemum. Zaserblume.

16. calamiforme Haw. h. federkielartige C. H.
17. canaliculatum Haw. h. rinnenförmige C. H.
18. caninum Haw. h. hunderachenartige C. H.
19. canum Haw. h. graue C. H.
20. caulescens Haw. h. hohe C. H.
21. clavatum Jacq. h. keulblättrige C. H.
22. clavellatum Haw. h. keulenartige C. H.
23. compressum Haw. h. zusammengedrückte C. H.
24. conspicuum Haw. h. ansehnliche C. H.
25. corallinum Thunb. h. Coralinische C. H.
26. cordifolium L. h. herzblättrige C. H.
27. corniculatum Haw. h. hornförmige C. H.
28. crassifolium Haw. h. dichtblättrige C. H.
29. croceum Jacq. h. safranartige C. H.

M. insititium W.

30. cruciatum Haw. h. kreuzförmige C. H.
31. crystallinum L. ☉. eisartige Fr.
32. curvifolium Haw. h. krummblättrige C. H.
33. cymbiforme Haw. h. nachenförmige C. H.
34. deltoides Haw. h. deltablättrige C. H.
35. demissum Haw. h. niedrige C. H.
36. densum Haw. h. dichtblättrige C. H.
37. digitatum Haw. h. fingerförmige C. H.
38. dilatatum Haw. h. ausgebreitete C. H.
39. diminutum W. h. kleinste C. H.
40. diversifolium Haw. h. verschiedenblättrige C. H.
41. dolabrisforme Haw. h. hobelblättrige C. H.
42. dubium Haw. h. zweifelhafte C. H.
43. echinatum Ait. h. stachliche C. H.
44. b. flore luteo h. mit gelber Blume C. H.
45. edule L. h. genießbare C. H.
46. expansum W. h. ausgebreitete C. H.
47. falcatum L. h. sichelblättrige C. H.
48. falciforme Haw. h. sichelförmige C. H.
49. felinum Haw. h. katzenrachenförmige C. H.

M. ringens L.

50. filamentosum L. h. fädige C. H.
51. filicaule Haw. h. fadenstielige C. H.
52. fissum Haw. h. spattblättrige C. H.
53. flexuosum Haw. h. gekniete C. H.
54. floribundum Haw. h. vielblumige C. H.
55. floridum Salm. h. blühende C. H.
56. foliosum Haw. h. belaubte C. H.

Mesembryanthemum. Zaserblume.

57. forficatum L. †. scheerenblättrige C. H.
58. geminatum Haw. †. doppelte C. H.
59. geniculiflorum L. †. winkelblüthige C. H.
60. glaucescens Haw. †. gräulichte C. H.
61. glaucum L. †. meergrüne C. H.
62. glomeratum L. †. knaulblättrige C. H.
63. Haworthii W. †. Haworthische C. H.
64. heteropetalum Haw. †. verschiedenblumenbltg. C. H.
65. hirtellum W. †. rauhstengliche C. H.
66. — b. striatum Haw. †. bunte C. H.
67. hispidum W. †. borstige C. H.
68. imbricatum Haw. †. dachziegelförmige C. H.
69. inclaudens Haw. †. offenblüthige C. H.
70. junceum Haw. †. binsenartige C. H.
71. lacerum Haw. †. zerschlitzte C. H.
72. laevigatum Haw. †. glatte C. H.
73. latum Haw. †. breitblättrige C. H.
74. laxum W. †. schlaffe C. H.
75. lineolatum Haw. †. linienförmige C. H.
76. linguiforme W. †. zungenblättrige C. H.
77. longum Haw. †. langblättrige C. H.
78. loreum L. †. riemenartige C. H.
79. lunatum W. †. mondblättrige C. H.
80. magnipunctatum Haw. †. grosspunktirte C. H.
81. marginatum Haw. †. gerandete C. H.
82. maximum W. †. größte C. H.
83. micans L. †. schimmernde C. H.
84. molle Ait. †. weiche C. H.
85. multiflorum Haw. †. vielblüthige C. H.
86. murinum Haw. †. mäusezahnartige C. H.
87. mutabile Haw. †. veränderliche C. H.
88. nitidum W. †. glänzende C. H.
89. noctiflorum Haw. †. nächtliche C. H.
90. obcordellum Haw. †. verkehrtherzförmige C. H.
91. obliquum W. †. schiefblättrige C. H.
92. parviflorum Haw. †. kleinblüthige C. H.
93. patens W. †. abstehende C. H.
94. perfoliatum Haw. †. durchwachsene C. H.
95. pinnatifidum L. ☉. gefiederte C. H.
96. polyanthum Haw. †. vielblumige C. H.
97. pugioniforme L. †. dolchförmige C. H.
- M. capitatum* Haw.
98. pulchellum Haw. †. schöne C. H.

Mesembryanthemum. Zaserblume.

99. pulverulentum Haw. h. bestäubte C. H.
100. ramulosum Haw. h. ästige C. H.
101. relaxatum W. h. erweiterte C. H.
102. reptans Ait. h. kriechende C. H.
103. retroflexum Haw. h. zurückgebogene C. H.
104. robustum Haw. h. hohe C. H.
105. rostellatum Haw. h. schnabligte C. H.
106. rostratum L. h. schnabelförmige C. H.
107. rubricaule W. h. rothstengliche C. H.
108. scabrum W. h. scharfblättrige C. H.
109. Scholli H. Vindeb. h. Schollische C. H.
110. semicylindricum Haw. h. halbcylinderförmige C. H.
111. semidendatum Salm h. halbgezähnte C. H.
112. serratum L. h. gesägte C. H.
113. serrulatum Haw. h. gezähnelte C. H.
114. speciosum Haw. h. prächtige C. H.
115. spectabile Haw. h. ansehnliche C. H.
116. spinosum L. h. dornige C. H.
117. spinuliferum Haw. h. stacheltragende C. H.
118. splendens Haw. h. glänzende C. H.
119. stipulaceum L. h. steifstielige C. H.
120. stramineum W. h. strohgelbe C. H.
121. subulatum Haw. h. pfriemenförmige C. H.
122. tenellum Haw. h. zarte C. H.
123. tenuifolium Jacq. h. dünnblättrige C. H.
124. tortuosum Haw. h. gedrehte C. H.
125. tricolor Jacq. h. dreyfarbige C. H.
126. Tripolium L. ♂. asterblättrige C. H.
127. tuberculatum Dec. h. knopfige C. H.
128. uncinatum L. h. hackenförmige C. H.
129. vaginatum Haw. h. scheidenförmige C. H.
130. verruculatum Haw. h. bogigblättrige C. H.
131. virescens Haw. h. grünliche C. H.
132. virgatum Haw. h. ruthenförmige C. H.
133. viride Haw. h. grüne C. H.
134. viridiflorum Ait. h. grünblühende C. H.
135. violaceum Dec. h. violette C. H.

Mespilus.

Mispel.

1. Azarolus W. En. h. Azarol Fr.
Crataegus Azarolus L.
2. Aronia W. En. h. morgenländische Fr.
3. Celsiana Dum. Cours. h. Celsische Fr.

Mespilus. Mispel.

4. Chamaemespilus L. h. niedrige Fr.
Crataegus Chamaemespilus Desf.
5. coccinea W. En. h. scharlachrothe Fr.
Crataegus coccinea W. Sp. pl.
6. cordata W. En. h. herzblättrige Fr.
M. acerifolia Burgsd.
M. phaenopyrum Ehrh.
Crataegus cordata W. Spl. pl.
C. corallina Herit.
7. Cotoneaster L. h. Quitten-Mispel Fr.
8. Crus galli W. En. h. glänzende Fr.
Crataegus Crus galli W. Spl. pl.
C. lucida Wangenh.
9. — b. splendens W. h. schimmernde Fr.
10. — c. pyracanthifolia W. h. mitimmergrün. Bl. Fr.
11. — d. salicifolia W. h. weidenblättrige Fr.
12. elliptica W. En. h. ovalblättrige Fr.
Crataegus elliptica Ait.
13. flava W. En. h. gelbe Fr.
Crataegus flava L.
14. germanica L. h. gemeine Fr.
15. — b. diffusa Ait. h. verworrene Fr.
16. glabra Link. h. glattblättrige C. H.
Crataegus glabra Thunb.
17. glandulosa W. En. h. drüsentragende Fr.
Crataegus glandulosa Ait.
C. sanguinea Pall.
18. indica Link. h. indische C. H.
Crataegus indica L.
Rhaphiolepis indica Bot. Reg.
19. japonica Thunb. h. japonische C. H.
20. laevis h. glatte C. H.
Crataegus laevis Thunb.
21. lobata Poir. h. belappte Fr.
22. monogyna W. En. h. einsamige Fr.
Crataegus monogyna Jacq.
23. — b. flore rubro h. mit rother Blume Fr.
24. — c. fl. pleno albo h. mit weißgefüllter do. Fr.
25. — d. fl. carneo h. mit fleischfarber do. Fr.
26. — e. foliis variegatis h. mit bunten Blättern Fr.
27. — f. fruntu flavo h. mit gelber Frucht Fr.
28. nigra W. En. h. schwarze Fr.
Crataegus nigra W. et. K.

Mespilus. Mispel.

29. odorata Bosc. h. wohlriechende Fr.
30. oliveriana Bosc. h. olivenähnliche Fr.
31. oxyacantha W. En. h. gemeiner Weissdorn Fr.
Crataegus oxyacantha L.
32. parvifolia W. En. h. kleinblättrige Fr.
Crataegus tomentosa L.
C. uniflora Duroi.
Mespilus Xanthocarpus Ehrh.
33. pentagyna W. En. h. fünfsaamige Fr.
Crataegus pentagyna W. et K.
34. punctata W. En. h. punctirte Fr.
Crataegus punctata L.
Mespilus cuneifolia Ehrh.
35. — b. fructu flavo h. mit gelber Frucht Fr.
36. pyracantha L. h. immergrüne Fr.
37. pyrifolia W. En. h. birnblättrige Fr.
M. Calpodendrum Ehrh.
Crataegus pyrifolia L.
38. tanacetifolia W. En. h. wurmkrautblättrige Fr.
M. orientalis Tournef.
Crataegus tanacetifolia H. Par.
39. tomentosa W. Sp. pl. h. wollige Fr.
Mespilus orientalis Mill.
M. eriocarpa Dec.
Crataegus aria, *edulis*, *intermedia* et
— *terminalis* vid. *Pyrus*.
Mespilus amelanchier, *arbutifol.* et *canadensis* vid.
Pyrus.

Messerschmidia. Messerschmidie.

1. fruticosa L. h. strauchartige C. H.
2. — b. angustifolia h. schmalblättrige C. H.

Metrosideros. Eisenmafs.

1. albiflora Gaert. h. weifsblühendes C. H.
2. angustifolia Smith. h. schmalblättriges C. H.
corifolia vid. *Leptospermum*.
3. glandulosa Desf. h. drüsiges C. H.
4. floribunda Smith. h. blüthenreiches C. H.
M. laurifolia Desf.
Eugenia elliptica Smith.

Metrosideros. Eisenmafs.

5. hispida Smith. h. rauhes C. H.
M. anomala Vent.
M. cordifolia Pers.
6. lanceolata Pers. h. lanzettblättriges C. H.
7. linearis Smith. h. linienblättriges C. H.
8. — b. longifolia h. mit langen Blättern C. H.
9. Lophantha Vent. h. federbuschartiges C. H.
10. — b. latifolia h. mit breiten Blättern C. H.
M. citrina Curt.
11. marginata Cav. h. gerändertes C. H.
12. myrtifolia H. Cels. h. myrtenblättriges C. H.
13. pinifolia Wendl. h. fichtenblättriges C. H.
14. saligna Smith. h. weidenblättriges C. H.
15. — b. fl. albo h. mit weißer Blume C. H.
16. scariosa Wendl. h. rauhblättriges C. H.
M. seabra H. Cels.
17. speciosa Sims. h. prächtiges C. H.
M. glauca H. Cels. et Hortul.
18. viridiflora H. Cels. h. grünblüthiges C. H.

Meum. Bärenwurz.

1. heterophyllum Pers. ♂. verschiedenblättrige Fr.
Aethusa Buniu L.
2. sibiricum Spr. ♀. sibirische Fr.

Micropus. Falzblume.

1. erectus L. ☉. aufrechte Fr.
2. supinus L. ☉. niedrige Fr.
Filago supina Lam.

Microtea. Zwergblüthe.

1. debilis Rohr. ☉. schwachstielige Fr.

Mikania. Mikanie.

1. Houstonis L. h. Houstonische C. H.
2. scandens L. h. kletternde C. H.
Eupatorium scandens Jacq.

Milium. Hirsegras.

1. effusum L. ♀. ausgebreitetes Fr.
2. lendigerum Schreb. ☉. ährentragendes Fr.
Gastridium australe Paliss.
3. microspermum Lagasc. ☉. kleinsaamiges Fr.
4. paradoxum Scop. ♀. fremdartiges Fr.

Mimosa. Sinnpflanze.

- alba vid. Jnga.
 1. Habbas Delil. ♀. Habbas w. H.
 2. nilotica Desf. ♀. ägyptische w. H.
 3. pudica L. ♂. schamhafte w. H.
 quadrivalvis vid. Schrankia.
 4. sensitiva L. ♀. empfindliche w. H.

Mimulus. Gauklerblume.

1. glutinosus W. ♀. klebrige C. H.
M. aurantiacus Curt.
 2. guttatus W. En. 4. gefleckte Fr.
 3. ringens L. 4. rachenförmige C. H.

Minuartia. Minuartie.

1. campestris L. ☉. Feld Fr.
 2. dichotoma L. ☉. gabelförmige Fr.
 3. montana L. ☉. Berg Fr.

Mirabilis. Jalape.

1. Jalapa L. ☉. 4. gemeine Fr.
 2. longiflora L. ☉. 4. langblüthige Fr.
 aggregata et viscosa vid. Oxybaphus.

Mitchella. Mitchelle.

1. repens L. ♀. kriechende Fr.

Mitella. Bischofshüt.

1. diphylla L. 4. zweyblättriger Fr.

Modecca. Modecca.

1. lobata Fisch. ♀. lappige w. H.

Moehringia. Moehringie.

1. muscosa Scop. 4. moosige Fr.

Mollia. Mollic.

1. diffusa W. En. ☉. ausgebreitete Fr.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
 2. latifolia W. En. ☉. breitblättrige Fr.

Moluccella. Trichterkelch.

1. laevis L. ☉. glatter w. H.
 2. spinosa L. ☉. dorniger w. H.

Momordica. Springkürbis.

1. Balsamina L. ☉. gemeine. w. H.
2. Charantia W. ☉. gurkenartige. w. H.
3. cylindrica L. ☉. walzenförmige. w. H.
4. Elaterium L. ☉. Esels (Spritzgurke). Fr.
5. Luffa L. ☉. zeylonische. w. H.

Monarda. Monarde.

1. ciliata L. 4. gefranzte. Fr.
2. clinopodia L. 4. fleischfarbene. Fr.
3. didyma L. 4. scharlachrothe. Fr.
4. fistulosa L. 4. purpurrothe. Fr.
5. media W. 4. mittlere. Fr.
6. mollis L. 4. weiche. Fr.
7. punctata L. ♂. punktirte. Fr.
M. lutea Mich.
8. purpurea Pursch 4. purpurrothe. Fr.
9. rugosa Ait. 4. weisse. Fr.
10. violacea Desf. 4. violette. Fr.

Monetia. Monetie.

1. barlerioides L. ♀. vierdornige. w. H.
Azima tetracantha Lam.

Monsonia. Monsonie.

1. lobata Ait. ♀. gelappte. C. H.
2. speciosa L. ♀. prächtige. C. H.
Geranium speciosum Cav.

Montinia. Montinie.

1. acris L. fil. ♀. scharfe. w. H.
M. caryophyllacea Thunb.

Moraea. Moraea.

1. chinensis Thunb. 4. bunte. C. H. et Fr.
Pardanthus chinensis Ait.
2. iridioides L. 4. schwertelblättrige. C. H.
3. Northiana W. En. 4. Norths. C. H.

Morina. Morine.

1. persica L. 4. persische. Fr.

Morinda. Morinde.

1. Royoc L. ♀. Royoks. w. H.

Morus. Maulbeere.

1. alba L. ♀. weisse. Fr.
2. chinensis H. Cels. ♀. chinesische. C. H.
3. laciniata Mill. ♀. geschlitzblättrige. C. H. et Fr.
4. nigra L. ♀. schwarze. Fr.
5. rubra L. ♀. rothe. Fr.

Mühlenbergia. Mühlenbergie.

1. aristata Mich. 24. grannige. Fr.
2. diffusa L. 24. niederliegende. Fr.

Murraya. Murraye.

1. exotica L. ♀. indische. w. H.

Musa. Pisang. (Paradiesfeige)

1. coccinea Andr. ♀. scharlachrother. w. H.
2. paradisiaca L. ♀. gemeiner. w. H.
3. rosacea Jacq. ♀. rosenartiger. w. H.

Muscari. Muscathyacinthe.

1. botryoides W. En. 24. steifblättrige. Fr.
Hyacinthus botryoides L.
2. comosum W. En. 24. schopfblüthige. Fr.
3. — b. monstrosum 24. ungestaltete. Fr.
4. moschatum W. En. 24. Muscaten-Hyacinthe. Fr.
Hyacinthus Muscari L.
5. racemosum W. En. 24. Trauben-Hyacinthe. Fr.

Mussaenda vid. **Macrocnemum.**

Myagrum. Leindotter.

1. perfoliatum L. ☉. durchwachsener. Fr.
2. rugosum L. ☉. runzlicher. Fr.
Rapistrum rugosum Dec.

Mygalurus vid. **Festuca.**

Myginda. Myginde.

1. Rhacoma Lam. ♀. westindische. w. H.

Myoporum. Mäusebeere.

1. ellipticum R. Br. ♀. elliptische. C. H.
Andrewsia glabra Vent.
Pogonia glabra Andr.
2. parvifolium R. Br. ♀. kleinblättrige. C. H.
Pogonia tuberculata Hortul.
3. oppositifolium R. Br. ♀. paarblättrige. C. H.

Myoporum. Myoporum.

4. tuberculatum R. Br. h. knopfiges C. H.

5. viscosum R. Br. h. klebriges C. H.

Andrewsia scabra Dum. Cours.

Bertolonia glandulosa Espin.

Myosotis. Mausohr. (Vergifsmeinnicht)

1. arvensis Roth. 4. Acker Fr.

M. scorpioides a. L.

2. clavata Fisch. ☉. keulblättriges Fr.

3. Lappula L. ☉. klettensaamiges Fr.

4. marginata M. B. 4. gerändertes Fr.

5. sparsiflora Mikan ☉. zerstreutblättriges Fr.

6. squarrosa M. B. ☉. sparriges Fr.

7. suaveolens W. et K. 4. wohlriechendes Fr.

8. sylvatica Ehrh. 4. Wald Fr.

Myosurus. Mausschwänzchen.

1. minimus L. ☉. kleinstes Fr.

Myrica. Wachsstrauch.

1. caroliniensis Mill. h. carolinischer C. H.

*) 2. cerifera L. h. wachsgebender Fr.

3. cordifolia L. h. herzblättriger C. H.

4. Faya Ait. h. azorischer C. H.

5. Gale L. h. gemeiner Fr.

M. palustris Lam.

6. laciniata W. h. zerrissener C. H.

M. quercifolia Jacq.

7. mexicana W. En. h. mexicanischer C. H.

8. pensylvanica Lam. h. pensylvanischer C. H.

9. quercifolia L. h. eichenblättriger C. H.

10. segregata Jacq. h. lanzettblättriger C. H.

11. serrata Lam. h. gezahnter C. H.

M. banksiaefolia Wendl.

12. { trifoliata Anglor h. dreyblättriger C. H.

{ non *Rhus suaveolens* Ait.

*) Vor einigen Jahren habe ich von 5 Pfund hier gesammelten *Myrica cerifera* Saamen, 4 Wachslichter, welche zusammen 17 ein halb Loth gewogen, erhalten.

Myrrhis. Myrrhis.

1. cicutaria Spr. 4. wasserschirlingartige Fr.
2. odorata Wigg. 4. wohlriechende Fr.
Scandix odorata L.

Myrsine. Myrsine.

1. africana L. h. afrikanische C. H.
2. retusa Ait. h. azorische C. H.

Myrsiphyllum. Myrtenblatt.

1. asparagoides W. En. h. spargelartiges C. H.
Medeola asparagoides L.

Myrtus. Myrte.

1. communis L. h. gemeine C. H.
2. — b. acuminata h. spitzblättrige C. H.
3. — c. angustifolia h. schmalblättrige C. H.
4. — d. foliis variegatis h. mit bunten Blättern C. H.
5. com. macrophylla h. großblättrige C. H.
6. b. — foliis variegatis h. mit bunt. Blättern. C. H.
7. c. — moschata h. Bisam C. H.
8. d. — fl. pleno h. mit gefüllter Blume C. H.
9. e. — mucronata h. spitzige C. H.
10. f. — romana h. römische C. H.
11. g. — boetica Mill. h. bötische C. H.
12. horizontalis Vent. h. wagerechte w. H.
M. disticha Sw.
13. Pimenta L. h. pfefferartige w. H.
Caryophyllum Pimenta Mill.
14. tomentosa Ait. h. filzige w. H.
Zyzygeum vid. *Calyptranthus*.

N.

Nandina. Nandine.

1. domestica Thunb. h. Garten C. H.

Napaea. Napace.

1. laevis L. 4. glatte Fr.
Sida Napaea Cav.
2. scabra L. 4. rauhe Fr.
Sida dioica Cav.

Narcissus. Narcisse.

1. Jonquilla L. 4. Jonquillen Fr.
2. odorus L. 4. wohlriechende Fr.
3. poeticus L. 4. rothrandige Fr.
4. Pseudo-Narcissus L. 4. gemeine Fr.
5. Tazetta L. 4. Tazetten Fr.

Nardus. Borstengras.

1. stricta L. 4. steifes Fr.

Nasturtium. Quellrauke.

1. clandestinum Spr. ☉. heimlichblühende Fr.

Nelumbium. Nelumbo.

- speciosum W. 4. prächtige w. II.

Nemesia. Nemesie.

1. chamaedrifolia Vent. 4. gamanderblättrige C. II.

Nenuphar vid. Nymphaea.

Neottia. Neottie.

1. discolor Ker. 4. verschiedenfarbige w. II.
2. picta Ait. 4. bunte w. H.
N. acaulis Smith.
3. repens Sw. 4. kriechende Fr.
Goodyera repens Ait.
Satyrrium repens L.

Nepeta. Katzenmünze.

1. amethystina Desf. 4. amethystfarbene Fr.
2. botryoides Ait. ☉. feinblättrige Fr.
3. colorata W. 4. gefärbte Fr.
N. melissaefolia Pers.
4. grandiflora M. B. 4. großblumige Fr.
N. graveolens Vill.
5. italica L. 4. italienische Fr.
6. latifolia Dec. 4. breitblättrige Fr.
7. multibracteata Desf. 4. einfache Fr.
8. multifida L. 4. vielspaltige Fr.
N. lavandulacea L.
9. Mussini Spreng. 4. mussinische Fr.

Nepeta. Katzenmünze.

10. nuda L. 4. nackte Fr.
11. pannonica L. 4. ungarische Fr.
12. reticulata Desf. 4. netzblättrige Fr.
13. tuberosa L. 4. knollige Fr.
14. ucranica L. 4. Ukranische Fr.

Nerium. Oleander.

grandiflorum vid. Cryptostegia.

coronarium vid. Tabernaemontana.

1. Oleander L. 5. gemeiner C. H.
2. — b. flore albo 5. mit weißer Blume C. H.
3. — c. flore carneo 5. mit fleischfarbener C. H.
4. — d. flore pleno 5. mit gefüllter Blume C. H.
5. — e. foliis variegatis 5. mit bunten Blättern C. H.
6. splendens H. Cels. 5. glänzender C. H.

Nicandra. Nicandre.

1. physaloides W. En. ☉. schluttenartige Fr.
Atropa physaloides L.

Nicotiana. Tabak.

1. crispa Cav. ☉. gekrauster Fr.
2. decurrens Agardh. ☉. herablaufender Fr.
3. fruticosa L. 5. strauchartiger C. H.
4. glutinosa L. ☉. klebriger Fr.
5. humilis Desf. ☉. niedriger Fr.
6. Langsdorfii Weinm. ☉. Langsdorfscher Fr.
7. macrophylla Spr. ☉. großblättriger Fr.
N. latissima Mill.
8. nyctaginiflora Lehm. ☉. winkelblüthiger Fr.
N. axillaris Lam.
9. paniculata L. ☉. Jungfern Fr.
N. viridiflora Lagasc.
10. plumbaginifolia W. ☉. bleiwurzblättriger Fr.
11. quadrivalvis Pursch. ☉. vierklappiger Fr.
12. rustica L. ☉. Bauren Fr.
13. — b. pumila ☉. niedriger Fr.
14. Tabacum L. ☉. gemeiner Fr.
15. — b. angustifolia ☉. mit schmalen Blättern Fr.
16. undulata Vent. ☉. wellenförmiger Fr.
N. suaveolens Lehm.

Nigella. Nigelle.

1. arvensis L. ☉. Acker Fr.
2. damascena L. ☉. Garten Fr.
3. hispanica L. ☉. spanische Fr.
4. orientalis L. ☉. morgenländische Fr.
5. sativa L. ☉. gemeine Fr.

Nissolia. Nissolie.

1. fruticosa L. ♀. strauchartige w. H.

Nolana. Nolane.

1. prostrata L. ♂. liegende C. H.

Notelaea. Notelaea.

1. longifolia R. Br. ♀. langblättrige C. H.
2. rigida Desf. ♀. spröde C. H.

Notoceras vid. Erysimum.

Nyctanthes. Trauerbaum.

1. Arbor tristis L. ♀. indischer w. H.
Sambac u. m. a. vid. Jasminum.

Nymphaea. Seerose.

1. alba L. 4. weisse Fr.
2. coerulea Andr. 4. blaue w. H.
3. Lotus L. 4. ägyptische w. H.
4. lutea L. 4. gelbe Fr.
Nenuphar luteum Ait.
5. pygmaea Ait. 4. niedrige w. H.

Nyssa. Tulpelo baum.

1. aquatica L. ♀. Wasser C. H. et Fr.
N. biflora Mich.
N. integrifolia Ait.
2. grandidentata Mich. fil. ♀. grofszahniger C. H. et Fr.
N. denticulata Ait.
3. villosa Mich. ♀. filzige Fr. et C. H.
N. multiflora Walt.
N. montana Hortul.

O.

Ochroma.

Bleichwolle.

1. Lagopus Sw. ‡. hasenfußförmige w. H.

Ocymum.

Basilienkraut.

1. americanum L. ☉. amerikanisches Fr.
2. Basilicum L. ☉. gemeines Fr.
3. — b. bullatum ☉. mit blasigen Blättern Fr.
4. — c. crispum ☉. mit krausen Fr.
5. — d. fimbriatum ☉. mit gefranzten Fr.
6. — e. nigrum ☉. mit schwarzen Fr.
7. micranthum W. ☉. kleinblumiges Fr.
8. minimum L. ☉. kleines Fr.
9. pilosum W. ☉. haariges Fr.
10. polystachyum L. ☉. vielähriges w. H.
11. scutellarioides L. ☉. helmkrautartiges Fr.
O. peltatum Swæg.
12. thyrsiflorum L. ☉. straufsblüthiges Fr.
13. urticaefolium Roth. ☉. nesselblättriges Fr.
14. zeylanicum Desf. ☉. zeylonisches Fr.

Oedera.

Oedere.

1. prolifera L. ‡. sprossende C. H.
Bupthalmum capense L.

Oenanthe.

Rebendolde.

1. apiifolia Brot. 4. petersilienblättrige Fr.
2. fistulosa L. 4. röhrige Fr.
3. pimpinelloides L. 4. bibernellenartige Fr.
4. prolifera L. 4. sprossende Fr.

Ocnothera.

Nachtkerze.

1. acaulis Cav. ♂. stengellose C. H.
2. biennis L. ♂. gemeine Fr.
3. fruticosa L. 4. staudige Fr.
4. gauroides Hornem. ♂. prachtkerzenartige Fr.
5. glauca Mich. 4. graue Fr.
6. grandiflora L. ♂. großblüthiger F.

Oenothera. Nachtkerze.

7. hirta Link. ♀. rauhe Fr.
8. longiflora L. ☉. langblüthige Fr.
9. mollissima L. ☉. weichhaarige Fr.
10. muricata L. ☉. weichstachelige Fr.
11. nocturna Jacq. ☉. nachtblühende Fr.
12. odorata Jacq. ♀. wohlriechende Fr.
13. parviflora L. ♂. kleinblüthige Fr.

O. angustifolia Mill.

14. pumila L. ♀. niedrige Fr.
15. rosea Ait. ♀. rosenrothe C. H.

O. purpurea Lam.

16. salicifolia Desf. ♂. weidenblättrige C. H.
17. sinuata L. ☉. ausgeschweifte Fr.
18. spectabilis Bernh. ♀. prächtige Fr.
19. suaveolens Desf. ♂. wohlriechende Fr.
20. tetraptera Cav. ♀. vierflügelige Fr.

Olea. Oelbaum.

1. americana L. ♀. amerikanischer C. H.
2. capensis L. ♀. capischer C. H.
3. — b. undulata VV. ♀. mit wellenförmigen Bltn. C. H.
4. emarginata Lam. ♀. ausgerandeter w. H.
5. europaea L. ♀. gemeiner C. H.
6. — b. buxifolia ♀. mit Buxblättern C. H.
7. — c. latifolia ♀. mit breiten Blättern C. H.
8. excelsa Ait. ♀. hoher C. H.

O. exasperata Jacq.

9. fragrans Thunb. ♀. wohlriechender C. H.
10. maderiensis H. Cels. ♀. maderiensischer C. H.
11. verrucosa Thunb. ♀. warziger C. H.

Onobroma vid. Carthamus.

Onoclea. Fühlfarn.

1. sensibilis L. ♀. virginischer Fr.

Ononis. Hauhechel.

1. alopecuroides L. ☉. fuchsschwanzartige Fr.
2. antiquorum L. ♀. vieldornige Fr.
3. Columnae All. ♀. Berg-Hauhechel Fr.

O. parviflora Lam.

4. crispa L. ♀. krause Fr.
5. fruticosa L. ♀. strauchartige Fr.

Ononis.

Hauhechel.

6. hircina Jacq. 24. stinkende Fr.
O. altissima Lam.
7. mitissima L. ☉. häutige Fr.
8. Natrix L. 24. gelbe Fr.
9. ornithopodioides L. ☉. vogelfußblättrige Fr.
10. parviflora Thunb. 24. kleinblumige Fr.
11. pinquis L. ☿. fette C. H.
12. ramosissima Desf. 24. vielästige Fr.
13. reclinata L. ☉. zurückgebeugte Fr.
14. repens L. 24. kriechende Fr.
15. rotundifolia L. ☿. rundblättrige Fr.
16. spinosa L. 24. stachlige Fr.

Onopordon.

Krebsdistel.

1. Acanthium L. ♂. gemeine Fr.
2. acaule L. ♂. stiellose Fr.
3. arabicum L. ♂. arabische Fr.
4. graccum L. ♂. griechische Fr.
5. illyricum L. ♂. illyrische Fr.
6. macrocanthum W. ♂. grobsdornige Fr.
7. tauricum W. ♂. taurische Fr.
8. virens Dec. ♂. grünende Fr.

Onosma.

Lotwurz.

1. arenaria W. et K. 24. Sand Fr.
2. echioides L. 24. natterkopffartige C. H.
3. taurica Pall. 24. taurische C. H.
O. stellulata W. et K.

Ophrys.

Ragwurz.

1. anthropophora W. 24. menschengestaltige Fr.
Satyrium anthropophorum. Pers.
2. arachnites Hoffm. 24. spinnenblumige Fr.
3. myodes Jacq. 24. fliegenlippige Fr.

Orchis.

Knabenkraut.

1. bifolia L. 24. zweyblättriges Fr.
Habenaria bifolia Ait.
2. conopsea L. 24. fliegenartiges Fr.
3. fusca Jacq. 24. braunes Fr.
4. hircina W. 24. Bocks Fr.
Satyrium hircinum L.

Orchis. Knabenkraut.

5. maculata L. 4. geflecktes Fr.
6. — b. longifolia 4. mit langen Blättern Fr.
7. militaris L. 4. dunkellippiges Fr.
8. odoratissima L. 4. wohlriechendes Fr.
9. pyramidalis L. 4. pyramidalisches Fr.
10. ustulata L. 4. feinblumiges Fr.

Origanum. Dosten. (Majoran)

1. creticum L. 4. cretischer Fr.
2. Dictamnus L. 5. Diptam-Dosten C. H.
3. — b. latifolius 5. mit breiten Blättern C. H.
4. Majorana L. ①. Majoran-Dosten Fr.
5. Onites L. 5. Syracuser-Dosten Fr.
6. smyrnaeum L. 4. smyrnäscher Fr.
7. vulgare L. 4. gemeiner Fr.

Ornithogalum. Vogelmilch.

1. aureum Bot. Magaz. 4. goldfarbene C. H.
2. caudatum Ait. 4. geschwänzte C. H.
3. longebracteatum Murr. 4. langbeblätterte C. H.
4. luteum L. 4. gelbblüthige Fr.
5. narbonense L. 4. französische Fr.
6. nutans L. 4. hängendblüthige Fr.
7. pyramidale L. 4. pyramidenförmige C. H.
8. pyrenaicum L. 4. pyrenäische Fr.
9. Rudolphi Jacq. 4. Rudolphische C. H.
O. junceum Curt.
10. scilloides Jacq. 4. meerzwibelartige C. H.
11. thyrsoides Jacq. 4. strausblüthige C. H.
12. umbellatum L. 4. doldenblüthige C. H.

Ornithopus. Vogelfuß.

1. compressus L. ①. flachfrüchtiger Fr.
2. ebracteatus Brot. ①. unebenblättriger Fr.
3. perpusillus L. ①. liegender Fr.
4. scorpioides L. ①. dreyblättriger Fr.

Ornithrophe. Ornithrophe.

1. asiatica? 5. asiatische w. H.

Orobus. Walderbse.

1. albus L. 4. weiße Fr.
O. panonicus Jacq.

Orob us. Wald erbse.

2. lathyroides L. 4. sibirische Fr.
3. luteus L. 4. gelbe Fr.
4. niger L. 4. schwarze Fr.
5. ochroleucus W. et K. 4. weißlichgelbe Fr.
6. sylvaticus L. 4. gemeine Fr.
7. tuberosus L. 4. knollige Fr.
8. varius Sims. 4. bunte Fr.
- O. versicolor* Gmel. Syst.
9. vernus L. 4. Frühlings Fr.

Orontium. Wasserähre.

1. japonicum Thunb. 4. japanische Fr.

Oryza. Reis.

1. sativa L. ☉. gemeiner Fr.
2. — b. mutica ☉. grannenloser Fr.

Oryzopsis. Reisgras.

1. asperifolia Mich. 4. scharfblättriges Fr.

Osmunda. Traubenfarn.

1. regalis L. 4. königlicher Fr.
- Spicant vid. Blechnum.
- struthiopteris vid. Struthiopteris.

Osteospermum. Beinsaame.

1. coeruleum Jacq. ʒ. blauer C. H.
2. moniliferum L. ʒ. paternosterförmiger C. H.
3. pisiferum L. ʒ. erbsentragender C. H.
4. spinescens Ait. ʒ. dorniger C. H.

Otanthus vid. Santolina.

Othonna. Othonne.

1. Athanasia Thunb. ʒ. athanasienähnliche C. H.
2. cheirifolia L. ʒ. leucojenblättrige C. H.
3. coronopifolia L. ʒ. borstenzähnige C. H.
4. crassifolia L. ʒ. dickblättrige C. H.
5. frutescens L. ʒ. strauchartige C. H.
6. pectinata L. ʒ. kammförmige C. H.
7. tenuissima Jacq. ʒ. feinste C. H.

Oxalis. Saurklee.

1. Acetosella L. 24. gemeiner Fr.
2. asinina Jacq. 24. eselsohrblättriger C. H.
3. cernua Jacq. 24. hängender C. H.
4. corniculata L. ☉. gehörnter Fr.
5. flabellifolia Jacq. 24. fächerblättriger C. H.
6. flava L. 24. gelber C. H.
7. hirta L. 24. rauher C. H.
8. incarnata L. 24. fleischfarbiger C. H.
9. macrostylis Jacq. 24. langgrifflicher C. H.
10. multiflora Jacq. 24. vielblüthiger C. H.
11. polyphylla Jacq. 24. vielblättriger C. H.
12. reptatrix Jacq. 24. wuchernder C. H.
13. rosea Jacq. 24. rosenfarbener C. H.
14. tricolor Jacq. 24. dreyfarbiger C. H.
15. variabilis Jacq. 24. veränderlicher C. H.
16. violacea L. 24. violetter C. H.
17. virginica Jacq. 24. virginischer C. H.

Oxybaphus. Sauerwurz.

1. aggregatus W. 24. gehäufte w. H.
Calyxhymenia aggregata Pers.
Mirabilis aggregata Cav.
2. glabrifolius W. 24. glattblättrige w. H.
Calyxhymenia corymbosa Pers.
3. viscosus Herit. 24. klebrige w. H.
Calyxhymenia viscosa Pers.
Mirabilis viscosa Cav.

Oxycoccus. Moosbeere.

1. macrocarpos Pers. 24. großfrüchtige Fr.
Vaccinium macrocarpum Ait.
2. — b. fol. var. 24. mit bunten Blättern Fr.
3. palustris Pers. 24. gemeine Fr.
Vaccinium Oxycoccus L.

P.

Pachysandra. Dickfaden.

1. procumbens Mich. 24. liegender Fr.

Paederia. Knackbeere.

1. foetida L. 24. stinkende C. H.

Paeonia. Gichterrose.

1. albiflora Pall. 4. weisse Fr.
2. anomala L. 4. unregelmässige Fr.
P. sibirica Pall.
3. Moutan Sims. 5. Baumartige C. H. et Fr.
P. arborea Donn.
P. sufruticosa Andr.
4. — b. rosea Anders. 5. rosenrothe C. H. et Fr.
5. corallina Retz 4. ganzblättrige Fr.
P. integra Murr.
6. daurica Ait. 4. daurische Fr.
P. rotundifolia Hortul.
7. humilis Retz. 4. niedrige Fr.
P. villosa Desf.
8. hybrida Pall. 4. Bastard Fr.
9. officinalis L. 4. gemeine Fr.
10. — b. fl. pl. purpureis 4. mit purpurrothgf. Bl. Fr.
11. — c. fl. pl. carneis 4. mit fleischfarbenengef. Bl. Fr.
12. peregrina Mill. 4. fremde Fr.
13. tenuifolia L. 4. feinblättrige Fr.

Pallasia. Pallasie.

1. halimifolia Ait. 5. meldenblättrige C. H.
Encelia canescens Cav.

Panax. Kraftwurz.

1. aculeatum Ait. 5. stachlige C. H.
Zanthoxylum trifoliatum L.
2. arboreum Forst. 5. baumartige w. H.
3. rotundifolium Hort. Anglor. 5. eyrunde w. H.

Pancratiun. Gilgen. (Machtlilie)

1. amboinense L. 4. amboinische w. H.
2. amoenum Salisb. 4. angenehme w. H.
3. caribaeum L. 4. caribäische w. H.
P. declinatum Jacq.
4. illyricum L. 4. illirische C. H.
5. maritimum L. 4. Meerstrands Fr.
P. carolinianum L.
P. verecundum Ait.
6. speciosum L. 4. prächtige w. H.
7. zeylanicum L. 4. zeylonische w. H.

Pandanus. Pandanus.

1. odoratissimus L. ♂. wohlriechender w. H.
Keura odorifera Forsk.

Panicum. Fennich.

1. arborescens L. ♂. baumartiger w. H.
2. aristatum Retz. ☉. ährentragender Fr.
3. capillare L. ☉. haarförmiger Fr.
4. Crus corvi L. ☉. Raben-Fennich Fr.
5. Crus galli L. ☉. Hünen-Fennich Fr.
6. cylindricum Link. ☉. walzenförmiger Fr.
7. divaricatum H. B. 4. ausgesperrter Fr.
8. holcoides Roxb. ☉. honiggrasartiger Fr.
9. italicum L. ☉. italienischer Fr.
10. latifolium L. 4. breitblättriger Fr.
11. miliaceum L. ☉. Hirsen Fr.
12. — b. semine nigro ☉. mit schwarz. Saamen Fr.
13. plicatum Lam. 4. gefalteter w. H.
P. sulcatum Desf.
14. tenuissimum Schrad. ☉. dünnblättriger Fr.
15. virgatum L. 4. ruthenförmiger Fr.
16. viride L. ☉. grüner Fr.

Papaver. Mohn.

1. alpinum L. 4. Alpen Fr.
2. Argemone L. ☉. Acker Fr.
3. cambricum L. 4. englischer Fr.
4. caucasicum M. B. ☉. caucasischer Fr.
5. dubium L. ☉. Saat-Mohn Fr.
6. hybridum L. ☉. kleiner Fr.
7. nudicaule L. ♂. nacktstieliger Fr.
8. orientale L. 4. morgenländischer Fr.
9. — b. var. grandifl. 4. mit großen Blumen Fr.
10. Rhoeas L. ☉. wilder Fr.
11. somniferum W. ☉. Garten Fr.

Parapetalifera vid. Barosma.

Pardanthus vid. Moraea.

Parietaria. Glaskraut.

1. cochinchinensis Lour. 4. chinesisches Fr.
2. cretica L. ☉. cretisches Fr.
3. judaica L. 4. niedriges Fr.
4. officinalis W. 4. gemeines Fr.
5. pensylvanica W. ☉. pensylvanisches Fr.

Paris. *Parthenocissus* Einbeeré.

1. quadrifolia W. 4. vierblättrige Fr.

Parkinsonia. Parkinsonie.

1. aculeata L. 4. stachlige w. H.

Parnassia. Parnassie.

1. palustris L. 4. weisse Fr.

Parthenium. Parthenie.

1. Hysterophorus L. 4. feinblättrige Fr.
2. integrifolia L. 4. ganzblättrige Fr.

Pascalina. Pascalie.

1. glauca Orteg. 4. meergrüne C. H.

Paspalum. Pfannengras.

- membranaceum vid. Ceresia.
1. scrobiculatum Flüge. 4. vertieftes C. H.
P. Kora W. En.
 2. setaceum Mich. 4. borstiges C. H.
 3. tenellum W. 4. zartes w. H.
P. elegans Flüge.

Passerina. Vogelkopf.

1. cupressina H. Cels. 4. cypressenartiger C. H.
2. filiformis L. 4. fadenförmiger C. H.
3. spicata L. 4. ährenblüthiger C. H.
P. lateriflora Wendl.

Passiflora. Passionsblume.

1. Adiantum W. 4. krullfarnblättrige C. H.
2. alata Ait. 4. geflügelte w. H.
3. angustifolia W. 4. schmalblättrige w. H.
P. heterophylla Jacq.
P. longifolia Lam.
4. caracassana Jacq. 4. caracassische w. H.
5. ciliata Ait. 4. gefranzte w. H.
6. coerulea L. 4. gemeine C. H.
7. coccinea Aubl. 4. scharlachrothe w. H.
8. cuprea Jacq. 4. kupferfarbene w. H.
9. discolor Link. 4. zweyfarbige w. H.
P. Maximiliana Bory.

Passiflora. Passionsblume.

10. foedita L. ☉. stinkende w. H.
11. glauca Ait. h. graugrüne w. H.
12. gracilis Jacq. h. dünne w. H.
13. holosericea Cav. h. sammetartige w. H.
14. incarnata L. 4. fleischfarbene Fr.
15. laurifolia L. h. lorbeerblättrige w. H.
16. ligularis Juss. h. häutige w. H.
17. lunata Smith. h. mondförmige w. H.

P. biflora Lam.

18. lutea L. h. 4. gelbe Fr.
19. maliformis L. h. apfeltragende w. H.
20. mexicana Juss. h. mexicanische w. H.

P. tuberosa Jacq.

P. picta Hortul.

21. minima L. h. kleinste w. H.
22. Murucua Cav. h. glockenförmige w. H.

P. perfoliata L.

23. normalis W. h. geradwinklige w. H.
24. pedata W. h. siebenblättrige w. H.
25. peltata W. h. schildblättrige w. H.
26. princeps Link. h. vornehme w. H.
27. punctata L. h. punktirte w. H.
28. quadrangularis L. h. viereckige w. H.
29. racemosa Brot. h. traubenblüthige w. H.
30. rigidula Hort. Vindeb. h. efsbare w. H.

P. edulis Link.

31. rubra L. h. rothe w. H.
32. serratifolia L. h. sägeblättrige w. H.
33. serrulata Jacq. h. gezähnelte w. H.
34. suberosa W. h. korkstielige w. H.
35. Vespertilio L. h. Fledermausartige w. H.

Pastinaca. Pastinak.

1. divaricata Desf. ♂. ausgebreiteter Fr.
2. opaca Bernh. ♂. matter Fr.
3. Opoponax L. 4. gummibringender Fr.
4. sativa L. ♂. gemeiner Fr.

Patrinia. Patrinie.

1. rupestris Juss. 4. felsenwachsende Fr.
 2. sibirica Juss. ♂. sibirische Fr.
- Valeriana sibirica* W. Sp. pl. sibirica — .p

Paullinia. *Paullinie.*

1. laciniata Wendl. \mathfrak{h} . schlitzblättrige w. H.
2. pinnata L. \mathfrak{h} . gefiederte w. H.
caracasana et mexicana vid. Seriana.

Pavonia. *Pavonie.*

1. aristata Cav. \mathfrak{h} . grannenartige w. H.
2. platanifolia W. \mathfrak{h} . platanenblättrige w. H.
P. acerifolia Link.
3. praemorsa W. \mathfrak{h} . abgebissene C. H.
P. cuneifolia Cav.
Hibiscus praemorsus L.
4. spinifex Cav. \mathfrak{h} . vielstachlige w. H.
Hibiscus spinifex L.

Pedicularis. *Läusekraut.*

1. palustris L. \odot . Sumpf Fr.

Peganum. *Harmelraute.*

1. Harmala L. \mathfrak{h} . gemeine Fr.

Pelargonium. *Kranichschnabel.*

1. abrotanifolium Jacq. \mathfrak{h} . stabwurzblättriger C. H.
Geranium abrotanifolium L.
2. acerifolium Herit. \mathfrak{h} . ahornblättriger C. H.
3. acetosum Ait. \mathfrak{h} . saurer C. H.
4. adulterinum Ait. \mathfrak{h} . verschwägerter C. H.
5. alchemilloides Ait. \mathfrak{h} . löwenfußblättriger C. H.
6. amplissimum Wendl. \mathfrak{h} . weitblättriger C. H.
7. — b. fl. rubro \mathfrak{h} . mit roth. Blumen C. H.
8. anceps Ait. \mathfrak{h} . zweykantiger C. H.
9. angulosum Ait. \mathfrak{h} . eckiger C. H.
10. apiifolium Jacq. \mathfrak{h} . petersilienblättriger C. H.
P. multiradiatum Wendl.
11. ardens Voigt. \mathfrak{h} . brennender C. H.
12. asperum Ehrh. \mathfrak{h} . scharfrandiger C. H.
13. balsameum Jacq. \mathfrak{h} . balsamischer C. H.
14. — b. latifolium \mathfrak{h} . mit breiten Blättern C. H.
15. Barmanum Voigt. \mathfrak{h} . Barmann's C. H.
16. Barringtonii W. \mathfrak{h} . Barrington's C. H.
17. Beaufortianum Desf. \mathfrak{h} . Beauforts C. H.
18. betulinum Ait. \mathfrak{h} . birkenblättriger C. H.
19. — b. latifolium \mathfrak{h} . mit breiten Blättern C. H.

Pelargonium. Kranichschnabel.

20. bicolor Jacq. h. zweifarbiger C. H.

21. canum Desf. h. blafsgrauer C. H.

P. blattarium Jacq.

22. capitatum Ait. h. kopfblüthiger C. H.

23. — b. latifolium h. mit breiten Blättern C. H.

24. carnosum Ait. h. fleischiger C. H.

25. citrosum Voigt. h. citronenduftiger C. H.

P. citriodorum Hortul.

26. cochleatum W. h. schneckenförmiger C. H.

P. concavifolium Hortul.

27. conduplicatum W. h. doppeltgefalteter C. H.

28. cordatum Ait. h. herzblättriger C. H.

29. — b. crispum h. mit krausen Blättern C. H.

30. coriandrifolium Ait. 4. corianderblättriger C. H.

31. coronopifolium Jacq. h. krähensfußblättriger C. H.

32. cortusaefolium Herit. h. cortusablättriger C. H.

33. Cotyledonis Ait. h. nabelkrautartiger C. H.

34. crassifolium Vent. h. dickblättriger C. H.

35. crataegifolium Hort. h. weifsdornblättriger C. H.

36. crispum Ait. h. krauser C. H.

37. — b. macrophyllum h. mit grofsen Blättern C. H.

38. — c. microphyllum h. mit kleinen C. H.

39. cucullatum Ait. h. tuttenförmiger C. H.

40. Curtisii Jacq. h. Curtis C. H.

41. cynosbatifolium W. h. hagerosenblättriger C. H.

42. delphinifolium W. h. ritterspornblättriger C. H.

43. denticulatum Jacq. h. gezählter C. H.

44. diversifolium Wendl. h. verschiedenblättriger C. H.

45. echinatum Curt. h. stachlicher C. H.

P. hamatum Jacq.

46. — b. fl. albo h. mit weifser Blume C. H.

47. elegans Andr. h. schöner C. H.

48. — b. latifolium h. mit breiten Blättern C. H.

49. exstipulatum Cav. h. nacktwinkliger C. H.

50. flavum Ait. 4. gelber C. H.

51. formosum Desf. h. schöngestalteter C. H.

52. formosissimum Desf. h. schönster C. H.

53. fragile Andr. h. zerbrechlicher C. H.

P. trifidum Jacq.

54. fragrans W. En. h. starkriechender C. H.

55. fulgidum Ait. h. leuchtender C. H.

56. fuscum Jacq. h. braungesleckter C. H.

57. gibbosum Ait. h. höckriger C. H.

Pelargonium. Kranichschnabel.

58. glaucum Ait. h. grauer C. H.
59. glaucophyllum Wendl. h. graublättriger C. H.
P. cuspidatum W.
60. glutinosum Jacq. h. klebriger C. H.
61. — b. laciniatum h. mit zerschlitzten Blättern C. H.
62. grandiflorum W. h. großblüthiger C. H.
63. gratum W. h. angenehmriechender C. H.
64. graveolens Ait. h. starkriechender C. H.
Geranium terebinthinaceum Cav.
65. grofsularioides Ait. 4. stachelbeerartiger C. H.
66. hepaticaeefolium Spr. h. leberkrautblättriger C. H.
67. hermanniaeefolium Jacq. h. hermannienblättriger C. H.
68. Heritieri H. Vindeb. h. Heritierischer C. H.
69. heterogonum Ait. h. rother C. H.
70. hispidum W. h. rispenblüthiger C. H.
71. hybridum Ait. h. bastardartiger C. H.
72. — b. coccineum h. mit scharlachrothen Blum. C. H.
73. incanum W. En. Supl. h. weißlichgrauer C. H.
74. incisum W. h. eingeschnittener C. H.
75. inquinans Ait. h. beschmutzender C. H.
76. — b. fl. carneo h. mit fleischfarben. Blum. C. H.
77. lanceolatum Cav. h. lanzettblättriger C. H.
78. lateripes Ait. h. seitenstieliger C. H.
79. — b. foliis variegatis h. mit bunten Blättern C. H.
80. lateritium W. h. blafsmennigrother C. H.
81. lobatum Ait. 4. lappiger C. H.
82. malvaeefolium Jacq. h. malvenblättriger C. H.
83. melananthos Jacq. 4. schwarzblüthiger C. H.
84. monstrosus Ait. h. ungestalteter C. H.
85. nobile H. Par. h. edler C. H.
86. nothum W. h. unächter C. H.
87. odoratissimum Ait. h. wohlriechenster C. H.
88. — b. frutescens h. strauchartiger C. H.
89. palmatum H. Par. h. handförmiger C. H.
90. papilionaceum Ait. h. schmetterlingsblüthiger C. H.
91. peltatum Ait. h. schildblättriger C. H.
92. penicillatum W. h. pinselförmiger C. H.
93. plicatum H. Breit. h. gefalteter C. H.
94. pulchellum Ait. 4. prächtiger C. H.
95. pumilum W. En. h. niedriger C. H.
96. punctatum Andr. h. punktirter C. H.
97. purpurascens Pers. h. purpurrother C. H.
P. purpureum Hortul.

Pelargonium. **Kranichschnabel.**

98. quercifolium Ait. h. eichblättriger C. H.
 99. quinquevulnerum Andr. h. fünfpunktirter C. H.
 100. Radula Ait. h. raspelblättriger C. H.
 101. — b. roseum W. h. rosenduftiger C. H.
 102. ramosissimum Cav. h. vielästiger C. H.
 103. reflexum Andr. h. zurückgeschlagener C. H.
 104. reniforme Curt. h. nierenförmiger C. H.
 105. rigidum Donn. h. steifblättriger C. H.
 106. rubens W. h. rothblühender C. H.
 107. sanguinum Wendl. h. blutrother C. H.
 108. scandens Ehrh. h. kletternder C. H.
 109. scariosum Voigt h. rauschender C. H.
 110. Scellii . . . h. Scellischer C. H.
 111. selinum Andr. h. silgenblättriger C. H.
 112. semitrilobum Jacq. h. halbdreylappiger C. H.
 113. sidaefolium W. h. sammetpappelblättriger C. H.
 114. speciosum W. h. schöngarteter C. H.
 115. spurium W. h. falscher C. H.
 116. stenopetalum W. h. schmalblüthiger C. H.
 117. superbum Vent. h. prachtvoller C. H.
 118. ternatum Jacq. h. gedreyter C. H.
 119. tetragonum Ait. h. vierkantiger C. H.
 120. tomentosum Jacq. h. filziger C. H.
 121. Tormanni Wendl. h. Torman's C. H.
 122. tricolor Curt. h. dreyfarbiger C. H.
 123. tricuspdatum Herit. h. dreyspitziger C. H.
 124. uniflorum Sessé. h. einblumiger C. H.
 125. triste L. 4. trauernder C. H.
 126. — b. majus 4. gröfser C. H.
 127. vitifolium Ait. h. weinblättriger C. H.
 128. Zonale Ait. h. gesäumter C. H.
 129. — b. fl. albo h. mit weifser Blume C. H.
 130. — c. coccineo h. scharlachrother C. H.
 131. — d. purpureo h. purpurrother C. H.
 132. — e. obtusifolium h. mit abgestutzt. Blättern C. H.
 133. — f. marginatum h. mit gerandeten Blättern C. H.
 134. — g. umbellatum h. doldenblüthiger C. H.
 135. — h. semipleno h. halbgefüllter C. H.
- u. m. d. buntblättrige Spielarten.

Peliosanthes. **Peliosanthes.**

1. Teta. Andr. 4. grünblühende w. H.
Teta viridiflora Roxb.

Peltaria. Scheibenkraut.

1. alliacea L. 4. knoblauchduftendes Fr.
Clypeola alliacea Lam.

Pennisetum. Borstengras.

1. asperum Link 5. rauhes w. H.

Pentapetes. Pentapetes.

1. ovata W. 6. eiförmige w. H.
Brotera ovata Cav.
2. phoenicea L. 6. scharlachrothe w. H.

Pentstemon. Bartfaden.

1. campanulatus W. En. 4. glockenförmiger C. H.
2. pubescens W. 4. behaarter Fr.
Chelone Pentstemon L.

Pentzia vid. Balsamita.

Perilla. Perille.

1. ocymoides L. 6. basilicumartige Fr.

Periploca. Schlinge.

1. africana L. 5. capische C. H.
Cynanchum pilosum R. Br.
2. graeca L. 5. griechische Fr.

Personia. Personie.

1. liniaris Andr. 5. linienblättrige C. H.

Petiveria. Petiverie.

1. alliacea L. 5. knoblauchduftige w. H.

Peucedanum. Haarstrang.

1. alpestre L. 4. Alpen Fr.
2. alsaticum W. 4. elsassischer Fr.
3. arenarium W. et K. 4. Sand Fr.
4. longifolium Spr. 4. langblättriger Fr.
5. officinale W. 4. gemeiner Fr.
6. sibiricum W. et K. 4. sibirischer Fr.
7. Silaus W. 4. Wiesen Fr.
8. tauricum M. B. 4. taurischer Fr.
9. tenuifolium Thunb. 4. feinblättriger Fr.

Phaca. Berglinse.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. australis L. 4. südliche C. H.
3. triangularis Zea. ♂. dreyeckige Fr.

Phalangium vid. Anthericum.

Phalaris. Glanzgras.

1. arundinacea L. 4. rohrartiges Fr.
Arundo colorata Ait.
2. — b. picta 4. mit bunten Blättern Fr.
3. bulbosa W. 4. knolliges Fr.
4. canariensis L. ☉. kanarisches Fr.

Phaseolus. Bohne.

1. bicolor H. Vindeb. ☉. zweyfarbige Fr.
2. Caracalla L. 4. scharlachrothe w. H.
3. domingensis Zucc. ☉. westindische Fr.
4. durus Mart. ☉. harte Fr.
5. lunatus L. ☉. mondförmige Fr.
6. melanospermus Mart. ☉. schwarze Fr.
7. nanus L. ☉. Zwerg-Bohne Fr.
8. nigerrimus Zucc. ☉. schwärzeste Fr.
9. vulgaris L. ☉. gemeine Fr.

Philadelphus. Pfeifenstrauch.

1. coronarius L. ♀. wohlriechender Fr.
2. — b. nanus ♀. niedriger Fr.
3. — c. fl. pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.
4. grandiflorus W. ♀. großblumiger Fr.
Ph. laxus Hortul.

Phillyrea. Steinlinde.

1. angustifolia L. ♀. schmalblättrige Fr.
Ph. rosmarinifolia W.
2. illicifolia W. ♀. stechpalmenblättrige C. H.
3. latifolia L. ♀. breitblättrige Fr.
4. media W. ♀. mittlere Fr.
5. — b. ligustrifolia Mill. ♀. ligusterblättrige Fr.
6. obliqua W. En. ♀. schiefblättrige Fr.
7. pendula Ait. ♀. hängende C. H. et Fr.

Philydram. Wollenlilie.

1. lanuginosum L. ☉. haarige C. H.

Phleum. Lieschgras.

1. arenarium Schrad. ☉. Sand Fr.
Crypsis arenaria Desf.
2. asperum Jacq. ☉. rauhes Fr.
3. Boehmeri Schrad. 4. Böhmers Lieschgras Fr.
Phalaris phleoides L.
4. Gerardi All. 4. Gerardisches Fr.
Ph. capitatum Scop.
5. Michellii All. 4. Michelis Fr.
Phalaris alpina Haenke.
6. pratense L. 4. Wiesen Fr.
Ph. bulbosum Host.

Phlomis. Phlomis.

1. aspera W. ☉. scharfe Fr.
Leucas aspera R. Br.
2. fruticosa L. 5. strauchartige C. H. et Fr.
3. ferruginea Tenor. 5. rostfarbene C. H.
4. Herba venti L. 4. Wind Fr.
5. lanata W. En. Supl. 5. wollige C. H. et Fr.
Phl. fruticosa minor Hortul.
6. Leonurus L. 5. goldfarbige C. H.
Leonotis Leonurus R. Br.
7. Lychnitis L. 5. schmalblättrige C. H.
8. martinicensis L. ☉. westindische Fr.
Ph. caribaea Jacq.
Leucas martinicensis R. Br.
9. nepetifolia L. ☉. katzenmünzblättrige Fr.
Leonotis nepetifolia R. Br.
10. pungens W. 4. stechende Fr.
11. purpurea L. 5. purpurrothe C. H.
12. tuberosa L. 4. knollige Fr.
13. zeylanica L. ☉. zeylonische Fr.
Leucas zeylanica R. Br.

Phlox. Flammenblume.

1. acuminata Pursch. 4. zugespitzte Fr.
P. decussata Lyon.
2. aristata Mich. 4. ährenförmige Fr.
3. carolina L. 4. carolinische Fr.
4. divaricata L. 4. ausgebreitete Fr.
5. glaberrima L. 4. glatte Fr.
6. — b. fl. albo 4. mit weißer Blume Fr.

Phlox. Flammenblume.

7. maculata Ait. 24. gefleckte Fr.
8. ovata L. 24. eiförmige Fr.
9. paniculata L. 24. rispenblüthige Fr.
10. — b. florib. albis 24. mit weissen Blumen Fr.
11. — c. foliis variegatis 24. mit bunt. Blättern Fr.
12. pilosa Mich. 24. haarige Fr.
13. — b. amoena Sims. 24. angenehme Fr.
14. pyramidalis Smith. 24. pyramidenförmige Fr.
15. reptans Mich. 24. kriechende Fr.

Ph. stolonifera Sims.

Ph. obovata Mühlenb.

16. setacea L. 24. borstenblättrige Fr.
17. suaveolens Ait. 24. wohlriechende Fr.
18. — b. foliis variegatis 24. mit bunten Blättern Fr.
19. suffruticosa Vent. 24. halbstrauchartige Fr.
20. undulata Ait. 24. wellenförmige Fr.

Phoenix. Dattelpalme.

1. dactylifera L. 7. gemeine w. H.
2. farinifera Roxb. 7. mehlgebende w. H.

Phormium. Flachslilie.

1. tenax L. 24. zähe C. H.
- Chlamydia tenacissima* Gaert.

Phyllica. Phyllica.

1. acerosa W. 7. nadelblättrige C. H.
 2. buxifolia L. 7. buchsblättrige C. H.
 3. capitata Thunb. 7. kopfförmige C. H.
 4. cylindrica Wendl. 7. walzenförmige C. H.
- P. pubescens* Ait.
5. ericoides L. 7. heidenartige C. H.
 6. eriophora Ait. 7. wollenblättrige C. H.
 7. lanceolata Thunb. 7. lanzettblättrige C. H.
 8. orientalis W. 7. orientalische C. H.
 9. paniculata W. 7. rispenblüthige C. H.
 10. plumosa L. 7. federige C. H.
 11. pumila Wendl. 7. niedrige C. H.
 12. rosmarinifolia Lam. 7. rosmarinblättrige C. H.
 13. spicata L. 7. ährentragende C. H.
 14. squarrosa Desf. 7. sparrige C. H.
 15. stipularis L. 7. gestützte C. H.
 16. thymifolia Vent. 7. thymianblättrige C. H.

Phyllanthus.

Blattblume.

1. acuminatus W. ♀. zugespitzte w. H.
2. arbuscula W. ♀. baumartige w. H.
Ph. speciosus Jacq.
Xylophylla arbuscula W. Sp. pl.
3. cantonensis W. ☉. cantonische w. H.
4. chinensis H. Par. ♀. chinesische w. H.
5. Emblica L. ♀. baumartige w. H.
6. Epiphyllanthus W. En. ♀. schmalblättrige w. H.
Xylophylla angustifolia Sw.
Phyllanthus angustifolius Pers.
7. falcatus Pers. ♀. sichelblättrige w. H.
Xylophylla falcata Sw.
8. juglandifolius W. ♀. wallnufsblättrige w. H.
Ph. grandifolius L.
Lucopyrus vid. Flüggea.
9. montanus Pers. ♀. Berg w. H.
Xylophylla montana Sw.
10. Kirganelia W. ♀. borbonische w. H.
Kirganelia elegans Juss.
11. Niruri L. ☉. weisse w. H.
12. nutans W. ♀. hängende w. H.
Ph. fruticosus Sw.
13. obovatus Mühlenb. ☉. verkehrteyförmige w. H.
14. speciosus Pers. ♀. schöne w. H.
Xylophylla speciosa W.

Phyllis.

Phyllis.

1. nobla L. ♀. schöne C. H.

Physalis.

Schlutten. (Judenkirsche)

1. Alkekengi L. 4. gemeine Fr.
2. angulata L. ☉. eckige Fr.
3. arborescens L. ♀. baumartige C. H.
4. barbadensis Jacq. ☉. barbadensische Fr.
5. dubia Gmel. Syst. ☉. zweifelhafte Fr.
6. flexuosa L. ♀. biegsame C. H.
7. pensylvanica L. 4. pensylvanische C. H.
8. peruviana L. ♀. peruvianische C. H.
9. pubescens R. Br. ☉. haarige Fr.
10. somnifera L. ♀. schlafmachende C. H.

Phyteuma.

Rapwurzeln.

1. canescens W. et K. 4. weißlichgraue Fr.

Phyteuma. Rapwurzeln.

2. campanuloides M. B. 4. glockenblumartige Fr.
3. orbicularis L. 4. kugelförmige Fr.
4. ovata W. 4. eiförmige Fr.
5. pinnata L. 4. gefiederte Fr.
6. scorzonerifolia Vill. 4. haberwurzelnblättrige Fr.
7. spicata L. 4. ährentragende Fr.
8. stylosa Besser 4. grifflige Fr.
9. virgata W. ♂. ruthenförmige Fr.
Campanula virgata Labill.

Phytolacca. Kermesbeere.

1. decandra L. 4. gemeine Fr.
2. dioica L. ♀. baumartige C. H.

Picridium vid. Sonchus.

Picris. Bitterkraut.

1. lappacea Spr. ☉. klettenartiges Fr.

Pimelea. Glanzstrauch.

1. rosea R. Br. ♀. rosenrother w. H.

Pimpinella. Bibernelle.

Anisum vid. Sison.

1. dioica L. 4. gemeine Fr.
Trinia glauca Hoffm.
2. lateriflora Link. 4. seitenblühende Fr.
3. magna L. 4. große Fr.
4. — b. dissecta Spr. 4. schlitzblättr. Fr.
5. rotundifolia M. B. ♂. rundblättrige Fr.
6. Saxifraga L. 4. gemeine Fr.
7. — b. nigra W. 4. schwarze Fr.

Pinckneya. Pinckneye.

1. pubens Mich. ♀. weichhaarige C. H.
Cinchona caroliniana Poir.

Pinus. Fichte.

1. alba Ait. ♀. weisse Fr.
Abies alba Pers.
2. balsamea Ait. ♀. Balsam Fr.
Abies balsamea Mill.

Pinus.

Fichte.

3. Banksiana Lamb. ꝑ. banksienartige Fr.
P. rupestris Mich.
4. canadensis Ait. ꝑ. Schierlings Fr.
P. americana Duroi.
5. Cedrus L. ꝑ. Ceder von Libanon Fr. et C. H.
Larix Cedrus Mill.
6. Cembra Ait. ꝑ. Zürbelfnufs-Kiefer Fr.
7. inopus Ait. ꝑ. Jersey. Fichte Fr.
P. virginiana Mill. Duroi.
8. Larix L. ꝑ. Lerchenbaum Fr.
9. laricina Duroi ꝑ. schwarzenordamerik. Lerche Fr.
P. microcarpa Lamb.
P. pendula Ait.
10. lanceolata Lamb. ꝑ. lanzettblättrige C. H.
Pelis jaculifolia Salisb.
11. maritima Mill. ꝑ. Meerstrands Fr.
12. nigra Ait. ꝑ. schwarze Fr.
P. mariana Ehrh.
13. palustris Ait. ꝑ. Sumpf C. H.
P. australis Mill. fil.
14. Picca L. ꝑ. Harz- oder Pechtanne Fr.
P. Abies Duroi.
15. Pinea L. ꝑ. genießbare C. H.
16. Pumilio W. et K. ꝑ. krummholzhiefer Fr.
P. Mughus Scop.
17. rigida Mill. ꝑ. steife Fr.
18. Strobis L. ꝑ. Weimouths-Fichte Fr.
19. sylvestris L. ꝑ. gemeine Fr.
20. — b. rubra ꝑ. rothe Fr.
21. — c. tatarica ꝑ. tatarische Fr.
22. Taeda L. ꝑ. dreynadlige Fr.
23. variabilis Lamb. ꝑ. verschiedenblättrige Fr.
P. echinata Mill.

Piper.

Pfeffer.

1. aduncum L. ꝑ. krummer w. H.
2. Betle L. ꝑ. Betel-w. H.
3. blandum Jacq. ꝑ. geschmackloser w. H.
4. brachyphyllum W. ꝑ. kurzblättriger w. H.
5. clusiaefolium Jacq. ꝑ. geschlossenblättriger w. H.
6. cuneifolium Jacq. ꝑ. keilblättriger w. H.
7. flexuosum Rudg. ꝑ. gebogener w. H.
8. incanum Haw. ꝑ. grauer w. H.

Piper.

Pfeffer.

9. maculosum L. h. gefleckter w. H.
10. magnoliaefolium Jacq. h. lieberbaumblättriger w. H.
11. marginatum Jacq. h. gerandeter w. H.
12. nigrum W. h. schwarzer w. H.
13. obtusifolium L. h. stumpfblättriger w. H.
14. pellucidum Jacq. ☉. glänzender w. H.
15. pereskiaefolium Jacq. h. pereskienblättriger w. H.
16. plantagineum Lam. h. wegetrittblättriger w. H.

P. medium Jacq.

17. polystachyum Ait. 4. vielähriger w. H.
18. reticulatum L. h. netzförmiger w. H.
19. rugosum Vahl. h. runzlicher w. H.

P. citrifolium L.

20. talinifolium Link. h. talinumblättriger w. H.
21. tomentosum Vahl. h. filziger w. H.
22. trifolium Pers. 4. dreyblättriger w. H.
23. tuberculatum Jacq. h. knopfiger w. H.
24. umbellatum L. h. doldenblüthiger w. H.

P. latifolium Jacq.

25. unguiculatum R. et P. h. nagelförmiger w. H.

P. glaucescens Jacq.

26. verrucosum Sw. h. warziger w. H.
27. verticillatum W. 4. wirtelblättriger w. H.

Piqueria.

Piquerie.

1. trinervia Cav. h. dreynervige C. H.

Piscidia.

Fischfänger.

1. Erythrina L. h. gemeiner w. H.

Pisonia.

Pisonie.

1. aculeata L. h. stachliche w. H.
2. fragrans Spr. h. wohlriechende w. H.
3. mexicana W. h. mexicanische w. H.
4. nitida Desf. h. glänzende w. H.
5. obtusata Jacq. h. abgestutzte w. H.

Pistacia.

Pistacie.

1. Lentiscus L. h. Mastix C. H.
2. narbonensis L. h. narbonische C. H. et Fr.
3. Terebinthus L. h. Terpentin C. H.
4. vera L. h. ächte C. H.

Pisum.

Erbse.

1. arvense L. ☉. gemeine Acker Fr.
2. Ochrus L. ☉. italienische Fr.
3. sativum L. ☉. Garten Fr.
4. — b. umbellatum Mill. ☉. doldenblüthige Fr.

Pitcairnia.

Pitcairnie.

1. angustifolia Ait. 4. schmalblättrige w. II.
2. bromeliaefolia Ait. 4. ananasblättrige w. II.
3. coarctata Pers. 4. gedrängtblättrige w. II.
Pourretia coarctata R. et P.
4. latifolia Ait. 4. breitblättrige w. II.
Bromelia nudicaulis L.

Pittosporum.

Klebsaame.

1. capense Hort. Par. 5. capischer C. H.
2. coriaceum Ait. 5. lederartiger C. H.
3. hirtum W. 5. borstiger C. H.
4. revolutum Ait. 5. zurückgerollter C. H.
5. Tobira Ait. 5. chinesischer C. H.
P. chinense Donn.
6. undulatum Andr. 5. wellenblättriger C. H.

Planera.

Planere.

1. Richardi. Mich. 5. Richards Fr.
Ulmus nemoralis Ait.
— *polygama Richt.*
— *crenata H. Par.*
Rhamnus carpinifolius Walt.

Plantago.

Wegetritt.

1. albicans L. 4. weißlichter Fr.
2. alpina L. 4. Alpen Fr.
3. altissima Jacq. 4. höchster Fr.
4. arenaria W. et K. ☉. sandliebender Fr.
5. asiatica L. 4. asiatischer Fr.
6. atrata Hopp. 4. schwärzlicher Fr.
P. montana Lam.
7. cordata Lam. 4. herzblättriger Fr.
8. Cornuti Gouan. 4. Cornutischer Fr.
9. Coronopus L. ☉. schlitzblättriger Fr.
10. crassifolia Forsk. 4. dickblättriger Fr.
P. bullata Jacq.

Plantago. **Wegetritt.**

11. cucullata Lam. 24. kappenförmiger Fr.
P. maxima W.
12. Cynops L. ʒ. strauchartiger Fr.
P. suffruticosa Lam.
13. depressa W. 24. niedergedrückter Fr.
14. exaltata Hornem. 24. hoher Fr.
15. Lagopus L. ☉. zottiger Fr.
16. lanceolata L. 24. lanzettblättriger Fr.
17. Loeflingii L. ☉. Löflingischer Fr.
18. major L. 24. grösser Fr.
19. maritima L. 24. Meerstrands Fr.
20. media L. 24. mittlerer Fr.
21. microcephala Poir ☉. kleinköpfiger Fr.
22. Psyllium L. ☉. betäubender Fr.
23. pumila W. ☉. niedriger Fr.
24. salsa M. B. 24. salzkrautblättriger Fr.
25. saxatilis M. B. 24. Felsen-Wegetritt Fr.
26. sericea W. et R. 24. seidenartiger Fr.
27. sibirica Fisch. 24. sibirischer Fr.
28. stricta Schaub. ☉. aufrechter Fr.
29. vaginata Vent. ʒ. scheidenförmiger Fr.
30. Wulfeni W. En. 24. Wulfens Fr.

Platanus. **Platanus.**

1. acerifolia Ait. ʒ. ahornblättriger Fr.
2. occidentalis L. ʒ. abendländischer Fr.
3. orientalis L. ʒ. morgenländischer Fr.

Platylobium. **Blattschote.**

1. formosum Smith. ʒ. prächtige C. H.
2. triangulare R. Br. ʒ. dreykantige C. H.

Plectranthus. **Hahnensporn.**

1. fruticosus Herit. ʒ. strauchartiger C. H.
2. Forskohlei Vahl. ʒ. Forskohlischer C. H.
Ocymum hadiense Forsk.
3. parviflorus W. ʒ. kleinblüthiger C. H.

Plumbago. **Bleywurz.**

1. capensis Thunb. ʒ. capische w. H.
2. europaea L. 24. europäische Fr.
3. lapathifolia W. 24. ampferblättrige Fr.
4. rosea L. ʒ. rosenrothe w. H.
5. zeylanica L. ʒ. zeylonische w. H.

Plumeria. Plumerie.

1. alba L. ♀. weisblühende w. H.
2. aurantiaca Donn. ♀. pomranzenfarbene w. H.
3. rubra L. ♀. rothblühende w. H.

Poa. Rispengras.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. aquatica L. 4. Wasser Fr.
P. altissima Moench.
3. aspera Jacq. 4. rauhes Fr.
4. badensis W. 4. badensches Fr.
P. collina Host.
5. cenisia All. 4. cenisisches Fr.
6. compressa L. 4. flachhalmiges Fr.
P. muralis Wibel.
7. debilis Thuill. 4. zerbrechliches Fr.
8. dura W. En. 4. hartes Fr.
Sclerochloa dura Palliss.
9. festucaeformis Host. 4. schwingelförmiges Fr.
10. fluitans W. En. 4. schwimmendes Fr.
Festuca fluitans L.
Glyceria fluitans R. Br.
11. glauca W. En. 4. graues Fr.
12. laxa Haenke. 4. schlaffes Fr.
13. maritima L. 4. Meerstrands Fr.
14. nemoralis L. 4. dünnblühendes Fr.
15. nervata W. 4. nerviges Fr.
16. peruviana Jacq. ☉. peruvianisches Fr.
17. pratensis L. 4. Wiesen-Rispengras Fr.
18. procumbens Smith. ☉. gestrecktes Fr.
Sclerochloa procumbens Paliss.
19. sicula Jacq. ☉. sicilianisches Fr.
20. sudetica Haenke. 4. schlesisches Fr.
P. sylvatica Vill.
21. tenella L. ☉. zartes Fr.

Podaliria. Podalirie.

1. alba W. En. ♀. weisse Fr.
Crotalaria alba L.
2. argentea W. ♀. silberfarbene C. H.
Sophora argentea Pall.
3. australis W. 4. südliche Fr.
Sophora australis L.

Podaliria. Podalirie.

4. bracteata Roxb. ‡. beblätterte C. H.
 5. lupinoides W. En. 4. lupinenblättrige Fr.
 6. myrtifolia Retz. ‡. myrtenblättrige C. H.
- Sophora rotundifolia* Thunb.

Podocarpus. Stielfrucht.

1. elongatus Herit. ‡. verlängerte C. H.
Taxus elongata Ait.
2. macrophylla Sweet. ‡. großblättrige C. H.

Podophyllum. Entenfufs.

1. peltatum L. 4. schildblättriger Fr.

Podospermum vid. Scorzonera.

Pogonia vid. Myoporum.

Pogostemum. Pogostemum.

1. plectranthoides Desf. 4. hahnenspornartiges Fr.

Poinciana vid. Caesalpinia.

Polemonium. Sperrkraut.

1. coeruleum L. 4. blaues Fr.
2. — b. album 4. weifsblühendes Fr.
3. gracile W. 4. schlankes Fr.
4. mexicanum Link. 4. mexicanisches Fr.
5. reptans L. 4. kriechendes Fr.

Polianthes. Tuberoſe.

1. tuberosa L. 4. gemeine C. H.
2. — b. floribus plenis 4. mitgefüllten Blumen C. H.
3. — c. foliis variegatis 4. mit bunten Blättern C. H.

Pollichia. Pollichie.

1. campestris Ait. ♂. Acker C. H.

Pollinia vid. Andropogon.

Polycarpon. Nagelkraut.

1. tetraphyllum L. ☉. vierblättriges Fr.
Holosteum tetraphyllum Thunb.

Polycnemum. Knorpelkraut.

1. arvense L. ☉. Acker Fr.

Polygala. Kreuzblume.

1. Chamaebuxus L. ☿. österreichische C. H.
2. Heisteria L. ☿. Heisterische C. H.
3. mixta Thunb. ☿. gemischte C. H.
4. myrtifolia Jacq. ☿. myrtenblättrige C. H.
5. oppositifolia L. ☿. paarblättrige C. H.
6. speciosa H. Cels. ☿. prächtige C. H.
7. spinosa L. ☿. stachlige C. H.
8. vulgaris L. ♀. gemeine Fr.

Polygonum. Knöterig.

1. acidulum W. En. ♀. säuerlicher Fr.
2. alpinum L. ♀. Alpen Fr.
3. amphibium L. ♀. Wasser Fr.
4. Bellardi All. ☉. Bellardischer Fr.
5. Bistorta L. ♀. Wiesen Fr.
6. coccineum Mühb. ♀. scharlachrother Fr.
7. Convolvulus L. ☉. windender Fr.
8. divaricatum L. ♀. ausgebreiteter Fr.
9. Fagopyrum L. ☉. Buchweizen (Heidekorn) Fr.
10. frutescens L. ☿. strauchartiger Fr.
Fagopyrum frutescens M. B.
11. glabrum W. ☉. glatter Fr.
12. Hydropiper L. ☉. scharfer Fr.
13. incanum Smith. ☉. grauer Fr.
14. lapathifolium L. ♀. ampferblättriger Fr.
15. Laxmanni Lepech. ♀. Laxmannischer Fr.
16. orientale L. ☉. morgenländischer Fr.
17. — b. fl. alb. ☉. mit weissen Blumen Fr.
18. patulum M. B. ☉. ausgebreiteter Fr.
19. Persicaria L. ☉. gemeinster Fr.
20. ramosissimum Mich. ☉. vielästiger Fr.
21. salignum W. ♀. weidenblättriger Fr.
22. scandens L. ☿. kletternder C. H.
23. tataricum L. ☉. tatarischer Fr.
24. undulatum Murr. ☉. wellenblättriger Fr.
P. sibiricum L.
25. virginicum L. ♀. virginischer Fr.
26. viviparum L. ♀. zwiebeltragender Fr.

Polymnia. Polymnie.

1. maculata Cav. 24. gefleckte Fr.
2. Uvedalia L. 24. carolinische C. H.

Polypodium. Engelsüfs.

alpinum vid. Aspidium.

1. aureum L. 24. goldener w. H.
2. calcareum Smith. 24. Kalch Fr.
3. crassifolium Sw. 24. dickblättriger w. H.
4. effusum Sw. 24. weitlaubiger w. H.
5. Dryopteris L. 24. Eichenwald Fr.
6. hyperboreum Sw. 24. nordischer Fr.
7. Phegopteris L. 24. Buchenwald Fr.
8. phyllitides L. 24. hirschzungenartiger w. H.
9. phymathodes L. 24. warziger w. H.
10. tetragonum Sw. 24. viereckiger Fr.
11. vulgare L. 24. gemeiner Fr.
12. — b. cambricum L. 24. Cambrischer Fr.

Pomaderris. Pomaderris.

1. apetala Labill. 5. blumenblätterlose C. H.
2. phylicifolia Lodd. 5. phylicablättrige C. H.

Pontederia. Pontedere.

1. cordata L. 24. herzblättrige C. H.

Populus. Pappel.

1. alba L. 5. Silber Fr.
P. nivea W.
2. — b. canescens W. 5. weißliche Fr.
3. angulata Ait. 5. eckige Fr.
P. angulosa Mich.
P. heterophylla Duroi.
4. balsamifera L. 5. Balsam Fr.
P. Tacamahaca Mill.
5. candicans Ait. 5. herzblättrige Fr.
P. balsamifera Pers.
6. dilatata Ait. 5. lombardische Fr.
P. italica Duroi.
7. graeca Ait. 5. griechische Fr.
P. atheniensis H. Par.
8. grandidentata Mich. 5. grofszähnige Fr.

Populus. **Pappel.**

9. heterophylla L. ♀. verschiedenblättrige Fr.
P. cordifolia Burgsd.
P. argentea Mich.
10. hudsonica Bosc. ♀. hudsonische Fr.
P. betulifolia Pursch.
11. laevigata Ait. ♀. glatte Fr.
12. monilifera Ait. ♀. canadische Fr.
P. caroliniensis Mich.
P. canadensis Burgsd.
13. nigra L. ♀. schwarze Fr.
14. tremula L. ♀. Zitter-Pappel Fr.

Porliera. **Porlierc.**

1. hygrometrica R. et P. ♀. feuchtanzeigende w. H.

Portulaca. **Portulac.**

1. meridiana L. ☉. mittagblüthiger Fr.
2. oleracea L. ☉. gemeiner Fr.
3. pilosa L. ☉. haariger Fr.

Portulacaria. **Portulachbaum.**

1. afra Jacq. ♀. afrikanischer w. H.
Claytonia portulacaria L.

Potamogeton. **Saamenkraut.**

1. densum L. 4. dichtblättriges Fr.
2. natans L. 4. schwimmendes Fr.

Potentilla. **Fingerkraut.**

1. alba L. 4. weißes Fr.
2. angustifolia Dec. 4. schmalblättriges Fr.
3. anserina L. 4. gänserich Fr.
4. argentea L. 4. silberblättriges Fr.
5. arguta Pursch. 4. scharfblättriges Fr.
6. astracantha Jacq. 4. astracanisches Fr.
7. aurea L. 4. goldfarbiges Fr.
8. canescens Besser. 4. weißlichtes Fr.
9. colina Wibell 4. Berg Fr.
10. crocea Hall. 4. safrangelbes Fr.
11. fragarioides L. 4. erdbeerartiges Fr.
12. fruticosa L. ♀. strauchartiges Fr.
13. grandiflora W. 4. großblüthiges Fr.

Potentilla. Fingerkraut.

14. Güntheri Spr. 4. Güntherisches Fr.
15. hirta L. 4. rauhes Fr.
16. hirsuta Mich. 4. haariges Fr.
17. incisa Desf. 4. eingeschnittenes Fr.
18. laciniosa W. et K. 4. zerschlitztes Fr.
19. multifida L. 4. vielspaltiges Fr.
20. opaca L. 4. schattenliebendes Fr.
21. pedata W. 4. fußförmiges Fr.

P. pilosa Dec.

22. pensylvanica L. 4. pensylvanisches Fr.
23. recta L. 4. gerades Fr.
24. reptans L. 4. gemeines Fr.
25. rupestris L. 4. Felsenfingerkraut Fr.
26. ruthenica W. 4. russisches Fr.
27. taurica W. 4. taurisches Fr.
28. verna L. 4. Frühlings Fr.

Poterium. Becherblume.

1. agrimonifolium Cav. 4. odermennigblättrige Fr.
2. caudatum Ait. 5. geschwänzte C. H.
3. hybridum L. 4. Bastard Fr.
4. sanquisorba L. 4. gemeine Fr.
5. spinosum L. 5. dornige C. H.

Pothos. Pothos.

1. cordata L. 4. herzblättriger w. H.
 2. crassinervia Jacq. 4. dicknerviger w. H.
 3. digitata Jacq. 4. fingerblättriger w. H.
 4. foetida Mich. 4. stinkender w. H.
 5. lanceolata L. 4. spiefsblättriger w. H.
 6. macrophylla Sw. 4. großblättriger w. H.
- P. grandifolia* Jacq.
7. rubrinervia Link. 4. rothnerviger w. H.
 8. scolopendrium Spr. 4. hirschzungen w. H.
 9. violacea Sw. 4. violetter w. H.

Prasium. Heckennessel.

1. majus L. 5. große spanische C. H.

Prenanthes. Hasenlattich.

1. hispida W. En. ♂. borstiger Fr.
2. japonica L. ☉. japanischer Fr.

Prenanthes. **Hasenlattich.**

3. muralis L. ☉. Mauer-Hasenlattich Fr.
4. pinnata L. ☿. strauchartiger C. H.
5. purpurea W. ♀. purpurrother Fr.
7. viminea L. ♂. ruthenartiger Fr.

Primula. **Schlüsselblume.**

1. acaulis Jacq. ♀. stengellose Fr.
P. uniflora Gmel. Hort. Carls.
P. grandiflora Lam.
 plur. var. pl. et simplicis. ♀. in mehreren einfachen
 und gefüllten Abarten Fr.
2. Auricula L. ♀. Aurikel Fr.
3. — b. lutea Vill. ♀. mit gelben Blumen Fr.
 — in vielen hundert Farbenmischungen Fr.
4. carniolica Jacq. ♀. Krainsche Fr.
5. cortusoides L. ♀. schönste Fr.
6. elatior Jacq. ♀. Garten-Primel Fr.
P. veris b. *elatior* L.
 plures varietates ♀. in vielen Abarten Fr.
7. glutinosa L. ♀. klebrige Fr.
8. helvetica Donn. ♀. Schweizer-Aurikel. Fr.
9. integrifolia L. ♀. ganzblättrige Fr.
10. marginata Curt. ♀. gerandete Fr.
11. minima L. ♀. kleinste Fr.
12. officinalis Jacq. ♀. gemeine Fr.
P. veris L.
13. Palinuri Jacq. ♀. palinurische Fr.
14. villosa Jacq. ♀. haarige Fr.
P. viscosa Vill.

Prinos. **Winterbeere.**

1. glaber L. ☿. canadische Fr.
2. lucidus Ait. ☿. glänzende Fr.
3. verticillatus L. ☿. virginische Fr.

Prostranthera. **Prostranthere.**

1. Lasianthus Labill. ☿. langstielige C. H.

Protea. **Silberbaum.**

1. argentea W. En. ☿. wahrer C. H.
Leucadendron argenteum R. Br.
2. caudata Thunb. ☿. geschwänzter C. H.

Protea. Silberbaum.

3. ciliaris Hort. Anglor. ꝑ. gefranzter C. H.
P. ciliata Voigt.
4. cinerea Ait. ꝑ. aschgrauer C. H.
Leucadendron tortum R. Br.
5. conferta Poir. ꝑ. gehäufte C. H.
Leucadendron strictum R. Br.
6. conifera L. ꝑ. zapfentragender C. H.
Leucadendron salignum R. Br.
7. cynaroides L. ꝑ. artischokenartiger C. H.
8. divaricata Thunb. ꝑ. ausgebreiteter C. H.
Mimetes divaricata R. Br.
Protea divaricata Lam.
9. flavescens W. ꝑ. gelblicher C. H.
10. graminea Hort. Anglor. grasblättriger C. H.
11. hirsuta W. ꝑ. rauhaariger C. H.
12. marginata W. ꝑ. gerandeter C. H.
13. mellifera Thunb. ꝑ. Zucker-Silberbaum C. H.
P. repens L.
14. pallens L. ꝑ. bleicher C. H.
Leucadendron adscendens R. Br.
15. pinifolia W. ꝑ. fichtenblättriger C. H.
Aulax pinifolia R. Br.
Leucadendron pinifolia L.
16. plumosa Ait. ꝑ. federnartiger C. H.
Leucadendron plumosa R. Br.
17. procumbens L. ꝑ. niedergestreckter C. H.
Serruria decumbens Thunb.
18. saligna Andr. ꝑ. weidenblättriger C. H.
Leucadendron floridum R. Br.
19. spathulata Thunb. ꝑ. löffelblättriger C. H.
20. speciosa Ait. ꝑ. schöner C. H.
21. strobilina Schrad. ꝑ. fichtenzapfenartiger C. H.
Leucadendron concolor R. Br.
22. tomentosa L. ꝑ. filziger C. H.
23. torta Thunb. ꝑ. gedrehter C. H.
Leucadendron tortum R. Br.

Prunella. Prunelle.

1. grandiflora L. ꝑ. großblüthige Fr.
2. hirta Bernh. ꝑ. rauhe Fr.
3. hyssopifolia L. ꝑ. isopblättrige Fr.
4. laciniata All. ꝑ. schlitzblättrige Fr.
5. ovata Desf. ꝑ. eyrunde Fr.
6. pensylvanica W. En. ꝑ. pensylvanische Fr.

Prunus. Pflaume.

1. Armeniaca L. ꝑ. Apricosenbaum Fr.
2. — b. foliis variegatis ꝑ. mit bunten Blättern Fr.
3. avium L. ꝑ. süsse Kirsche Fr.

Cerasus avium Pers.

Mit vielen Abarten Fr.

4. Brigantiaca Ait. ꝑ. Brigantinische Fr.
 5. candicans W. En. ꝑ. weißliche Fr.
 6. caroliniana Ait. ꝑ. carolinische Fr.
- P. sempervirens W.*
7. cerasifera Ehrh. ꝑ. Kirschpflaume Fr.
- P. myrobalana Desf.*
8. Cerasus L. ꝑ. saure Kirsche Fr.
- plur. variet. Mit vielen Abarten Fr.
9. Chamaecerasus Jacq. ꝑ. strauchartige Kirsche Fr.
 10. Chicasa Mich. ꝑ. Chicasische Fr.
 11. dasycarpa Ehrh. ꝑ. schwarze Apricose Fr.
- Armeniaca dasycarpa Pers.*
12. domestica L. ꝑ. gemeine Pflaume Fr.
 13. — b. florib. plenis ꝑ. mit gefüllten Blumen Fr.
- plur. variet. Mit vielen Abarten Fr.
14. hyemalis Mich. ꝑ. spätblühende Fr.
 15. insititia L. ꝑ. Kriechen-Pflaume Fr.
 16. Laurocerasus L. ꝑ. Kirschlorbeer Fr. et C. H.
 17. — b. foliis variegatis ꝑ. m. bunt. Blät. Fr. et C. H.
 18. lusitanica L. ꝑ. lusitanische Fr.
 19. Mahaleb L. ꝑ. Mahalebs-Kirsche Fr.
 20. — b. fructu flavo ꝑ. Mit gelber Frucht Fr.
 21. maritima W. En. ꝑ. Meerstrands Fr.

P. acuminata Mich.

22. nigra Ait. ꝑ. schwarze Fr.
23. Padus L. ꝑ. Trauben-Kirsche Fr.
24. pensylvanica Ait. ꝑ. pensylvanische Fr.
25. prostrata Labill. ꝑ. gestreckte Fr.
26. pumila L. ꝑ. niedrige Fr.

Cerasus canadensis Mill.

27. rubra W. Baumz. ꝑ. rothe Fr.
 28. semperflorens Ehrh. ꝑ. immerblühende Kirsche Fr.
- P. serotina Roth.*
29. serotina Ehrh. ꝑ. spätblühende Fr.
 30. spinosa L. ꝑ. Schlehen-Pflaume Fr.
 31. virginiana L. ꝑ. virginische Fr.

Psiadia. **Tropfenpflanze.**

1. glutinosa Jacq. h. klebrige C. H.
Solidago viscosa Schrad.

Psidium. **Gujavabaum.**

1. aromaticum Aubl. h. gewürzhafter w. H.
2. catejanum Hortor. Anglor. h. catejanischer w. H.
3. montanum L. h. Berg w. H.
4. pomiferum L. h. äpfeltragender w. H.
5. pyriferum L. h. birnentragender w. H.
Guava pyriformis Gaert.

Psoralea. **Psoralea.**

1. aphylla L. h. blattlose C. H.
2. axillaris L. h. winkelblättrige C. H.
3. bituminosa L. h. harzige C. H.
4. capitata L. h. kopfförmige C. H.
5. corylifolia L. ♂. haselnufsblättrige C. H.
6. glandulosa L. h. drüsige C. H.
7. lathyrifolia Balb. h. platterbsenblättrige C. H.
8. odoratissima Jacq. h. wohlriechende C. H.
9. palaestina L. h. orientalische C. H.
10. pedunculata Ker. ☉. gestielte Fr.
11. pinnata L. h. gefiederte C. H.
12. spicata L. h. ährenblüthige C. H.
13. tenuifolia L. h. feinblättrige C. H.
14. tomentosa Thunb. h. filzige C. H.
15. verrucosa Ait. h. warzige C. H.
P. angustifolia Jacq.

Psychotria. **Psychotrie.**

1. parviflora W. h. kleinblüthige w. H.
2. undata Jacq. h. wellenförmige w. H.

Ptelea. **Lederblume.**

1. trifoliata L. h. dreyblättrige Fr.

Pteris. **Saumfarn.**

1. aquilina L. 4. Adler-Saumfarn Fr.
2. arguta Ait. 4. spaltlaubiger w. H.
3. argentea L. 4. silberner Fr.
4. atropurpurea L. 4. schwarzrother C. H.
5. cretica L. 4. candischer C. H.

Pteris. Saumfarn.

6. hastata Sw. 4. spontanblättriger C. H.
7. lanuginosa Bory. 4. wolliger w. H.
8. longifolia L. 4. langblättriger w. H.
9. nemoralis Bory. 4. Wald-Saumfarn w. H.
10. palmata W. 4. handförmiger w. H.
11. pedata Sw. 4. tieflappiger w. H.
12. Plumieri Link. 4. Plumierischer w. H.
13. serrulata L. 4. gesägter w. H.

Pterospermum. Flügelkern.

1. acerifolium W. 5. ahornblättriger w. H.
Dombeya acerifolia Gaert.
2. suberifolium W. 5. zugespitzter w. H.
Pentapetes suberifolia L.

Pulmonaria. Lungenkraut.

1. angustifolia L. 4. schmalblättriges Fr.
2. — b. oblongata Schrad. 4. länglichtes Fr.
3. davurica Sims. 4. davurisches Fr.
P. amoena Stev.
4. mollis Wulf. 4. weichhaariges Fr.
5. officinalis L. 4. gemeines Fr.
6. sacharata Siemers. 4. zuckerartiges Fr.
7. virginica L. 4. virginisches Fr.
Mertensia pulmonarioides Roth.

Pulsatilla. Küchenschelle.

1. vulgaris Mill. 4. gemeine Fr.
Anemone Pulsatilla L.
2. — b. intermedia 4. mittlere Fr.

Pultenaea. Pultenace.

1. daphnoides Wendl. 5. seidelbastblättrige C. H.
2. stipularis Smith. 5. afterblättrige C. H.
3. stricta Sims. 5. aufrechte C. H.
4. villosa W. 5. haarige C. H.

Punica. Granate.

1. Granatum L. 5. gemeine C. H.
2. — b. florib. alb. plen. 5. mit weißgefüllten Bl. C. H.
3. — c. luteis plen. 5. mit gelbgefüllten Bl. C. H.
4. — d. flor. rubr. plen. mit rothgefüllten Bl. C. H.

Pycnanthemum vid. Brachystemum.

Pyrethrum. Bertramwurz.

1. alpinum W. 4. Alpen Fr.
Chrysanthemum alpinum L.
2. anethifolium Brouss. h. würzdoldenblättrige Fr.
3. bipinnatum W. En. 4. doppeltgefiederte Fr.
Chrysanthemum bipinnatum L.
4. coronopifolium W. h. schlitzblättrige C. H.
5. foeniculaceum W. En. h. fenchelblättrige C. H.
6. frutescens W. h. strauchartige C. H.
Chrysanthemum frutescens L.
7. grandiflorum W. h. großblumige C. H.
8. inodorum Smith. ☉. geruchlose Fr.
Chrysanthemum inodorum L.
9. latifolium W. En. 4. breitblättrige Fr.
10. millefolium M. B. 4. schaaifarbenblättrige Fr.
11. parthenifolium W. En. 4. mutterkrautblättrige Fr.
12. pinnatifidum W. h. gefiederte C. H.
13. pulverulentum W. En. 4. bestäubte Fr.
14. roseum M. B. 4. rosenrothe Fr.
15. serotinum W. En. 4. spätblühende Fr.
Chrysanthemum serotinum L.
16. tenuifolium W. 4. dünnblättrige Fr.

Pyrus. Birne.

1. alpina W. En. h. Alpen Fr.
Crataegus alpina Hortul.
2. Amelanchier W. En. h. Felsenbirne Fr.
Mespilus Amelanchier L.
3. angustifolia Ait. h. schmalblättrige Fr.
4. arbutifolia W. h. sandbeerblättrige Fr.
Mespilus arbutifolia L.
5. Aria W. h. Mehlbeerbaum Fr.
Crataegus Aria L.
6. baccata L. h. sibirischer Eisapfel Fr.
7. Botryapium W. h. Traubenbirne Fr.
Mespilus canadensis L.
8. communis L. h. gemeine Fr.
P. sylvestris Moench.
9. coronaria L. h. wohlriechende Fr.
Malus coronaria Pers.
10. dioica W. h. grünblühende Fr.
P. apetala Moench.

Pyrus. Birne.

11. *edulis* W. En. ꝥ. eßbare Fr.
Crataegus edulis Hortul.
12. *hybrida* W. En. Bastard Fr.
Sorbus spuria Pers.
13. *intermedia* W. En. ꝥ. schwedischer Mehlbaum Fr.
Crataegus Aria b. L.
Sorbus intermedia Pers.
14. *Malus* L. ꝥ. Apfelbaum Fr.
Malus communis Desf.
15. *melanocarpa* W. ꝥ. schwarzfrüchtige Birne Fr.
Mespilus arbutifolia b. *nigra* W. Sp. pl.
16. *nivalis* L. ꝥ. Schnee Fr.
17. *ovalis* W. ꝥ. rundblättrige Birne Fr.
Mespilus Canadensis b. *ovalis* Mich.
18. *Pollveria* L. ꝥ. Hanbuttenbirne Fr.
19. *prunifolia* W. ꝥ. pflaumenblättrige Fr.
20. *Sinaica* Thouin. ꝥ. sinaische Fr.
21. *salicifolia* Pall. ꝥ. weidenblättrige Fr.
22. *spectabilis* Ait. ꝥ. prächtige Fr.
23. *torminalis* W. En. ꝥ. Elzbeerbaum Fr.
Crataegus torminalis L.
Cydonia, *japonica* et *chinensis*, vid. *Cydonia*.

Q.

Quercus. Eiche.

1. *alba* L. ꝥ. weiße Fr.
2. *Aegilops* L. ꝥ. Knopper Fr.
3. *Banisteri* Mich. ꝥ. Banisterische Fr.
4. *bicolor* W. ꝥ. zweyfarbige Fr.
Q. Prinos tomentosa Mich.
5. *Catesbaei* Mich. ꝥ. Catesbaeische Fr.
6. *Cerris* L. ꝥ. burgundische Fr.
7. — b. *sinuata* Ait. ꝥ. mit buchtigen Blättern Fr.
8. — c. *frondosa* ꝥ. buschige Fr.
9. *cinerea* Mich. ꝥ. graue Fr.
Q. humilis Walt.
10. *coccifera* L. ꝥ. Kermes-Eiche Fr.
11. *coccinea* W. ꝥ. scharlachrothe Fr.

Quercus. Eiche.

12. discolor Ait. h. verschiedenfarbige Fr.
Q. sinuosa Mich.
13. Esculus L. h. genießbare Fr.
14. falcata Mich. h. sichelförmige Fr.
Q. elongata W.
15. fastigiata Lam. h. Pyramiden Fr.
Q. pyramidalis Hortul.
16. gramuntia L. h. wellenblättrige C. H.
17. Ilex L. h. Stein C. H. et Fr.
18. — b. integrifolia Ait. h. ganzblättrige C. H.
19. — c. oblonga Ait. h. längliche C. H.
20. imbricaria Mich. h. schuppenfrüchtige Fr.
21. infectoria Oliv. h. Färber-Eiche C. H.
22. macrocarpa Mich. h. großfrüchtige Fr.
23. nigra L. h. schwarze Fr.
Q. ferruginea Mich.
24. obtusiloba Mich. h. stumpfwinklige Fr.
25. palustris Mich. h. Sumpf Fr.
Q. rubra dissecta Lam.
26. pedunculata L. h. stielfrüchtige Fr.
27. — b. fol. angustiorib. h. mit schmälern Blättern Fr.
28. Phellos L. h. weidenblättrige Fr.
29. Prinus L. h. kastanienblättrige Fr.
30. pseudo-coccifera Desf. h. stechende C. H.
31. pseudo-suber. Desf. h. unächte Kork-Eiche C. H.
32. rigida W. h. steife C. H.
33. Robur W. h. Stein Fr.
34. — b. foliis variegatis h. mit bunten Blättern Fr.
35. — c. pendula h. hängende Fr.
36. rotundifolia Lam. h. rundblättrige Fr.
37. rubra L. h. rothe Fr.
38. — b. latifolia h. mit breiten Blättern Fr.
39. sempervirens Walt. h. immergrüne C. H.
Q. virens Ait.
40. Suber L. h. Kork-Eiche C. H.
41. Tauzin Pers. h. pyrenäische Fr.
42. tinctoria Mich. h. Quercitron-Eiche Fr.
Q. tinctoria angulosa Mich.
43. tomentosa W. h. filzige Fr.
44. triloba Mich. h. dreylappige Fr.
Q. cuneata Wagh.
45. Turneri W, En. h. Turnersche C. H.

Queria.

Queric.

1. canadensis L. ☉. canadische Fr.
2. hispanica L. ☉. spanische Fr.

Quisqualis.

Quisqualis.

1. indica L. ☿. indische w. H.

R.

Rafnia.

Rafnie.

1. retusa Thunb. ☿. eingedrückte C. H.
Tempeltonia retusa R. Br.

Ramondia.

Ramondie.

1. pyrenaica W. En. ♀. pyrenäische Fr.
Verbascum Myconi L.

Randia.

Randie.

1. aculeata L. ☿. stachelige w. H.
Gardenia Randia Schw.

Ranunculus.

Ranunkel.

1. abortivus L. ♀. virginische Fr.
2. aconitifolius L. ♀. eisenhutblättrige Fr.
3. — b. flore pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.
4. — c. platanifolius ♀. platanusblättrige Fr.
5. acris L. ♀. scharfe Fr.
6. — b. flore pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.
7. alpestris L. ♀. Alpen Fr.
8. aquatilis L. ♀. Wasser Fr.
9. — b. heterophyllus Hoffm. ♀. Fr.
10. asiaticus L. ♀. Garten-Ranunkel Fr.
R. hortensis Pers.
11. auricomus L. ♀. verschiedenblättrige Fr.
R. polymorphus All.
12. bulbosus L. ♀. knollige Fr.
13. cassubicus L. ♀. cassubische Fr.
14. chacrophyllus L. ♀. kerbelblättrige Fr.
15. — b. fl. pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.
16. Ficaria L. ♀. Feigwarzen Fr.
Ficaria verna Pers.

Ranunculus. Ranunkel.

17. flammula L. 4. beissende Fr.
18. glacialis L. 4. glätscher Fr.
19. Gouani W. 4. Gouanische Fr.
 R. furcatus Berg.
20. gramineus L. 4. grasblättrige Fr.
21. hirsutus Ait. ☉. rauhaarige Fr.
 R. philonotis Retz.
22. illyricus L. 4. illyrische Fr.
23. lacerus Bell. 4. geschlitztblättrige Fr.
 R. vallesiacus Suter.
24. monspeliacus L. 4. französische Fr.
 R. apiifolius Desf.
25. muricatus L. ☉. stachelsaamige Fr.
 R. echinatus Vent.
26. napellifolius Dec. 4. eisenhutblättrige Fr.
27. nodiflorus L. ☉. knotenblüthige Fr.
28. parviflorus L. ☉. kleinblüthige Fr.
29. pedatus W. et K. 4. fußförmige Fr.
30. pyrenaicus L. ☉. pyrenäische Fr.
31. repens L. 4. kriechende Fr.
32. — b. flore pleno 4. mitgefüllter Blume Fr.
33. rutaefolius L. 4. rautenblättrige Fr.
34. sceleratus L. ☉. blasenziehende Fr.
35. segetalis W. et K. ☉. Saat Fr.
36. Thora L. 4. giftige Fr.
37. trilobus Desf. 4. dreylappige Fr.
38. tuberculatus Dec. 4. knopfige Fr.
39. tuberosus Lapeyr. 5. knollige Fr.
40. Villarsii Dec. 4. Villarsische Fr.

Raphanus. Rettig.

1. caudatus L. ☉. geschwänzter Fr.
2. Raphanistrum L. ☉. Hederich Fr.
3. sativus L. ☉. Rüben Fr.
4. — b. chinensis Pers. ☉. Oelrettig Fr.

Rauwolfia. Rauwolfie.

1. glabra Cav. 5. glatte w. H.
2. nitida L. 5. glänzende w. H.
3. spinosa Cav. 5. stachlige w. H.

Ravenalia vid. Urania.

Relhania. Relhanie.

1. squarrosa Herit. 5. sparrige C. H.

Reseda. Resede.

1. canescens L. ☉. graue Fr.
2. fruticulosa L. 4. strauchartige Fr.
3. lutea L. 4. gelbe Fr.
4. luteola L. ♂. Wau-Resede Fr.
5. odorata L. ☉. wohlriechende Fr.
6. Phyteuma L. ☉. kleine Fr.
7. undata L. 4. wellenblättrige Fr.
8. virescens Hornem. ♂. grünende Fr.

Rhagadiolus. Sichelsalat.

1. edulis W. ☉. gemeiner Fr.
2. Koelpinia Lam. ☉. Kölpinischer Fr.
Koelpinia linearis Pall.
3. stellatus W. ☉. sternförmiger Fr.
Lapsana stellata L.

Rhagodia. Rhagodie.

1. hastata R. Br. ♀. pfeilblättrige C. H.

Rhamnus. Wegdorn.

1. Alaternus L. ♀. immergrüner C. H. et Fr.
2. — b. balearica ♀. balearischer C. H.
3. — c. foliis argent. variegat. ♀. weisbuntbltgr. C.H.
4. — d. — aur. variegat. ♀. gelbbuntblättriger C.H.
5. — e. — maculatis ♀. gefleckter C. H.
6. — f. latifolius ♀. breitblättriger C. H.
7. alnifolius Herit. ♀. elsenblättriger Fr.
R. franguloides Mich.
8. alpinus L. ♀. Alpen Fr.
9. buxifolius Poir. ♀. buxblättriger C. H.
10. catharticus L. ♀. gemeiner Fr.
11. Colubrinus L. ♀. Schlangen C. H.
12. Erythroxylon Pall. ♀. rothholziger Fr.
13. frangula L. ♀. glatter Fr.
14. glandulosa Ait. ♀. drüsiger C. H.
15. hybridus Herit. ♀. Bastard Fr.
R. burgundicus Desf.
16. infectorius L. ♀. färbender Fr.
17. latifolius Herit. ♀. breitblättriger C. H. et Fr.
18. lycioides L. ♀. bocksdornartiger C. H.

Rhamnus. Wegdorn.

19. pumilus L. h. niedriger Fr.
20. rupestris Scop. h. Fels-Wegdorn Fr.
21. saxatilis L. h. Stein-Wegdorn Fr.
22. theezans L. h. theeblättriger C. H.
R. Thea Osb.
23. tinctorius R. et S. h. Färber-Wegdorn Fr.
24. Willdenowianus R. et S. h. Willdenowischer C.H.
Rhamnus longifolius Desf.
Rhamnus jujuba, Paliurus, sinensis, Spina Christi,
et volubilis vid. Zizyphus.

Rhapis. Rhapis.

1. flabelliformis Ait. h. fächerblättrige w. H.
Chamaerops excelsa Thunb.

Rheum. Rhabarber.

1. compactum L. 4. dichter Fr.
2. hybridum L. 4. Bastard Fr.
3. palmatum L. 4. schlitzblättriger Fr.
4. Rhaponticum L. 4. stumpfblättriger Fr.
5. Ribes L. 4. morgenländischer Fr.
6. undulatum L. 4. wellenblättriger Fr.

Rhexia. Rhexie.

1. mariana W. 4. marianische C. H.

Rhipidodendrum. Fächerbaum.

1. distichum W. h. zweyzeiliger w. H.
Aloe plicatilis Ait.

Rhizophora. Wurzelbaum.

1. Mangle L. h. gemeiner w. H.

Rhodiola. Rosenwurz.

1. rosea L. 4. gemeine Fr.

Rhododendron. Alpbalsam.

1. arboreum Smith. h. baumartiger C. H. et Fr.
2. azaloides Desf. h. azaleenartiger Fr.
3. catabiense Mich. h. catabiensischer Fr.
4. caucasicum Pall. h. kaukasischer Fr.

Rhododendron. Alpbalsam.

5. dauricum L. ꝑ. davurischer Fr.
6. ferrugineum L. ꝑ. rostfarbiger Fr.
7. hirsutum L. ꝑ. gefranzter Fr.
8. — b. foliis variegatis ꝑ. mit bunten Blättern Fr.
9. hybridum H. Cels. ꝑ. Bastard Fr.
10. maximum L. ꝑ. größser Fr.
11. — b. flore albo ꝑ. mit weißer Blume Fr.
12. ponticum L. ꝑ. pontischer Fr.
13. — b. angustifolium ꝑ. schmalblättriger Fr.
14. — c. cassinefolium ꝑ. cassineblättriger Fr.
15. — d. crispum ꝑ. graufser Fr.
16. — e. roseum ꝑ. rosenfarbiger Fr.
17. — f. salicifolium ꝑ. weidenblättriger Fr.
18. — g. undulatum ꝑ. wellenförmiger Fr.
19. — h. foliis variegatis ꝑ. mit bunten Blättern Fr.
20. punctatum Wild. ꝑ. punktirter Fr.

Rhodora. Rhodore. (Felsenstrauch)

1. canadensis L. ꝑ. canadische Fr.

Rhus. Sumach.

1. angustifolium L. ꝑ. schmalblättriger C. H.
2. Copallinum L. ꝑ. Copal-Sumach Fr.
3. Coriaria L. ꝑ. Gerber C. H. et Fr.
4. Cotinus L. ꝑ. Perücken Fr.
5. cuneifolium L. ꝑ. keilblättriger C. H.
6. elegans Ait. ꝑ. schöner Fr.
7. glabrum L. ꝑ. glatter Fr.
8. heterophyllum Desf. ꝑ. verschiedenblättriger C. H.
9. javanicum L. ꝑ. javanischer C. H.
10. laevigatum L. ꝑ. unbekahrter C. H.
11. lucidum Cav. ꝑ. glänzender C. H.
12. — b. latifolium ꝑ. mit breiten Blättern C. H.
13. oxyacanthoides Schousb. ꝑ. weisdornblättriger C. H.
14. pubescens Thunb. ꝑ. weichhaariger C. H.

R. atomarium Jacq.

15. pumilum Mich. ꝑ. niedriger Fr.
16. radicans L. ꝑ. wurzelnder Fr.
17. — b. Toxicodendron Pers. ꝑ. mit Eichenblätt. Fr.
18. suaveolens Ait. ꝑ. wohlriechender C. H.

Myrica trifoliata L.

19. tomentosum L. ꝑ. filziger C. H.
20. typhinum L. ꝑ. virginischer Fr.

Rhus.

Sumach.

21. undulatum Jacq. h. wellenblättriger C. H.
22. Vernix L. h. Firnifs Fr.
23. villosum L. h. filziger C. H.
24. viminale Ait. h. ruthenförmiger C. H.
R. lanceum L.

Ribes.

Johannisbeere.

1. alpinum L. h. Alpen Fr.
2. aureum Pursch. h. goldgelbe Fr.
3. Cynosbati L. h. stachelfrüchtige Fr.
4. Diacantha L. h. zweystachelige Fr.
5. floridum Herit. h. pensylvanische Fr.
R. pensylvanicum Lam.
6. glandulosum Ait. h. drüsige Fr.
R. prostratum Herit.
7. Grossularia L. h. Stachelbeere Fr.
Mit vielen Abarten.
8. laxiflorum Pursch. h. schlaffblüthige Fr.
9. nigrum L. h. Gichtbeere Fr.
10. — b. foliis variegatis h. mit bunten Blättern Fr.
11. odoratum Wendl. Fil. h. wohlriechende Fr.
12. petraeum Jacq. h. rothblühende Fr.
13. rigens Mich. h. liegende Fr.
14. rubrum L. h. gemeine Fr.
15. — b. fructib. albis et incarnatis mit weissen und
fleischfarbenen Früchten Fr.
16. triflorum W. h. dreyblüthige Fr.
17. uva-crispa L. h. glatte Fr.

Richardia.

Richardie.

1. scabra L. ☉. rauhe Fr.

Ricinus.

Wunderbaum.

1. communis L. ☉. gemeiner Fr.
2. hybridus Link. ☉. Bastard Fr.
3. inermis Jacq. ☉. wehrloser Fr.
4. paniculatus Link. ☉. rispenblüthiger Fr.
5. viridis W. ☉. grüner Fr.

Rivina.

Rivine.

1. brasiliensis W. h. brasilianische w. H.
2. humilis L. h. niedrige w. H.
3. octandra Jacq. h. achtfädige w. H.
4. purpurascens Schrad. h. purpurrothe w. H.

Robinia. (Acacie) Robinie.

1. Altagana Herit. h. Sand Fr.
2. Caragana L. h. sibirische Fr.
3. Chamlagu Herit. h. glänzende Fr.
R. chinensis Pers.
4. frutescens L. h. strauchartige Fr.
5. Halodendron L. h. graue Fr.
Caragana argentea Lam.
6. hispida L. h. stachlige Fr.
R. rosea Duham.
7. inermis Desf. h. Kugelacacie Fr.
R. umbraculifera Dec.
8. jubata Pall. h. männenartige Fr.
9. Pseudacacia L. h. gemeine Acacie Fr.
10. — b. amorphaeifolia h. mit Indigblättern Fr.
11. — c. crispa h. mit krausen Blättern Fr.
12. — d. dubia h. zweifelhafte Fr.
13. — e. inermis h. wehrlose Fr.
14. — f. longifolia h. langblättrige Fr.
15. — g. microphylla h. kleinblättrige Fr.
16. — h. sophoraefolia h. sophorenblättrige Fr.
17. — i. stricta h. aufrechte Fr.
18. — k. tortuosa h. gedrehte Fr.
19. pygmaea L. h. niedrige Fr.
20. rosea Mill. h. rosenrothe Fr.
21. spinosa L. h. dornige Fr.
R. ferox Pall.
22. viscosa Vent. h. klebrige Fr.

Rochea. Roche.

1. coccinea Haw. h. scharlachrothe C. H.
Crassula coccinea L.
2. falcata Dec. h. sichelblättrige w. H.
Crassula falcata W. En.
3. odoratissima Haw. h. wohlriechende C. H.
Crassula odoratissima Andr.
4. perfoliata Haw. h. durchwachsene C. H.
5. versicolor Haw. h. verschiedenblättrige C. H.

Roella. Thaupflanze.

1. ciliata L. h. gefranzte C. H.

Rondeletia. Rondeletie.

1. americana L. h. amerikanische w. H.
2. racemosa Sw. h. traubenblüthige w. H.

Rosa.

Rose.

1. alba W. ꝑ. weisse Fr.
2. — b. pleno ꝑ. gefüllte Fr.
3. — c. semipleno ꝑ. halbgefüllte Fr.
4. alpina L. ꝑ. Alpen Fr.
5. — b. flore pleno ꝑ. mit gefüllter Blume Fr.
6. altaica W. ꝑ. altaische Fr.
R. pimpinellifolia Pall.
7. apiifolia W. ꝑ. eppigblättrige Fr.
8. arvensis Dec. ꝑ. Feldrose Fr.
R. repens Scop.
R. serpens Wibl.
9. Banksiae Ait. ꝑ. Banksianische C. H.
10. belgica Roess. ꝑ. niederländische Fr.
11. blanda Ait. ꝑ. Hudsonsbay Fr.
12. bifera Pers. ꝑ. zweymaltragende Fr.
R. calendarium corymbosum Roess.
13. — b. alba ꝑ. mit weissen Blumen Fr.
14. — c. rubra ꝑ. mit rothen Blumen Fr.
15. bracteata Vent. ꝑ. beblätterte C. H. et Fr.
16. burgundica Pers. ꝑ. burgunder Fr.
17. — b. humilis ꝑ. niedrige Fr.
18. — c. major ꝑ. grosse Fr.
19. canina L. ꝑ. Heckenrose Fr.
20. — b. fl. pleno ꝑ. mit gefüllter Blume Fr.
21. carolina L. ꝑ. carolinische Fr.
R. pensylvanica Mich.
22. — b. fl. pleno ꝑ. mit gefüllter Blume Fr.
23. centifolia L. ꝑ. gemeine Gartenrose Fr.
24. — b. albo pleno ꝑ. weissgefüllte Fr.
R. unica Dum. Cours.
R. mutabilis Pers.
25. — c. anglica ꝑ. englische Fr.
26. — d. badensis ꝑ. kleine centifolie von Carlsruhe Fr.
27. — e. bullata ꝑ. grossblättrige Fr.
28. — f. cannabifolia ꝑ. hanfblättrige Fr.
29. — g. hollandica ꝑ. holländische Fr.
30. — h. maxima Roess. ꝑ. grösste Fr.
31. — i. minor ꝑ. kleine Centifolia Fr.
32. — k. pallida ꝑ. blafsrothe Fr.
33. — l. rubicans ꝑ. rothschimmernde Fr.
34. — m. unguiculata Desf. ꝑ. Nelkenrose Fr.
R. caryophyllea Poir.
35. — n. Villmorina H. Par. ꝑ. Willmorin Fr.

Rosa.

Rose.

36. cinnamomea Desf. ꝑ. Zimtrose Fr.
37. collina Jacq. ꝑ. Hügel Fr.
38. corymbosa Bosc. ꝑ. Bouquetrose Fr.
39. damascena Ait ꝑ. damascener Fr.
40. — b. rubra ꝑ. rothe Fr.
41. dijonensis Roess. ꝑ. Dijon-Rose Fr.
42. Eglanteria L. ꝑ. wachsgelbe einfache Rose Fr.
R. lutea W.
R. cera Roess.
43. — b. bicolor Jacq. ꝑ. zweyfarbige (feuergelbe) Fr.
R. punicea Mill.
44. farinosa Bechst. ꝑ. bestäubte Fr.
45. fraxinea W. ꝑ. eschenblättrige Fr.
46. Gallica L. ꝑ. Essig Fr.
47. — b. fulgens ꝑ. glänzendrothe Fr.
48. — c. cinerea ꝑ. aschfarbene Samt- Fr.
49. — d. incarnata ꝑ. incarnatrothe Fr.
50. — e. marmorea ꝑ. marmorirte Fr.
51. — f. maxima ꝑ. größte Fr.
52. — g. micans ꝑ. schimmernde Fr.
53. — i. nigricans ꝑ. schwärzlichrothe Fr.
54. — k. provincialis ꝑ. Provinz-Rose Fr.
55. — l. ranunculoides ꝑ. ranunkelartige Fr.
56. — m. regalis ꝑ. königliche Fr.
57. — n. rubra ꝑ. rothe Fr.
58. — o. versicolor ꝑ. weifs- und rothgestr. Bandr. Fr.
59. gemella W. ꝑ. gepaartblättrige Fr.
60. glaucophylla Ehrh. ꝑ. graublättrige Fr.
61. holosericea Duroi. ꝑ. Samt-Rose Fr.
62. — b. atropurpurea ꝑ. dunkelrothe Fr.
63. — c. semipleno ꝑ. halbgefüllte Fr.
64. indica L. ꝑ. indische Fr.
65. lucida Ehrh. ꝑ. glänzende Fr.
66. moschata Ait. ꝑ. Bisam-Rose Fr.
67. — b. flore pleno ꝑ. mitgefüllten Blumen Fr.
68. multiflora Thunb. ꝑ. vielblumige C. H.
69. — b. purpurea ꝑ. mit purpurrothen Blumen C. H.
70. muscosa Ait. ꝑ. Moos-Rose Fr.
71. — b. fl. albo ꝑ. weisse Fr.
72. — c. fl. simplicibus ꝑ. einfache Fr.
73. — d. parviflora ꝑ. kleinblumige Fr.
74. nivea Dec. ꝑ. dreyblättrige C. H.
R. trifoliata Hortul.

R o s a.

R o s e.

75. Noisettiana Redout. h. Noisettische C. H.
76. pendulina L. h. hängende Fr.
77. pimpinellifolia L. h. pimpinellblättrige Fr.
78. — b. alba h. mit weissen Blumen Fr.
79. — c. major h. mit grossen Blumen Fr.
80. Roxburgi Hort. Angl. h. Roxburgs- C. H.
81. rubiginosa L. h. Wein-Rose Fr.
82. rubrifolia Vill. h. rothblättrige Fr.
83. semperflorens W. h. immerblühende Fr.
 R. chinensis W. Sp. pl.
 R. diversifolia Vent.
 R. benghalensis Pers.
84. — b. alba h. weisse Fr.
85. — c. anemoniflora h. anemonenartige C. H.
86. — d. atropurpurea h. dunkelrothe Fr.
87. — e. centifolia h. hundertblättrige Fr.
88. — f. — b. atropurpurea h. dunkelrothe Fr.
89. — g. florentii h. florentinische C. H.
90. — h. formosa h. prächtige C. H.
91. — i. hybrida h. Bastard Fr.
92. — k. Lawrencea Bot. Magaz. h. Lorenz - Rose
 C. H. et Fr.
93. — l. longifolia h. langblättrige Fr.
94. — m. moschata h. Bisam-Rose Fr.
95. n. odoratissima h. wohlriechende C. H.
 R. thea Hortul.
96. — o. — b. fl. rubro h. mit rother Blume C. H.
97. — p. pistorii h. pistorische C. H.
98. — q. pumila h. niedrige Fr.
99. — r. speciosa h. schöne C. H.
100. — s. tomentosa h. filzige C. H.
101. — t. violacea h. violette C. H.
102. sempervirens L. h. immergrüne Fr.
 R. sylvestris dumetorum Mich.
 R. balearica Desf.
103. sinica Ait. h. sinische C. H.
104. sulphurea Ait. h. gelbgefüllte Fr.
 R. lutea multiplex Duroi.
105. turbinata Ait. h. Tapeten-Rose Fr.
 R. francofurtensis Desf.
106. villosa L. h. Hagebutte Fr.

R o s m a r i n u s. R o s m a r i n.

1. officinalis L. ♀. gemeiner C. H. et Fr.
2. — b. angustifolia ♀. schmalblättriger C. H. et Fr.

R o t h i a. R o t h i e.

1. runcinata Roth. ♂. gezähnte C. H.
Andryala integrifolia L.

R o t t b o e l l i a. R o t t b o e l l i e.

1. incurvata L. ☉. gekrümmte Fr.

R o y e n a. R o y e n e.

1. glabra L. ♀. glatte C. H.
2. hirsuta L. ♀. haarige C. H.
3. latifolia W. ♀. breitblättrige C. H.
4. lucida L. ♀. glänzende C. H.
5. myrtifolia Wendl. ♀. myrtenblättrige C. H.
6. polyandra L. ♀. vielfädige C. H.

R o x b u r g h i a. R o x b u r g h i e.

1. gloriosoides W. ♀. prachtlilienartige w. H.

R u b i a. R o e t h e. (K r a p p)

1. Bocconi W. En. ♀. Bocconische Fr.
2. cordifolia L. 4. herzblättrige Fr.
3. lucida L. ♀. glänzende C. H.
4. tinctorum L. 4. Färber Fr.

R u b u s. H i m b e e r e. (B r o m b e e r e)

1. arcticus L. ♀. nordische Fr.
2. caesius L. ♀. Acker Fr.
3. fruticosus L. ♀. rankende Fr.
4. — b. corylifolius Smith. ♀. haselblättrige Fr.
5. — c. tomentosus W. ♀. filzige Fr.
6. — d. flore pleno ♀. mitgefüllter Blume Fr.
7. hispidus L. ♀. vielstachelige Fr.
8. Idaeus L. ♀. gemeine Fr.
9. — b. fructu albo ♀. weifsfrüchtige Fr.
10. — c. — maximo ♀. grossfrüchtige Fr.
11. laciniatus W. En. ♀. schlitzblättrige Fr.
12. occidentalis L. ♀. schwarze Fr.
13. odoratus L. ♀. wohlriechende Fr.

Rubus. Himbeere. (Brombeere)

14. parviflorus H. Par. kleinblüthige Fr.
15. pinnatus W. h. gefiederte Fr.
16. rosaefolius Smith. rosenblättrige C. H.
17. — b. flore pleno h. mitgefüllter Blume C. H.
18. rugosus Smith. h. rostfarbige w. H. et C. H.
19. saxatilis L. h. Stein-Himbeere Fr.
R. canadensis Pursch.
20. ulmifolius Schott. h. ulmenblättrige Fr.

Rudbeckia. Rudbeckie.

1. amplexifolia Jacq. ☉. stengelumfassende Fr.
R. amplexicaulis Vahl.
2. digitata L. 4. gefingerte Fr.
R. pinnata Mich.
3. fulgida Ait. 4. glänzende Fr.
R. aspera Desf.
4. hirta L. ♂. rauhe Fr.
5. laciniata L. 4. schlitzblättrige Fr.
6. pinnata Vent. 4. gefiederte Fr.
7. purpurea L. 4. purpurfarbene Fr.
8. triloba L. 4. dreylappige Fr.
9. speciosa Schrad. 4. prächtige Fr.

Ruellia. Ruellie.

1. ciliaris Pers. h. wimperige w. H.
2. clandestina L. 4. heimlichblühende w. H.
3. formosa H. et B. h. prächtige w. H.
4. lactea Cav. h. milchweifse w. H.
5. pubescens Pers. 4. weichhaarige w. H.
R. ovata Thunb.
6. strepens L. 4. rauschende Fr.
7. varians Vent. h. veränderliche C. H.
Eranthemum nervosum R. Br.

Ruizia. Ruizie.

1. variabilis W. h. veränderliche w. H.
R. diversifolia Jacq.
2. Sp. nova h. neues Species w. H.

Rumex. Sauerampfer.

1. Acetosa L. 4. gemeiner Fr.
2. — b. latifolia 4. mit breiten Blättern Fr.

Rumex.

Sauerampfer.

3. Acetosella L. 4. kleiner Fr.
4. acutus L. 4. spitzblättriger Fr.
5. alpinus L. 4. Alpen Fr.
6. arifolius L. 4. aronblättriger w. H. et C. H.
R. abyssinicus Jacq.
7. brasiliensis Link. 4. brasilianischer w. H.
8. Brittanica L. 4. virginischer Fr.
9. confertus W. 4. gehäuftblättriger Fr.
10. condylodes M. B. ☉. gelenkichter Fr.
11. cordifolius Hornem. 4. herzblättriger Fr.
12. crispus L. 4. krauser Fr.
13. divaricatus L. ☉. ausgebreiteter Fr.
14. hastaefolius M. B. 4. spiesblättriger Fr.
15. hydrolapathum W. 4. Fluß-Ampfer Fr.
R. aquaticus L.
16. Lunaria L. 4. baumartiger C. H.
17. luxurians L. 4. wuchernder Fr.
18. maritimus L. ☉. Meerstrands Fr.
19. nemorosus Schrad. 4. Hain-Ampfer Fr.
20. Patientia L. 4. Gemüse Fr.
21. purpureus Poir. 4. purpurrother Fr.
22. sanguineus L. 4. blutadriger Fr.
23. — b. exsanguis Schrad. 4. blutrother Fr.
24. scutatus L. 4. schildblättriger Fr.
25. spinosus L. ☉. stachelsaamiger Fr.
26. tingitanus L. 4. stinkender C. H.
27. ucranicus M. B. 4. ukränischer Fr.
28. vesicarius L. ☉. blasenfrüchtiger Fr.

Ruscus.

Mäusedorn.

1. aculeatus L. 4. stechender Fr.
2. androgynus L. 4. rundblüthiger C. H.
3. Hypoglossum L. 4. Zungen Fr.
4. Hypophyllum L. 4. breitblättriger C. H.
5. racemosus L. 4. Trauben C. H. et Fr.

Russelia.

Russelie.

1. multiflora Sims. 4. vielblüthige w. H.

Ruta.

Raute.

1. chalepensis L. 4. aleppische Fr.
2. graveolens L. 4. Gartenraute Fr.
3. montana Ait. 4. Berg C. H.
4. pinnata L. 4. gefiederte C. H.

S.

Sabal. Schirmpalme.

1. minor Pers. 24. kleine w. H.
Chamaerops acaulis Mich.
Corypha minor. Jacq.
— *pumila* Walth.

Sacharum. Zuckerrohr.

- argenteum vid. Andropogon.
1. cylindricum Lam. 24. cylindrisches C. H.
Lagurus cylindricus L.
 2. officinarum L. 24. ächtes w. H.
 3. Ravennae L. 24. Ravenna C. H.
 4. Teneriffae L. 24. Teneriffa C. H.
 5. violaceum Juss. 24. Violettes w. H.

Sagina. Mastkraut.

1. procumbens L. ☉. liegendes Fr.

Sagittaria. Pfeilkraut.

1. lancifolia L. 24. lanzenblättriges C. H.
2. obtusa Mühlenb. 24. stumpfblättriges C. H.
3. sagittifolia L. 24. gemeines Fr.

Sagus. Zapfenpalme.

1. Rumphii W. 25. Rumphische w. H.

Salicornia. Glasschmalz.

1. fruticosa L. 25. strauchartiges C. H.

Salisburia. Salisburie.

1. adiantifolia Smith. 25. krullfarnblättrige Fr.
Ginkgo biloba L.

Salix. Weide.

1. acuminata Smith. 25. Werft Fr.
S. cinerea L.
2. — b. foliis variegatis 25. mit bunten Blättern Fr.
3. acutifolia W. 25. spitzblättrige Fr.

Salix.

Weide.

4. alba L. ꝑ. gemeine Fr.
5. — b. vitellina ꝑ. gelbe Fr.
6. amygdalina L. ꝑ. mandelblättrige Fr.
7. arbuscula L. ꝑ. zweygriffllige Fr.
8. arbutifolia W. ꝑ. sandbeerblättrige Fr.
9. arenaria L. ꝑ. Sand-Weide Fr.
10. argentea Smith. ꝑ. Silber Fr.
11. aurita L. ꝑ. Salbey Fr.
S. aquatica Smith.
S. cinerea Schleich.
12. babylonica L. ꝑ. Trauerweide Fr.
13. bicolor Ehrh. ꝑ. zweyfarbige Fr.
14. candida Flügge ꝑ. weisse Fr.
15. caprea L. ꝑ. Sahl Fr.
16. caroliniana Mich. ꝑ. carolinische Fr.
17. daphnoides Vill. ꝑ. seidelbastartige Fr.
S. praecox Hoppe.
18. Forbyana Smith. ꝑ. Forbyanische Fr.
19. fragilis L. ꝑ. Bruch Fr.
S. amygdalina Thuill.
20. fusca L. ꝑ. braune Fr.
S. arenaria W.
21. grisea W. ꝑ. graublättrige Fr.
22. Helix L. ꝑ. Bach-Weide Fr.
23. herbacea L. ꝑ. krautartige Fr.
24. holosericea W. ꝑ. sammtartige Fr.
25. Lambertiana Smith. ꝑ. lambertianische Fr.
26. Lapponum L. ꝑ. lappländische Fr.
S. sericea Vill.
27. laurina W. ꝑ. lorbeerartige Fr.
28. myrsinites L. ꝑ. myrsinienartige Fr.
29. myrtilloides L. ꝑ. heidelbeerblättrige Fr.
30. pentandra L. ꝑ. Lorbeer Fr.
31. Pontederana W. ꝑ. Pontederische Fr.
32. reticulata L. ꝑ. netzblättrige Fr.
33. riparia W. ꝑ. Ufer-Weide Fr.
S. lavandulaefolia Papeyr.
34. rosmarinifolia L. ꝑ. rosmarinblättrige Fr.
35. rubra Smith. ꝑ. gespaltene Fr.
36. Russeliana Smith. ꝑ. Gerber Fr.
37. serpyllifolia Jacq. ꝑ. quendelblättrige Fr.
38. — b. retusa L. ꝑ. zurückgebogene Fr.
39. spathulata W. ꝑ. spatelblättrige Fr.

Salix.

Weide.

- 40. stylosa Dec. ♀. griffliche Fr.
- 41. triandra L. ♀. dreymännige Fr.
- 42. tristis Ait. ♀. traurige Fr.
- 43. uliginosa W. ♀. Sumpfweide Fr.
- 44. undulata Ehrh. ♀. wellenförmige Fr.
- 45. viminalis L. ♀. Korb-Weide Fr.

Salmia vid. Sansevieria.

Salsola.

Salzkraut.

- altissima vid. Chenopodium.
- 1. baccifera Schrad. ☉. beeriges Fr.
- criophora vid. Kochia.
- 2. ericoides M. B. ♀. heidenkrautartiges C. H.
- S. dendroides Pall.
- 3. fruticosa W. Sp. pl. ♀. strauchartiges C. H. et Fr.
- 4. Kali L. ☉. gemeines Fr.
- 5. Soda L. ☉. langblättriges Fr.
- 6. Tragus L. ☉. glattes Fr.

Salvia.

Salbey.

- 1. abyssinica Jacq. 4. abyssinische Fr.
- 2. Aethiopis L. ☉. ungarische Fr.
- 3. amarissima Orteg. ♀. mexikanische C. H.
- 4. amplexicaulis Lam. 4. stengelumfassende Fr.
- 5. aurea L. ♀. goldfarbene C. H.
- 6. austriaca L. 4. österreichische Fr.
- 7. betonicaefolia W. En. 4. betonienblättrige Fr.
- 8. bicolor Lam. 4. zweyfarbige Fr.
- 9. Boosiana Jacq. ♀. Boosische C. H.
- S. thymiflora W. En.
- S. coerulea Hortul.
- 10. campestris M. B. 4. Feldsalbey Fr.
- 11. canariensis L. ♀. canarische C. H.
- 12. ceratophylla L. 4. schlitzblättrige C. H.
- 13. chamaedryoides Cav. ♀. gamanderblättrige C. H.
- S. chamaedrys W. En.
- 14. clandestina L. ♂. verborgenblüthige C. H.
- 15. coccinea Murr. 4. scharlachrothe C. H.
- 16. cretica L. ♀. cretische Fr.
- 17. formosa Herit. ♀. prächtige C. H.
- S. leonuroides Vahl.
- 18. glutinosa L. 4. klebrige Fr.

Salvia.

Salbey.

19. grandiflora W. En. 4. großblüthige Fr.
S. tomentosa Vahl.
20. haematodes L. 4. röthlichte Fr.
21. hirsuta Jacq. ☉. rauhaarige Fr.
22. hispanica L. ☉. spanische Fr.
23. Horminum L. ☉. Scharlach-Salbey Fr.
24. interrupta Schousb. ♀. unterbrochene C. H.
25. laciniata W. En. 4. geschlitzte C. H.
26. lanceolata Brouss. ☉. lanzettblättrige Fr.
27. leucantha Cav. 4. weißliche Fr.
28. mexicana L. ♀. mexikanische C. H.
29. micrantha Vahl. 4. kleinste C. H.
30. napifolia Ait. 4. rübenblättrige Fr.
31. nemorosa L. 4. Berg-Salbey Fr.
32. nivea Thunb. ♀. Schnee Fr.
33. nutans W. et K. 4. hängende Fr.
S. pendula Besser.
34. odorata W. ♀. wohlriechende C. H.
35. officinalis L. ♀. gemeine Fr.
36. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
37. — c. — maculatis ♀. mit gefleckten Blätt. Fr.
38. — d. latifolius ♀. mit breiten Blättern Fr.
39. paniculata L. ♀. rispenblüthige C. H.
40. pomifera L. ♀. äpfeltragende C. H.
41. pratensis L. 4. Wiesen Fr.
42. reptans Jacq. 4. kriechende C. H.
S. angustifolia Cav.
43. rugosa Thunb. 4. runzlichte Fr.
44. runcinata L. 4. schrotsägenblättrige Fr.
45. scabiosaefolia Lam. 4. scabiosenblättrige Fr.
S. Habliziana W.
46. Sclarea L. ♂. Muscateller Fr.
47. Spielmanni Scop. ☉. Spielmann's Fr.
48. Splendens H. Nymph. ♀. glänzende w. H.
49. Tenorii Spr. 4. Tenorische C. H.
50. triloba L. ♀. dreylappige Fr.
51. urticaefolia L. 4. nesselblättrige Fr.
52. valentina Vahl. 4. valentinische Fr.
53. verticillata L. 4. quirlförmige Fr.
54. virgata Ait. 4. langästige Fr.
55. viscosa Jacq. 4. klebrige Fr.

Sambucus. Hollunder.

1. canadensis L. ♀. canadischer Fr.
2. Ebulus L. 4. Zwerg Fr.
3. nigra L. ♀. gemeiner Fr.
4. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
5. — c. fructibus albis ♀. mit weissen Beeren Fr.
6. — d. fructib. viridib. ♀. mit grünen Beeren Fr.
7. — e. laciniatis ♀. mit geschlitzten Blättern Fr.
8. — f. monstrosa ♀. ungestalteter Fr.
9. pubens Pursch. ♀. weichhaariger Fr.
10. racemosa L. ♀. Trauben Fr.

Samolus. Pungen.

1. campanuloides R. Br. 4. Strand C. H.
2. Valerandi L. ♂. Salz C. H.

Sanguinaria. Sanguinarie.

1. canadensis L. 4. canadische Fr.

Sanguisorba. Wiesenknopf.

1. canadensis L. 4. weisblühender Fr.
2. officinalis L. 4. gemeiner Fr.
3. tenuifolia Fisch. 4. feinblättriger Fr.

Sanicula. Sanikel.

1. europaea L. 4. gemeiner Fr.
2. marylandica L. 4. marylandischer Fr.

Sansevieria. Sanseviere.

1. carnea W. 4. fleischrothe w. H.
2. grandicuspis Haw. 4. spitzblättrige w. H.
3. guineensis W. 4. guineensische w. H.
Aletris guineensis Jacq.
4. pumila Haw. 4. niedrige w. H.
5. stenophylla Hort. Berol. 4. schmalblättrige w. H.
6. zeylanica W. 4. zeylonische w. H.
Salmia spicata Cav.

Santolina. Heiligenpflanze.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
2. Chamaecyparissus L. ♀. cypressenartige Fr.
3. eriosperma Desf. ♀. wollsaamige Fr.

Santolina. Heiligenpflanze.

4. maritima Smith. W. En. Supl. ☿. mittägliche C. H.
Diotis candidissima Desf.
— *maritima* Poir.
Athanasia maritima L.
Otanthus maritimus Link.
5. squarrosa L. ☿. sparrigblättrige C. H. et Fr.
6. viridis W. En. ☿. grüne Fr.

Sanvitalia. Sanvitalie.

1. procumbens W. ☉. liegende Fr.

Sapindus. Seifenbaum.

1. indicus Poir. ☿. indischer C. H.
2. marginatus W. En. ☿. gemeiner C. H.
S. saponaria Mich.

Sapium. Sapium.

1. aucuparium Jacq. ☿. zweydrüsiges w. H.
Hippomane biglandulosa L.

Saponaria. Seifenkraut.

1. ocymoides L. 4. rundblättriges C. H.
2. officinalis L. 4. gemeines Fr.
3. — b. fl. pleno 4. mit gefüllter Blume Fr.
4. orientalis L. ☉. morgenländisches Fr.
5. porrigens L. ☉. weitästiges Fr.
Silene porrigens Gouan.
6. Vaccaria L. ☉. Acker Fr.

Saracha. Sarache.

1. procumbens W. En. 4. niederliegende Fr.
Atropa plicata Roth.
Bellinia procumbens R. S.
2. umbellata W. En. 4. doldenblüthige C. H.
Atropa umbellata Jacq.

Saragota. Saragote.

1. glabra H. Cels. ☿. glatte w. H.

Sarracenia. Sarracenie.

1. purpurea W. 4. purpurrothe C. H.

Satureja. Pfefferkraut.

1. hortensis L. ☉. gemeines Fr.
2. juliana L. ☿. julianisches C. H.
3. montana L. ☿. Berg Fr.
4. Thymbra L. ☿. canadisches C. H.

Saururus. Eydenschwanz.

1. cernuus L. ♀. hängender Fr.
2. lucidus Donn. ♀. glänzender C. H.

Sauvagesia. Sauvagesie.

1. scandens H. Cels. ☿. kletternde w. H.

Saxifraga. Steinbrech.

1. adscendens W. ♀. aufwärtssteigender Fr.
2. Aizoon Jacq. ♀. Traubenblüthiger Fr.
3. — b. intacta W. ♀. unberührter Fr.
4. ambigua Dec. ♀. zweifelhafter Fr.
5. aretioides Lapeyr. ♀. aretischer Fr.
6. aspera L. ♀. scharfer Fr.
7. bryoides L. ♀. moosartiger Fr.
8. burseriana L. ♀. burserscher Fr.
9. caespitosa Wahlb. ♀. rasenbildender Fr.
S. muscoides Wulf.
10. cordifolia Haw. ♀. herzblättriger Fr.
11. crassifolia L. ♀. dickblättriger Fr.
12. crustata Vest. ♀. rindenartiger Fr.
13. cuneifolia L. ♀. keilblättriger Fr.
14. cuscuteformis Loddig. ♀. Flachsseidenartiger Fr.
15. decipiens Ehrh. ♀. täuschender Fr.
16. denticata Haw. ♀. gezahnter Fr.
17. erosa Pursch. et H. Berol. ♀. ausgebissener Fr.
18. fragilis Sieb. ♀. zerbrechlicher Fr.
19. geranioides L. ♀. storchschnabelartiger Fr.
20. Geum L. ♀. nierenblättriger Fr.
21. granulata L. ♀. körniger Fr.
22. — b. fl. pleno ♀. mit gefüllter Blume Fr.
23. groenlandica Lapeyr. ♀. grönländischer Fr.
24. hieracifolia W. et K. ♀. habichtkrautblättriger Fr.
25. Hirculus L. ♀. cistenblüthiger Fr.
26. hirsuta L. ♀. haarigstieliger Fr.
27. hybrida Vill. ♀. Bastard Fr.
28. hypnoides L. ♀. liegender Fr.

Saxifraga.

Steinbrech.

29. irrigua M. B. 4. naßliebender Fr.
30. leucanthemifolia Mich. 4. wucherblumenblättriger Fr.
31. longifolia Lapeyr. 4. langblättriger Fr.
32. moschata Wulf. 4. bisamriechender Fr.
33. muscoides Jacq. 4. lebermoosartiger Fr.
34. oppositifolia L. 4. paarblättriger Fr.
35. paniculata Mill. 4. rispenblüthiger Fr.
36. pedatifida Ait. 4. gefuster Fr.
37. pensylvanica W. 4. pensylvanischer Fr.
38. platypetala Smith. 4. vielblumenblättriger Fr.
39. punctata L. 4. punctirter Fr.
40. pyramidalis Lapeyr. 4. pyramidenförmiger Fr.
- S. Cotyledon Ait.*
- S. multiflora Dodart.*
41. rotundifolia L. 4. rundblättriger Fr.
42. sarmentosa L. 4. rankender Fr.
- Diptera sarmentosa Borckh.*
43. Schraderiana H. Gött. 4. schraderischer Fr.
44. Sequieri Spr. 4. Sequierischer Fr.
45. serrata H. Berol. 4. sägeblättriger Fr.
46. spathulata Desf. 4. spathelblättriger Fr.
47. sponhemica Gmel. fl. bad. 4. sponhemischer Fr.
- S. Sternbergii W.*
48. stellaris L. 4. sternförmiger Fr.
49. tridactylites L. ☉. dreytheiliger Fr.
50. trifurcata Schrad. 4. dreyzackiger Fr.
51. umbrosa L. 4. schattenliebender Fr.
52. virginensis Michaux 4. virginischer Fr.

Scabiosa.

Scabiose.

1. alpina L. 4. Alpen Fr.
- Cephalaria alpina S. et R.*
2. altissima Jacq. 5. höchste C. H.
- S. africana Murr.*
3. amoena Jacq. 4. angenehme Fr.
4. arenaria Forsk. 4. sandliebende Fr.
5. argentea L. 5. silberfarbene C. H.
6. atropurpurea L. ☉. schwarzpurpurrothe Fr.
7. australis Wulf. 4. südliche Fr.
8. banatica W. et K. ♂. banatische Fr.
9. canescens W. et K. 4. weißlichgraue Fr.
10. caucasica M. B. 4. caucasische Fr.
- Sclerostemma caucasicum Schott.*

Scabiosa.

Scabiose.

11. columbaria L. 4. Tauben Fr.
Sclerostemma columbaria Schott.
12. corniculata W. et K. 4. gehörnte Fr.
Cephalaria corniculata S. et R.
13. cretica L. 5. cretische C. H.
14. daucoides Desf. 4. carottenblättrige Fr.
15. dichotoma W. ☉. gabelästige Fr.
S. parviflora Desf.
16. dipsacifolia Schott. 4. kartenblättrige Fr.
Trichera pubescens W. et K.
17. glabrata Schott. 4. glatte Fr.
18. graminifolia L. 4. grasblättrige Fr.
19. gramuntia L. 4. feinblättrige Fr.
20. grandiflora Scop. 4. großblumige Fr.
21. hybrida All. 4. Bastard Fr.
22. integrifolia L. ☉. ganzblättrige Fr.
Trichera integrifol. R. S.
23. laciniata Lichtst. 4. zerschlitztblättrige Fr.
24. laevigata W. et K. 4. glattblättrige Fr.
Cephalaria centauroides Lam.
25. leucantha L. 4. weißblüthige Fr.
Cephalaria leucantha Lagas.
26. maritima L. ☉. Meerstrands Fr.
27. mollis W. En. 4. weichblättrige Fr.
28. ochroleuca L. 4. weißgelbe Fr.
29. palaestina L. 4. orientalische Fr.
30. papposa L. ☉. gekrönte Fr.
Trichera papposa S. R.
31. prolifera L. ☉. sprossende Fr.
32. rigida L. 5. steife Fr.
33. stellata L. ☉. sternförmige Fr.
34. succisa L. 4. Sumpf Fr.
35. tatarica W. 4. tatarische Fr.
S. gigantea Ledeb.
36. ucranica W. 4. ucranische Fr.

Scaevola.

Scaevola.

1. Plumieri L. 5. Plumierische C. H.
Lobelia frutescens Mill.

Scandix.

Kerbcl.

1. australis L. ☉. südlicher Fr.

Scandix. Kerbel.

2. Cerefolium W. Sp. pl. ☉. gemeiner Fr.
3. nodosa L. ☉. gegliederter Fr.
odorata vid. Myrrhis.
4. Pecten L. ☉. langsaamiger Fr.
5. pinnatifida Spr. ☉. halbgefiederter Fr.
Chaerophyllum sativum Spr.

Schinus. Mastixbaum.

1. Molle L. ☿. peruvianischer C. H.

Schisandra. Spaltbeutel.

1. coccinea Mich. ☿. scharlachfarbener C. H.

Schismus vid. Festuca.

Schkuhria. Schkuhrie.

1. abrotanoides Roth. ☉. stabwurzartige Fr.
Pectis pinnata Lam.

Schoenus. Knopfgras.

1. compressus L. ♀. zusammengedrücktes Fr.

Schotia. Schotie.

1. latifolia Jacq. ☿. breitblättrige C. H.
2. speciosa Jacq. ☿. prächtige C. H.
3. stipulata Ait. ☿. afterblättrige C. H.

Schrankia. Schrankie.

1. aculeata W. ☿. stachlige w. H.

Scilla. Meerzwiebel.

1. amoena L. ♀. schöne Fr.
2. amoenula Hornem. ♀. nette Fr.
3. autumnalis L. ♀. Herbst Fr.
4. bifolia L. ♀. zweyblättrige Fr.
5. campanulata W. ♀. glockenblüthige Fr.
S. hyacinthoides Jacq.
6. hyacinthoides L. ♀. hyacinthenartige Fr.
7. italica L. ♀. italienische Fr.

Scilla. Meerzwiebel.

8. Lilio-Hyacinthus L. 4. lilienartige Fr.
9. maritima L. 4. gemeine C. H.
10. peruviana L. 4. peruvianische C. H.
11. — fl. albo 4. mit weißer Blume C. H.

Scirpus. Binse.

1. atrovirens W. 4. schwarzgrüne Fr.
2. Holoschoenus L. 4. knopfgrasartige Fr.
Isolepis Holoschoenus S. et R.
3. lacustris L. 4. See-Binse Fr.
4. palustris L. 4. Sumpf Fr.
5. radicans Schkuhr. 4. wurzelnde Fr.
6. sylvaticus L. 4. Wald Fr.
7. triqueter L. 4. dreykantige Fr.

Scleranthus. Grasknöterich.

1. annuus L. ☉. jähriger Fr.
2. perennis L. 4. daurender Fr.

Sclerocarpus. Hartsaame.

1. africanus Jacq. ☉. afrikanischer Fr.

Sclerochloa vid. Poa.

Scolymus. Golddistel.

1. grandiflorus Desf. 4. großblumige Fr.
2. hispanicus L. 4. spanische Fr.

Scoparia. Besenpflanze.

1. dulcis L. ☉. süsse Fr.

Scorpiurus. Scorbionkraut.

1. subvillosa L. ☉. filziges Fr.
2. sulcata L. ☉. gefurchtes Fr.
3. vermiculata L. ☉. wurmförmiges Fr.

Scopolia. Scopolie.

1. aculeata Smith. †. stachelige C. H.
Toddalia aculeata Lam.

Scolopendrium. **Hirschzunge.**

1. officinarum Sw. 24. gemeine Fr.
2. — b. crispum 24. krausblättrige Fr.
3. — c. multifidum 24. gefiederte Fr.
4. — d. undulatum 24. wellenblättrige Fr.
5. — e. — angustifolium 24. schmale wellenblättrige Fr.

Scorzonera. **Scorzonerre.** (Haberwurz)

1. angustifolia L. 24. schmalblättrige Fr.
2. eriosperma M. B. 24. wollensaamige Fr.
3. hispanica L. 24. spanische Fr.
4. humilis L. 24. niedrige Fr.
5. laciniata L. ♂. zerschlitzte Fr.
Podospermum laciniatum Dec.
6. muricata Balb. 24. weichstachelige Fr.
7. octangularis W. Sp. pl. ♂. achteckige Fr.
Podospermum octangulare Dec.
8. parviflora Jacq. 24. kleinblüthige Fr.
9. purpurea L. 24. purpurfarbige Fr.
10. resedaefolia L. 24. resedablättrige Fr.
11. undulata Desf. 24. wellenblättrige Fr.

Scrophularia. **Braunwurz.**

1. aquatica L. ♂. Wasser Fr.
2. Balbisii W. 24. Balbisische Fr.
3. betonicaefolia L. 24. betonienblättrige Fr.
4. biserrata W. En. 24. doppeltgesägte Fr.
5. canina L. ☉. Hunds Fr.
6. hirsuta Schott. 24. rauhe Fr.
7. hispida Desf. 24. haarige Fr.
8. glabrata Ait. ♂. glatte Fr.
9. lyrata W. 24. leyerblättrige Fr.
S. ebulifolia Link.
10. orientalis L. 24. morgenländische Fr.
11. rugosa W. En. 24. runzlige Fr.
12. sambucifolia L. 24. hollunderblättrige Fr.
13. Scopolii Hoppe 24. Scopolische Fr.
S. glandulosa W. et K.
14. Scorodonia L. 24. melissenblättrige Fr.
15. vernalis L. ♂. Frühlings Fr.

Scutellaria. **Helmkraut.**

1. albida L. 24. weißliches Fr.

Scutellaria. Helmkraut.

2. alpina L. 4. Alpen Fr.
3. altaica Fisch. 4. altaisches Fr.
4. altissima L. 4. höchstes Fr.
5. Columnae L. 4. Columnäisches Fr.
6. galericulata L. 4. gemeines Fr.
7. grandiflora Sims. 4. großblumiges Fr.
8. hastifolia L. 4. spontonblättriges Fr.
9. lateriflora L. 4. seitenblüthiges Fr.
10. lupulina L. 4. hopfenartiges Fr.
11. orientalis L. 4. orientalisches Fr.
12. peregrina L. 4. fremdes Fr.
13. rubicunda W. En. 4. röthliches Fr.

Secale. Roggen oder Korn.

1. cereale L. ♂. gemeiner Fr.
2. villosum L. ♂. filziger Fr.

Securinea. Axtspott.

1. Comersoni H. Cels. ♀. Comersons w. H.
2. nitida W. ♀. glänzender w. H.

Sedum. Hauslaub.

1. acre L. 4. Mauer-Pfeffer Fr.
2. album L. 4. weißes Tripmadam Fr.
3. Anacampseros L. 4. weißes Wundkraut Fr.
S. sempervirens Haw.
4. altissimum Poir. 4. hohes Fr.
S. ochroleucum Smith.
5. cristatum Schrad. 4. kammartiges Fr.
6. dasyphyllum L. 4. bereiftes Fr.
7. Forsterianum Smith. 4. Forsterianisches Fr.
8. glaucum W. et K. ☉. graugrünes Fr.
9. hybridum L. 4. Bastard Fr.
10. monregalense Balb. 4. piemontesisches Fr.
S. cruciatum Desf.
11. populifolium L. ♀. pappelblättriges Fr.
12. reflexum L. 4. Garten-Tripmadam Fr.
S. recurvatum W.
13. rupestre W. 4. Felsen Fr.
14. saxatile All. 4. steinliebendes Fr.
15. sexangulare L. 4. sechseckiges Fr.
16. sexfidum W. ☉. sechsspaltiges Fr.

Sedum. Hauslaub.

17. spathulatum W. et K. ♂. spathelförmiges Fr.
18. spinosum W. ♀. dorniges C. H.
Sempervivum cuspidatum Haw.
19. stellatum Haw. ⊙. sternförmiges Fr.
20. Telephium L. 4. knolliges Fr.
21. villosum L. ⊙. haariges Fr.
22. virescens W. En. 4. gelbgrünes Fr.

Selago. Selago.

1. corymbosa L. ♀. doldentraubige C. H.
2. fasciculata L. ♀. büschelblühende C. H.
3. ovata Thunb. ♀. eyförmige C. H.
4. spuria L. ♂. unächte C. H.

Selinum. Silge.

1. austriacum Jacq. 4. österreichische Fr.
2. Chabraei Jacq. 4. langscheidige Fr.
3. decipiens Schrad. ♀. strauchartige C. H.
4. nigricans Fisch. 4. schwärzliche Fr.
Oreoselinum nigricans Hoffm.
5. palustre L. 4. sumpfliebende Fr.
6. peucedanoides Spr. 4. haarstrangartige Fr.
7. polymorphum Spr. 4. haarstrangartige Fr.
8. rablensis Spr. 4. kärnthensche Fr.
9. Sequieri L. 4. sequierische Fr.
Imperatoria sequieri Spr.

Scilloa. Selloc.

1. glutinosa Spr. ♀. klebrige C. H.

Sempervivum. Hauswurz.

1. arachnoideum L. ♀. spinnewebenartige Fr.
2. arboreum L. ♀. baumartige C. H.
3. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern C. H.
4. — c. foliis atropurpureis ♀. mit schwarzgr. Bl. C. H.
5. aureum Smidt. ♀. goldgelbe C. H.
S. calyciforme Haw.
6. barbatum Buchan. ♀. bartige C. H.
7. caespitosum Smidt. ♀. rasenbildende C. H.
8. canariense L. ♀. canarische C. H.
9. ciliare Haw. ♀. gefranzte C. H.

Sempervivum. Hauswurz.

10. flagelliferum Haw. †. ruthenförmige C. H.
11. foliosum Smidt. †. beblätterte C. H.
S. Schmidtii Haw.
12. globiferum W. †. kugelknospige Fr.
S. soboliferum Bot. Magaz.
13. glutinosum Haw. †. klebrige C. H.
14. hybridum Haw. †. Bastard C. H.
15. lincolare H. Dyk. †..... C. H.
16. monanthos W. 4. einblüthige Fr.
17. montanum L. 4. Berg-Hauswurz Fr.
18. tabulaeforme Haw. †. tafelförmige C. H.
19. tectorum L. 4. gemeine Fr.
20. tortuosum Ait. †. gedrehte C. H.

Seneciera. Senebiere.

1. Coronopus Poir. ⊙. schlitzblättrige Fr.
Coehlearia Coronopus L.
2. didyma W. En. ⊙. doppelte Fr.

Senecio. Kreuzkraut.

1. abrotanifolius Jacq. 4. stabwurzblättriges Fr.
2. aquaticus Smith. 4. Wasser Fr.
3. arabicus L. ⊙. arabisches Fr.
4. artemisiaefolius Pers. 4. wermuthblättriges Fr.
5. aureus L. 4. goldfarbenes Fr.
6. cernuus L. ⊙. hängendes Fr.
7. chrysanthemifolius Poir. ⊙. wucherblumenartig. Fr.
8. cordifolius L. 4. herzblättriges Fr.
9. coriaceus Ait. 4. lederblättriges Fr.
10. dendatus Jacq. ⊙. gezähntes Fr.
11. Doria L. 4. hohes Fr.
12. elegans L. ⊙. schönes Fr.
- 13.—b. flor. plen. carneo ⊙. m. fleischfarb. gefüllt. Bl. C. H.
- 14.—c. — — rubro ⊙. mit rothgefüllt. Blum. C. H.
15. erucaefolius L. 4. senfblättriges Fr.
16. glomeratus Desf. ♂. knaulförmiges Fr.
17. halimifolius L. †. meldenblättriges C. H.
18. haematophyllus W. †. blutblättriges C. H.
S. discolor Desf.
19. hieracifolius L. ⊙. habichtkrautblättriges Fr.
20. Jacobaea L. 4. Jacobs Fr.
21. illicifolius W. †. hülsenblättriges C. H.

Senecio. Kreuzkraut.

22. lividus L. ☉. bleifarbenes Fr.
23. longifolius L. ☿. langblättriges C. H.
24. nemorensis L. ♀. Hain Fr.
25. ovatus W. ♀. eyförmiges Fr.
S. saracenicus Pall.
26. — b. Fuchsii Gmel. fl. bad. ♀. Fuchsisches Fr.
27. paludosus L. ♀. Sumpf Fr.
28. purpureus L. ♀. purpurrothes Fr.
29. rigidus L. ☿. steifes C. H.
30. saracenicus L. ♀. heidnisches Fr.
31. sylvaticus L. ☉. Wald-Kreuzkraut Fr.
32. tenuifolius Smith. ♀. dünnblättriges Fr.
33. triflorus L. ☉. dreyblumiges Fr.
34. umbrosus W. et K. ♀. schattenliebendes Fr.
35. vernalis W. et K. ☉. Frühlings-Kreuzkraut Fr.
36. viscosus L. ☉. klebriges Fr.
37. vulgaris L. ☉. gemeines Fr.

Septas. Siebenling.

1. capensis L. ☿. capischer C. H.
2. globiflora Haw. ☿. kugelblüthiger C. H.

Serapias vid. Epipactis.

Seriana. Seriane.

1. angustifolia W. ☿. schmalblättrige w. H.
Paulinia mexicana Jacq.
2. caracassana Pers. ☿. weitzähnige w. H.
Paulinia caracassana Jacq.

Seriola. Nesselsalat.

1. aethnensis L. ☉. italienischer Fr.
2. urens L. ☉. brennender Fr.

Serissa. Serisse.

1. foetida W. ☿. stinkende C. H.
Buchozia caprosmoides Herit.
Lycium japonicum Thunb.
2. — b. fl. pleno ☿. mit gefüllten Blumen C. H.

Serratula. Scharte.

1. alata W. ♀. geflügelte Fr.

Serratula. **Scharte.**

2. centauroides L. 24. flockenblumenartige Fr.
3. coronata L. 24. gekrönte Fr.
4. heterophylla Desf. 24. verschiedenblättrige Fr.
5. pinnatifida Desf. 24. halbgefiederte Fr.
Carduus radiatus W. et Kit.
praealta vid. *Vernonia*.
6. quinquefolia M. B. 24. fünfblättrige Fr.
7. radiata M. B. strahlende Fr.
8. tinctoria L. 24. Färber-Scharte Fr.

Sesbania. **Sesbanie.**

1. aegyptiaca Ait. ☉. ägyptische w. H.
Aeschynomene Sesban. L.

Seseli. **Sesel.**

1. annuum L. Spr. ☉. jähriger Fr.
2. crassifolium Schrad. 24. dickblättriger Fr.
3. glaucum L. 24. grauer Bergfenchel Fr.
4. gracile W. et K. 24. schlanker Fr.
5. Hippomarathrum L. 24. Pferde Fr.
6. montanum L. 24. Berg Fr.
S. multicaule Jacq.
7. Pallasii Besser 24. Pallasischer Fr.
petraeum vid. *Bubon*.
8. rigidum W. et K. 24. steifer Fr.
9. venosum Hoffm. 24. aderiger Fr.

Sesleria. **Kammgras.**

1. alba Sieb. et Sm. 24. weißes Fr.
2. elongata Host. 24. langes Fr.

Sesuvium. **Sesuvium.**

1. Portulacastrum L. 24. portulakartiges C. H.

Setaria. **Borstengras.**

1. setosa Sw. ☉. gemeines Fr.
2. verticillata L. ☉. quirlförmiges Fr.

Sibthorpia. **Sibthorpie.**

1. europaea L. 24. europäische C. H.

Sicyos.

Haargurke.

1. angulata L. ☉. eckige Fr.

Sida.

Sida.

1. abutilon L. ☉. gemeine w. H.
2. alnifolia L. ☉. erlenblättrige w. H.
3. americana L. ☉. amerikanische Fr.
4. angustifolia Cav. ☿. schmalblättrige w. H.
5. carpinifolia L. ☿. haynbuchenblättrige w. H.
6. cordifolia L. ☉. herzblättrige Fr.
7. Dilleniana W. ☉. Dillenianische Fr.
Anodo Dilleniana Cav.
8. gigantea Jacq. ☿. Riesen w. H.
9. glauca Cav. ☿. graue w. H.
10. hastata W. ☉. spontonblättrige Fr.
Anoda hastata Cav.
11. hernandioides Cav. ☿. hernandienblättrige w. H.
12. hirta Cav. ☉. langhaarige Fr.
13. jatrophioides Herit. ☉. brechnufsblättrige w. H.
14. indica L. ☉. indische w. H.
15. mauritiana Herit. ☉. flachblüthige Fr.
16. mollissima W. ☿. weichste w. H.
17. occidentalis L. ☉. westindische Fr.
18. parviflora Pers. ☉. kleinblüthige Fr.
Anoda parviflora Cav.
19. rhombifolia L. ☿. rautenförmige w. H.
20. scoparia Lour. ☿. pfriemenförmige w. H.
21. spinosa L. ☉. stachlige Fr.
22. tiliaefolia W. ☉. lindenblättrige Fr.
23. triloba Thunb. ☿. dreylappige w. H.
24. ulmifolia Cav. ☉. rüsterblättrige Fr.
25. umbellata L. ☉. doldenblüthige Fr.
26. vesicaria Cav. ☿. aufgeblasene w. H.
27. virgata Cav. ☿. ruthenförmige w. H.

Sideritis.

Gliedkraut.

1. canariensis L. ☿. canarisches C. H.
2. candicans L. ☿. weißliches C. H.
3. cretica L. ☿. cretisches C. H.
4. hirsuta L. ♀. haariges Fr.
5. hyssopifolia L. ♀. isopblättriges Fr.
6. romana L. ♂. römisches Fr.
7. scordioides L. ♀. gezähntes Fr.

Sideritis. Gliedkraut.

8. — b. hirsuta Lam. 24. rauhes Fr.
S. alpina Pers.
9. syriaca L. 7. syrisches Fr.
10. taurica W. 24. taurisches Fr.

Sideroxylon. Eisenholz.

1. inerme L. 7. dornenloses C. H.
S. atrovirens Lam.
Roemeria inermis Thunb.
2. melanophleum Jacq. 7. schwarzrindiges C. H.
Scleroxylon melanophleum W.
3. mite L. 7. wehrloses C. H.
Manglilla milleriana Pers.
Scleroxylon mite W.
4. spinosum L. 7. stachliges C. H.
Argania spinosa S. et R.
Eleodendron Argan Retz.

Sigesbeckia. Sigesbeckie.

1. flosculosa Herit. ☉. dreyfädige Fr.
2. orientalis L. ☉. orientalische Fr.

Silene. Leimkraut.

1. acaulis L. 24. stielloses Fr.
2. aegyptiaca L. ☉. ägyptisches Fr.
3. alpestris Jacq. 24. Alpen Fr.
Lychnis alpestris Link.
4. amoena L. 24. angenehmes Fr.
5. anglica L. ☉. englisches Fr.
6. apetala L. ☉. blumenblattloses Fr.
7. Armeria L. ☉. Garten Fr.
8. asperata Desf. ☉. scharfhaariges Fr.
9. bellidifolia Jacq. ☉. maßliebenblättriges Fr.
10. bifida Retz. ☉. zweyspaltiges Fr.
11. cerastoides L. ☉. hornkrautartiges Fr.
12. chloraefolia Smith. 7. chlorablättriges Fr.
13. chlorantha Ehrh. 24. grünes Fr.
14. clandestina Jacq. ☉. heimlichblühendes Fr.
15. conoidea L. ☉. halbkegelförmiges Fr.
16. crassifolia L. ♂. dickblättriges Fr.
17. cretica L. ☉. cretisches Fr.
18. decumbens Hornem. ☉. niederliegendes Fr.

Silene.

Leimkraut.

19. dichotoma Ehrh. ♂. gabelförmiges Fr.
20. Eranthema Wibl. ⊙. Menderles Fr.
21. flavescens W. et K. 4. gelbliches Fr.
22. fruticosa L. †. strauchartiges C. H.
23. geminiflora W. ⊙. zweyblüthiges Fr.
24. gigantea L. ♂. hohes C. H.
25. hispida Desf. ⊙. haariges Fr.
26. imbricata Desf. ⊙. dachziegelförmiges Fr.
27. inclusa Vahl. ⊙. verschlossenes Fr.
28. infracta W. et K. 4. eingeknicktes Fr.
29. italica Pers. 4. italienisches Fr.

Cucubalus italicus L.

30. livida W. En. 4. bläulichgraues Fr.
31. longicaulis Hort. Madr. ⊙. langstenglige Fr.
32. longiflora W. et K. 4. langblüthiges Fr.
33. maritima W. 4. Meerstrands Fr.
34. micropetala Dec. ⊙. kleinblumenblättriges Fr.
35. multiflora Pers. ♂. vielblumiges Fr.
36. mutabilis L. ⊙. veränderliches Fr.
37. noctiflora L. ⊙. nachtblüthiges Fr.
38. nocturna L. ⊙. nächtliches Fr.
39. nyctantha W. En. ⊙. nachtblüthiges Fr.
40. orchidea Ait. ⊙. ragwurzblüthiges Fr.
41. ornata Ait. ♂. dunkelfarbiges C. H.
42. paradoxa L. 4. sonderbares Fr.
43. patula Desf. 4. abstehendes Fr.
44. pendula L. ⊙. hängendes Fr.
45. Personii Schott. ⊙. Persons Fr.
46. petraea W. et K. ⊙. Felsen Fr.
47. picta Dec. 4. gemahltes Fr.
48. procumbens W. En. 4. liegendes Fr.
49. pusilla W. et K. 4. kleines Fr.

Lychnis pussilla Link.

50. quinquevulnera L. ⊙. fünffleckiges Fr.
51. rubella L. ⊙. röthliches Fr.
52. Saxifraga L. 4. steinbrechartiges Fr.
53. spergulaefolia Schott. ⊙. sparakblättriges Fr.
54. supina M. B. 4. niederliegendes Fr.
55. vespertina Retz. ⊙. abendblühendes Fr.
56. viridiflora L. ♂. grünblüthiges Fr.

Siler.

Siler.

1. aquilegifolium Spr. 4. akeleyblättrige Fr.

Laserpitium aquilegifolium L.

Silphium.

Silphie.

1. conjunctum W. 4. verbundene Fr.
2. connatum L. 4. verwachsene Fr.
3. laciniatum L. 4. schlitzblättrige Fr.
4. perfoliatum L. 4. durchwachsene Fr.
5. terebinthinaceum L. 4. terpentinartige Fr.
6. ternatum Retz. 4. gedreyte Fr.
7. trifoliatum L. 4. dreylappige Fr.

Sinapis.

Senf.

1. alba L. ☉. weißer Fr.
2. Allioni Jacq. ☉. allionischer Fr.
3. chelidonifolia Mart. ☉. schöllkrautblättriger Fr.
4. eruroides L. ☉. raukenartiger Fr.
5. foliosa L. ☉. beblätterter Fr.
6. hispida W. ☉. scharfblättriger Fr.
7. juncea L. ☉. binsenartiger Fr.
8. laevigata L. ♂. glatter Fr.
9. nigra L. ☉. schwarzer Fr.
10. pubescens L. ♀. behaarter Fr.

Sison.

Sison.

1. Amomum L. ♂. bibernellblättriges Fr.
Sium aromaticum Lam.
2. Anisum Spr. ☉. Anis Fr.
Pimpinella Anisum L.
Tragium Anisum Link.
3. trifoliatum W. En. 4. dreyblättriges Fr.

Sisymbrium.

Rauke.

1. asperum L. ☉. scharffrüchtige Fr.
2. bursifolium L. ☉. täschelkrautartige Fr.
Hesperis dentata Spr.
3. Columnae Jacq. ☉. Columnasche Fr.
4. contortum Desf. ☉. gedrehte Fr.
5. eckartsbergense W. ☉. eckartsbergensische Fr.
6. erysimoides W. ☉. hedrichartige Fr.
7. fugax Lagasc. ♂. abfallende Fr.
8. gallicum W. ☉. französische Fr.
9. glabrum W. ☉. glatte Fr.
10. Irio L. ☉. langblättrige Fr.
11. Loeselii L. ☉. Lösels Fr.
12. millefolium Ait. ♀. schaaufarbenblättr. C. H.
Sinapis millefolia Jacq.

Sisymbrium. **Rauke.**

13. monense L. ♂. monasche Fr.
14. murale L. ⊙. Mauer Fr.
Diplotaxis muralis Dec.
15. Nasturtium L. ♀. Brunnenkresse Fr.
16. nitidum Dec. ⊙. glänzende Fr.
17. pannonicum Ait. ⊙. ungarische Fr.
18. pyrenaicum L. ⊙. pyrenäische Fr.
19. Sophia L. ⊙. feinblättrige Fr.
20. supinum L. ⊙. niedrige Fr.
21. tenuifolium L. ♀. dünnblättrige Fr.
Diplotaxis tenuifolia Dec.
22. Tillieria Bell. ♂. Tillierische Fr.

Sisyrinchium. **Schweinerüssel.**

1. anceps L. ♀. flügelstenglicher C. H.
S. angustifolium Mill.
2. Bermudiana L. ♀. bermudischer C. H.
S. iridioides Curt.
3. convolutum V. En. ♂. zusammengerollter C. H.
4. iridifolium H. et B. ♀. schwertelblättriger C. H.
5. laxum H. Berol. ♀. schlaffer C. H.
6. micranthum Cav. ♀. kleinblumiger C. H.
7. striatum Smith. ♀. gestreifter C. H.
S. reticulatum Cav.
8. tenuifolium H. et B. ♀. feinblättriger C. H.
S. graminifolium H. Par.

Sium. **Merk.**

1. Falcaria L. ♀. sichelblättriger Fr.
2. latifolium L. ♀. breitblättriger Fr.
3. peucedanoides Spr. ♀. haarstrangartiger Fr.
4. repens L. ♀. kriechender Fr.
4. siculum L. ♀. sicilianischer Fr.
5. Sisarum L. ♀. Zuckerwurzel Fr.
6. verticillatum Lam. ♀. quirlförmiger Fr.

Smilax. **Smilax.**

1. aspera L. ♂. stachelblättriger Fr.
2. excelsa L. ♂. hoher Fr.
3. herbacea L. ♀. krautartiger Fr.
4. laurifolia L. ♂. lorbeerblättriger C. H.

Smilax.

Smilax.

5. rotundifolia L. ♀. rundblättriger C. H.
6. Sarsaparilla L. ♀. Sarsaparillen Fr.
7. tetragona L. ♀. vierkantiger Fr.
S. mauritanica Poir.

Smyrnum.

Smyrnum.

1. aureum W. E. 4. goldfarbenes Fr.
Sison aureum Spr.
2. Dioscoridis Spr. 4. Dioscoridis Fr.
3. integerrimum W. En. 4. ganzblättriges Fr.
Sison integerrimus Spr.
4. Olusatrum L. 4. schottisches Fr.
5. perfoliatum W. En. 4. durchwachsenes Fr.

Solandra.

Solandre.

1. grandiflora Sw. ♀. großblumige w. H.
2. — b. foliis hirsutis ♀. mit filzigen Blättern w. H.
Datura sarmentosa Lam.

Solanum.

Nachtschatten.

1. aculeatissimum Jacq. bewaffneter C. H.
2. amazonium Kerr. ♀. amazonischer C. H.
Nycterium amazonium Link.
3. angustifolium Lam. ♀. schmalblättriger C. H.
4. argenteum Dunal. ♀. silberweise w. H.
5. astroides Jacq. ♀. sternblumenartiger C. H.
6. auriculatum Ait. ♀. geöhrter C. H.
7. bahamense L. ♀. bahamäischer C. H.
8. Belfortianum Vent. ♀. Belfortianischer C. H.
9. betaceum Cav. ♀. mexikanischer w. H.
S. crassifolium Orteg.
10. bombense Jacq. ♀. bombascher C. H.
11. bonariense L. ♀. bonarischer C. H.
12. campechiense L. ♀. rothstachliger C. H.
S. acanthifolium Mill.
13. chenopodioides L. ☉. meldenblättriger Fr.
14. ciliare W. En. ♀. gefranzter C. H.
15. cornutum L. ☉. hornförmiger Fr.
16. corymbosum Jacq. ♀. doldentraubiger C. H.
17. decurrens Balb. ♀. ♂. abwärtslaufender C. H.
18. diphyllum L. ♀. zweyblättriger C. H.
19. Dulcamara L. ♀. Bittersüß Fr.

Solanum.

Nachtschatten.

20. Fontesianum Schrank. ☉. fontanesischer Fr.
21. Humboldtii W. ☉. Humboldtischer Fr.
22. igneum L. ☿. feuriger w. H.
23. lycioides L. ☿. bocksdornartiger C. H.
24. Lycopersicum L. ☉. Liebesapfel Fr.
Lycopersicum esculentum Humb.
25. macrocarpum L. ☿. großfrüchtiger C. H.
26. marginatum L. ☿. gerandeter C. H.
27. Melongena L. ☉. eyer tragender Fr.
S. esculentum Dunal.
28. memphiticum Mart. ☉. memphitischer Fr.
29. miniatum Bernh. ☉. mennigrother Fr.
S. alatum Moench.
30. nigrum L. ☉. gemeiner Fr.
31. — b. humile W. ☉. niedriger Fr.
32. peruvianum L. ☿. peruvianischer C. H.
33. Pseudocapsicum L. ☿. beisbeerartiger C. H.
34. pyracanthos Jacq. ☿. rothstachliger C. H.
S. runcinatum Wendl.
35. radicans L. ☿. wurzelnder C. H.
S. quercifolium R. et P.
36. sanctum L. ☿. heiliger C. H.
37. sodomaeum L. ☿. Sodoms C. H.
38. tomentosum L. ☿. filziger C. H.
39. triquetrum Cav. ☿. dreyeckiger C. H.
40. triste Jacq. ☿. trauriger w. H.
41. tuberosum L. ♄. Kartoffel C. H.
42. Vespertilio W. ☿. canarischer C. H.

Soldanella.

Alpenglöckchen.

1. alpina L. ♄. gemeines Fr.
2. minima Hoppe. ♄. kleinstes Fr.
3. montana W. En. ♄. Berg C. H.

Solidago.

Goldruthen.

1. alpestris W. et K. ♄. Alpen Fr.
2. altissima L. ♄. höchste Fr.
3. arenaria Poir. ♄. Sand Fr.
4. arguta Ait. ♄. scharfgesägte Fr.
5. aspera Ait. ♄. rauchblättrige Fr.
6. bicolor L. ♄. zweyfarbige Fr.
7. caesia L. ♄. blaustielige Fr.

Solidago. Goldruthen.

8. *cambrica* Huds. 24. englische Fr.
9. *canadensis* L. 24. canadische Fr.
10. *flexicaulis* L. 24. gebogene Fr.
11. *fragrans* W. 24. starkkriechende Fr.
12. *gigantea* Ait. 24. Riesen Fr.
13. *hirta* W. 24. borstige Fr.
14. *hispida* Mühlenb. 24. haarige Fr.
15. *laevigata* Ait. 24. glattblättrige Fr.
16. *lanceolata* L. 24. schmalblättrige Fr.
17. *lateriflora* Ait. 24. seitenblühige Fr.
18. *latifolia* L. 24. breitblättrige Fr.
19. *livida* W. 24. bleygraue Fr.
20. *lithospermifolia* L. 24. steinsaamenblättrige Fr.
21. *mexicana* L. 24. mexicanische Fr.
22. *minuta* L. 24. kleinste Fr.
23. *nutans* Desf. 24. überhängende Fr.
24. *odorata* Ait. 24. wohlriechende Fr.
25. *patula* Mühlenb. 24. ausgebreitete Fr.
26. *petiolaris* Ait. 24. gestielte Fr.
27. *procera* Ait. 24. hohe Fr.
28. *recurvata* W. En. 24. abwärtsgebogene Fr.
29. *reflexa* Ait. 24. zurückgebogene Fr.
30. *rigida* L. 24. steifblättrige Fr.
31. *rugosa* Mill. 24. runzliche Fr.
32. *sempervirens* L. 24. immergrüne Fr.
33. *ulmifolia* Mühlenb. 24. rüsterblättrige Fr.
34. *verrucosa* Schrad. 24. warzige Fr.
35. *Virgaurea* L. 24. gemeine Fr.

Sonchus. Gänsedistel.

1. *acuminatus* W. ♂. zugespitzte Fr.
2. *arvensis* L. ☉. Acker Fr.
3. *canadensis* L. 24. canadische Fr.
4. *caucasicus* Spr. 24. caucasische Fr.
5. *flexuosus* Ledeb. 24. gekniete Fr.
6. *floridanus* L. ♂. floridanische Fr.
7. *fruticosus* L. ♀. strauchartige C. H.
8. *laevigatus* W. En. ♀. glatte C. H.
9. *macrophyllus* W. 24. großblättrige Fr.
S. luxurians Schrad.
10. *palustris* L. 24. Sumpf Fr.
11. *pinnatus* W. En. ♀. gefiederte C. H.
12. *Plumieri* L. 24. pyrenäische Fr.

Sonchus. Gänse distel.

13. tataricus L. 24. tatarische Fr.
14. tenerrimus L. ☉. zarte Fr.
15. tingitanus W. En. 24. tunetanische Fr.
Picridium tingitanum Desf.

Sophora. Sophore.

1. alopecuroides L. 24. fuchsschwanzartige Fr.
argentea et australis vid. Podalyria.
2. japonica L. ☿. japanische Fr.
3. microphylla Ait. ☿. kleinblättrige C. H.
Edwardsia microphylla Salisb.
4. tetraptera Ait. ☿. flügelfrüchtige C. H.
Edwardsia tetraptera Poir.
5. tomentosa L. ☿. filzige C. H.
capensis et secundiflora vid. Virgilia.

Sorbus. Vogelbeer.

1. americana W. ☿. amerikanische Fr.
2. aucuparia L. ☿. gemeine Fr.
3. domestica L. ☿. Spierlingbaum Fr.
4. hybrida L. ☿. Bastard Fr.

Sorghum. Dürragras.

1. cernuum W. ☉. übergebogenes Fr.
2. sacharatum W. ☉. zuckerartiges Fr.
3. vulgare W. En. ☉. gemeines Fr.
4. — b. bicolor ☉. zweyfarbiges Fr.
Holcus Sorghum L.

Spananthe. Wassernabel.

1. paniculata Jacq. ☉. bärtiger Fr.
Hydrocotyle Spananthe W.

Sparganium. Igelkopf.

1. erectum L. 24. aufrechter Fr.
S. ramosum Smith.
2. simplex Smith. 24. einfacher Fr.

Sparrmannia. Sparrmannie.

1. africana L. ☿. africanische C. H.

Spartina. **Spartine.**

1. cynosuroides W. 4. kammgrasartige Fr.

Spartium. **Pfriemen.**

1. album Desf. ʒ. weisse C. H.
 S. multiflorum Ait.
2. aethnense Biv. ʒ. italienische C. H.
3. angulatum L. ʒ. kleinblüthige C. H.
 S. parviflorum Vent.
4. aspalathoides Desf. ʒ. witschenartige C. H.
5. ferox. Poir. ʒ. wilde C. H.
6. junceum L. ʒ. binsenartige Fr.
7. — flore pleno ʒ. mitgefüllten Blumen C. H.
8. monospermum L. ʒ. einsamige C. H.
9. nubigenum Ait. ʒ. Wolkenpfrieme C. H.
10. purgans L. ʒ. Purgierpfrieme C. H.
11. Scoparium L. ʒ. gemeine Fr.
12. sphaerocarpum L. ʒ. rundfrüchtige C. H.
13. spinosum L. ʒ. stachlige C. H.
 Calycotome spinosa Link.
14. villosum L. ʒ. haarige C. H.
 Calycotome villosa Link.
15. virgatum Ait. ʒ. ruthenförmige C. H.
 Cytisus tener Jacq.

Spatelia. **Schaftbaum.**

1. simplex R. Br. ʒ. einfacher w. H.

Spergula. **Spergel.**

1. arvensis L. ☉. Acker Fr.
2. saginoides L. 4. langstieliger Fr.

Spermacoe. **Zahnwirbel.**

1. aspera Aublet ☉. rauher Fr.
2. hispida L. ☉. borstiger Fr.
3. rubra Jacq. ☉. rother Fr.

Sphaeranthus. **Kugelblume.**

1. indicus L. ʒ. indische w. H.

Sphaerolobium. **Sphaerolobium.**

1. vimineum Smith. ʒ. ruthenförmiges C. H.

Spielmannia. **Spielmannie.**

1. africana W. En. ♀. africanische C. H.

Spigelia. **Spigelia.**

1. Anthelmia L. ☉. wurmtreibende Fr.
2. marylandica L. 4. marylandische Fr.

Spilanthus. **Fleckblume.**

1. Acmella W. Sp. pl. ☉. wahre Fr.
Acmella mauritiana Pers.
2. fuscus Desf. ☉. braune Fr.
3. oleraceus L. ☉. krautartige Fr.

Spinacia. **Spinat.**

1. oleracea L. ☉. gemeiner Fr.

Spiraea. **Spierstaude.**

1. acutifolia W. En. ♀. spitzblättrige Fr.
2. alpina Pall. ♀. Alpen Fr.
3. Aruncus L. 4. Geisbart Fr.
4. betulaefolia Pall. ♀. birkenblättrige Fr.
S. ulmifolia Scop.
5. chamaedryfolia L. ♀. gamanderblättrige Fr.
6. crenata L. ♀. gekerbte Fr.
7. filipendula L. 4. knollige Fr.
8. — b. fl. pl. 4. mit gefüllten Blumen Fr.
9. hypericifolia L. ♀. johanniskrautblättrige Fr.
10. laevigata L. ♀. glatte Fr.
11. lobata Jacq. 4. rothblüthige Fr.
12. oblongifolia W. et K. ♀. langblättrige Fr.
13. obovata W. et K. ♀. verkehrteyrunde Fr.
14. opulifolia L. ♀. schneeballenblättrige Fr.
15. palmata Thunb. 4. fünfflappige Fr.
16. salicifolia L. ♀. weidenblättrige Fr.
17. — b. florib. roseis ♀. mit rosenrothen Blumen Fr.
18. sorbifolia L. ♀. vogelbeerblättrige Fr.
19. thalictroides Pall. ♀. wiesenrautenblättrige Fr.
20. tomentosa L. ♀. filzige Fr.
21. trifoliata L. 4. dreyblättrige Fr.
22. triloba L. ♀. dreylappige Fr.
23. Ulmaria L. 4. Sumpf Fr.
24. — b. fl. pl. 4. mit gefüllt. Bl. Fr.
25. — c. fol. variegat. 4. mit bunten Blättern Fr.

Stachys.

Ziest.

1. alpina L. 2. Gebirgs Fr.
2. angustifolia M. B. 2. schmalblättriger Fr.
3. annua L. ☉. jähriger Fr.
4. circinata Herit. 2. stumpfblättriger C. H.
5. coccinea Jacq. 2. scharlachrother C. H.
6. corsica Pers. 2. corsischer C. H.
7. cretica L. 2. cretischer Fr.
8. decumbens Desf. 2. niederliegender Fr.
9. germanica L. 2. deutscher Fr.
10. heraclea All. 2. heilkrautartiger Fr.
11. hirta L. 2. behaarter Fr.
12. iberica M. B. 2. iberischer Fr.
13. intermedia Ait. 2. mittler Fr.
14. lanata Ait. 2. wolliger Fr.
15. nepetifolia Desf. 2. katzenmünzblättriger Fr.
16. polystachya Tenor. 2. vielähriger Fr.
17. recta L. 2. Rospoley Fr.
S. procumbens Lam.
18. rugosa Ait. ♀. runzlicher C. H.
19. scordifolia W. 2. knoblauchriechender Fr.
S. purpurea Besser.

Stachytarpheta.

Dichtähre.

1. angustifolia Vahl. ☉. schmalblättrige w. H.
2. cajanensis Vahl. ♀. westindische w. H.
3. jamaicensis L. ☉. jamaische w. H.
4. prismatica Vahl. ♂. prismatische w. H.
5. mutabilis Jacq. ♀. veränderliche w. H.

Stachelina.

Stacheline.

1. Chamaepeuce L. ♀. fichtenblättrige C. H.

Stapelia.

Stapelie.

1. ambigua Mass. ♀. vielblüthige w. W.
2. anguinea Jacq. ♀. schlangenförmige w. H.
3. Asterias Mass. ♀. sternförmige w. H.
4. bufonia Jacq. ♀. krötenartige w. H.
5. campanulata Mass. ♀. glockenblüthige w. H.
6. ciliata Mass. ♀. gefranzte w. H.
7. clavigera Jacq. ♀. keulentragende w. H.
8. comata Jacq. ♀. schopfige w. H.
9. compacta Haw. ♀. dichte w. H.

Stapelia.

Stapelië.

10. conspurcata W. h. getupfte w. H.
11. decora Mass. h. geschmückte w. H.
12. divaricata Mass. h. ausgebreitete w. H.
13. elegans Mass. h. niedliche w. H.
14. gemifera Haw. h. zwillingsblüthige w. H.
15. glanduliflora Mass. h. drüsenblüthige w. H.
16. glauca W. h. graublättrige w. H.
17. glomerata Haw. h. knaulige w. H.
18. grandiflora Mass. h. großblüthige w. H.
19. hamata Haw. h. hackige w. H.
20. hircosa Jacq. h. böckige w. H.
- S. moschata Haw.
21. hirsuta W. h. haarige w. H.
22. hirtella Jacq. h. schwachhaarige w. H.
23. Juvencula Jacq. h. junge w. H.
24. lentiginosa Haw. h. fleckige w. H.
25. maculosa Jacq. h. gefleckte w. H.
26. marginata W. h. gerandete w. H.
27. marmorata Jacq. h. marmorirte w. H.
28. mixta Mass h. gemischte w. H.
29. mutabilis Jacq. h. veränderliche w. H.
30. normalis Jacq. h. geradwinkliche w. H.
31. obliqua W. h. schiefe w. H.
32. paniculata W. h. rispenartige w. H.
33. patula W. h. abstehende w. H.
34. picta Haw. h. gemahlte w. H.
35. planiflora Jacq. h. flachblüthige w. H.
36. radiata Jacq. h. strahlenförmige w. H.
37. reclinata Mass. h. sperrästige w. H.
38. replicata Jacq. h. ausgebogene w. H.
39. reticulata Mass. h. netzförmige w. H.
40. revoluta Mass. h. zurückgebogene w. H.
41. serrulata Jacq. h. feingesägte w. H.
42. Sororia Mass. h. verschwisterte w. H.
43. stellaris Jacq. h. sternförmige w. H.
44. tridentata Hort. Dyk. h. dreyzähnige w. H.
45. tubata Jacq. h. röhrige w. H.
46. tuberculata Haw. h. vertiefte w. H.
47. variegata W. h. bunte w. H.
48. venusta Mass. h. schöne w. H.
49. verrucosa Mass. h. warzige w. H.
50. Woodfordiana Haw. h. Woodfordische w. H.

Staphylea. Pimpernufs.

1. pinnata L. ♀. gemeine Fr.
2. trifoliata L. ♀. virginische Fr.

Statice. Grasnelke.

Armeria vid. Armeria.

1. auriculaefolia Vahl. 4. aurikelblättrige Fr.
2. bellidifolia Dec. 4. maßliebenblättrige Fr.
3. cordata L. 4. herzblättrige Fr.
4. echiioides L. 4. natterkopffartige Fr.
5. Gmelini W. 4. Gmelinische Fr.
6. graminifolia Ait. 4. grasblättrige Fr.
7. incana L. 4. graue C. H.
8. latifolia Smith. 4. breitblättrige Fr.
9. Limonium L. 4. Meerstrands Fr.
10. minuta L. 4. kleine Fr.
11. monopetala L. ♀. dickblättrige C. H.
12. — b. angustifolia ♀. mit schmalen Blättern C. H.
13. mucronata L. 4. krausblättrige C. H.

S. crispa Pers.

14. reticulata L. 4. netzästige C. H.
15. scoparia Pall. 4. pfriemenartige Fr.
16. sinuata L. 4. buchtige C. H.
17. spathulata Desf. 4. spathelblättrige C. H.

Limonium spathulatum Pers.

18. speciosa L. ♂. prächtige Fr.
19. suffruticosa L. ♀. halbstrauchartige C. H.
20. tatarica L. 4. tatarische Fr.

Limonium tataricum Pers.

Stauracanthus. Pfahldorn.

1. aphyllus W. En. ♀. blattloser C. H.
- Ulex provincialis Dec.*

Stellaria. Sternmiere.

1. Arenaria L. ⊙. sandkrautartige Fr.
2. graminea L. 4. grasartige Fr.
3. Holostea L. 4. großblüthige Fr.
4. muralis Link ⊙. mauerwachsende Fr.
5. scapigera W. 4. stiellose Fr.

Stemandia. Stemandie.

1. paniculata H. Nymph. ♀. rispenblüthige w. H.

Stemodia.

Stemodie.

1. parviflora Ait. 4. kleinblüthige Fr.

Stenanthera.

Stenanthere.

1. pinifolia R. Br. 5. fichtenblättrige C. H.

Stenocarpus.

Schmalfrucht.

1. salignus R. Br. 5. weidenblättrige C. H.

Stenochilus.

Stenochilus.

1. glaber R. Br. 5. glatter C. H.

Sterculia.

Stinkbaum.

1. Balanghas L. 5. eyförmiger w. H.
2. platanifolia L. 5. platanblättriger C. H.

Stevia.

Stevie.

1. Eupatoria W. 5. wasserdostartige C. H.
2. ivaefolia W. 4. ivablättrige C. H.
3. ovata W. 4. Eyrundblättrige C. H.
St. paniculata H. Par.
4. purpurea W. 4. purpurrothe C. H.
5. salicifolia Cav. 4. weidenblättrige C. H.
6. serrata Cav. 4. gesägte C. H.

Stilago.

Salamanderbaum.

1. Bunias L. 5. dreyfädiger w. H.

Stipa.

Pfriemengras.

1. capillata L. 4. haarförmiges Fr.
2. pennata L. 4. federiges Fr.
3. tortilis Desf. ☉. gedrehtes Fr.

Stratiotes.

Wasserfeder.

1. Aloides L. 4. alocartige Fr.

Strelitzia.

Strelitzie.

1. augusta Ait. 4. weifsblühende w. H.
2. farinosa Ait. 4. bestäubte w. H.
3. humilis Link. 4. niedrige w. H.
4. juncea Andr. 4. binsenartige w. H.
5. ovata Donn. 4. eyförmige w. H.
6. Reginae Ait. 4. prächtige w. H.

Streptopus vid. Uvularia.

Struthiola. Spatzenstrauch.

1. erecta L. ♀. aufrechter C. H.
2. ciliata Lam. ♀. gefranzter C. H.
3. virgata Thunb. ♀. ruthenförmiger C. H.

Struthiopteris. Strausfarn.

1. germanica W. En. 4. deutscher Fr.
Osmunda Struthiopteris L.

Stuartia. Stuartie.

1. Malachodendrum W. ♀. eingriffliche Fr.

Stylidium. Säulenblume.

1. fruticosum R. Br. ♀. strauchartige C. H.
2. graminifolium R. Br. 4. grasblättrige C. H.

Styphelia. Styphelie.

1. latifolia R. Br. ♀. breitblättrige C. H.

Styrax. Storax.

1. grandiflorum Ait. ♀. großblumiger C. H.
2. laevigatum Ait. ♀. glattblättriger C. H.
3. officinale L. ♀. ächter C. H.

Swainsonia. Swainsonie.

1. coronillaefolia Salisb. ♀. kronwickenblättrige w. H.

Swertia. Swertie.

1. perennis L. 4. ausdaurende Fr.

Swietenia. Mahagonibaum.

1. Mahagoni L. ♀. gemeiner C. H.

Symphoricarpos. Ballfrucht.

1. racemosus Mich. ♀. traubenartige Fr.
Symphoria racemosa Pursch.
1. vulgaris Mich. ♀. gemeine Fr.
Lonicera Symphoricarpos L.

Symphitum.

Schwarzwurz.

1. asperrimum M. B. 24. rauheste Fr.
2. cordatum W. et K. 24. herzförmige Fr.
3. officinale L. 24. gemeine Fr.
4. orientale L. 24. orientalische Fr.
5. tauricum W. 24. großblumige Fr.
S. bullatum Hornem.
6. tuberosum L. 24. knollige Fr.

Symplocos vid. Hopca.

Syringa.

Flieder.

1. chinensis W. 7. chinesischer Fr.
S. Rothomagensis Duh.
2. persica L. 7. persischer Fr.
3. — b. fl. albo 7. mit weißer Blume Fr.
4. — c. foliis laciniatis 7. mit geschlitzten Bl. Fr.
5. vulgaris L. 7. gemeiner Fr.
6. — b. flore albo 7. weißblühender Fr.
7. — c. — rubro 7. mit rothen Blumen Fr.
8. — d. — violaceo 7. mit violetten Blumen Fr.
9. — e. — rubro maximo 7. mit großer rother Blume Fr.
Syr. media Bon. jard. ou *Lila de Marly*.

T.

Tabernaemontana. Tabernaemontane.

1. coronaria Ait. 7. breitblättrige w. H.
Nerium coronarium Jacq.
Amsonia vid. *Amsonia*.

Tacca.

Tacca.

1. integrifolia Gawl. 24. ganzblättrige w. H.

Tagetes.

Todtenblume.

1. clandestina Lagasc. ☉. heimlichblühende Fr.
2. coronopifolia W. En. ☉. krähensfußblättrige Fr.
3. erecta L. ☉. großblumige Fr.
4. — b. florib. plenis ☉. mitgefüllten Blumen Fr.
5. lucida Cav. 24. glänzende C. H.
6. micrantha Cav. ☉. kleinblumige Fr.
7. patula L. ☉. gemeine Fr.

Talinum.

Talinum.

1. Anacampseros W. Haw. ♀. nabelkrautartiges C. H.
Rülingia Anacampseros Ehrh.
2. arachnoideum Haw. ♀. spinnenwebenartiges C. H.
3. crassifolium W. Haw. ♀. dickblättriges C. H.
4. filamentosum Haw. ♀. fadenförmiges C. H.
Portulaca filamentosa Bot. Magaz.
5. lanceolatum Haw. ♀. lanzettblättriges C. H.
6. patens Haw. ♂. rispenblüthiges C. H.

Tamarindus.

Tamarinden.

1. indica L. ♀. indische w. H.

Tamarix.

Tamarisken.

1. gallica L. ♀. französischer Fr.
2. germanica L. ♀. deutscher Fr.

Tamus.

Schmeerwurz.

1. communis L. 4. gemeine Fr.
2. Elephantipes Herit. 4. dicke w. H.

Tanacetum.

Wurmkraut.

1. canariense Dec. ♀. canarisches C. H.
2. vulgare L. 4. gemeines Fr.
3. — b. crispum 4. mit krausen Blättern Fr.
flabelliforme vid. Balsamita.

Tarchonanthus.

Pelzsaame.

1. camphoratus L. ♀. kampferartiger C. H.

Taxus.

Taxus.

1. baccata L. ♀. gemeiner Fr.
2. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
elongata vid. Podocarpus.

Telephium.

Telephium.

1. Imperati L. 4. wechselblättriges Fr.
T. repens Lam.

Tempeltonia vid. Rafnia.

Tenoria vid. Bupleurum.

Terminalia.

Catappenbaum.

1. angustifolia Jacq. ♀. schmalblättriger w. H.
2. Catappa L. ♀. gemeiner w. H.
3. procera Roxb. ♀. hoher w. H.

Ternstroemia. Ternstroemie.

1. meridionalis L. ♀. mittägliche w. H.

Teta vid. Peliosanthes.

Tetragonia. Viereksfrucht.

1. echinata Ait. ☉. stachliche Fr.
2. expansa Thunb. ☉. ausgebreitete Fr.
3. decumbens Mill. ♀. niederliegende Fr.
4. fruticosa L. ♀. strauchartige Fr.

Tetracera. Raspelstrauch.

1. Calinea? W. ♀. seitenblüthiger w. H.
Mappia Calinea Schreb.

Teucrium. Gamander.

1. abutiloides Herit. ♀. großblättriger C. H.
T. macrophyllum Lam.
2. Arduini L. ♀. arduinischer C. H.
3. asiaticum L. ♀. schmalblättriger C. H.
4. betonicum Ait. ♀. betonienartiger C. H.
T. maderiense Lam.
5. Botrys L. ☉. halbwirtelblüthiger Fr.
6. campanulatum L. 4. glockenblüthiger Fr.
7. capitatum L. 4. knopfförmiger Fr.
8. Chamaedrys L. 4. gemeiner Fr.
9. cubense L. 4. cubascher Fr.
10. flavum L. ♀. gelber C. H.
11. fruticans L. ♀. strauchartiger C. H.
12. heterophyllum Herit. ♀. verschiedenblättriger C. H.
Teucrium canariense Lam.
13. hyrcanicum L. 4. hyrcanischer C. H.
14. Laxmanni L. ♂. Laxmanischer Fr.
15. lucidum L. 4. leuchtender Fr.
16. Marum L. ♀. Katzenkraut C. H.
17. massiliense Jacq. 4. französischer C. H.
18. mauritanicum H. Monac. 4. mauritanischer Fr.
19. montanum L. 4. Berg-Gamander Fr.
20. multiflorum L. ♀. vielblüthiger C. H.
21. orientale L. 4. orientalischer C. H.
22. Polium L. ♀. Poley C. H.
23. regium L. ♀. königlicher C. H.
24. Scordium L. 4. knoblauchduftiger Fr.
25. Scorodonia L. 4. Scorodonien Fr.
26. spinosum L. ☉. dorniger Fr.

Thalia. *Thalie.*

1. dealbata Fras. 4. rohrförmige w. H.

Thalictrum. *Thalictrum.* (Wiesenraute)

1. acuminatum Spr. 4. spitzblättriges Fr.
2. alpinum L. 4. Alpen Fr.
3. angustifolium L. 4. schmalblättriges Fr.
4. aquilegifolium L. 4. akeleyblättriges Fr.
5. — b. atropurpureum Jacq. 4. schwarzrothes Fr.
6. concinnum W. 4. nettes Fr.
7. diffusum Schrad. 4. weitästiges Fr.
8. elatum Jacq. 4. hohes Fr.
9. flavum L. 4. gemeines Fr.
10. foetidum Dec. 4. stinkendes Fr.
11. galioides Nestl. 4. labkrautähnliches Fr.
12. glaucum Desf. 4. graues Fr.
13. lucidum L. 4. glänzendes Fr.
14. majus Jacq. 4. großes Fr.
15. medium Jacq. 4. mittleres Fr.
16. minus L. 4. kleines Fr.
17. nigricans Jacq. 4. schwärzliches Fr.
18. nutans Desf. 4. überhängendes Fr.
19. petaloideum L. 4. dichtblüthiges Fr.
20. rugosum Ait. 4. runzliches Fr.
21. ruthenicum Schrad. 4. russisches Fr.
22. sibiricum L. 4. sibirisches Fr.
23. simplex L. 4. einfaches Fr.
24. tuberosum L. 4. knolliges Fr.

Thea. *Theestrauch.*

1. Bohea L. 4. brauner C. H.
2. sasanqua H. Cels. 4. stumpfblättriger C. H.
3. viridis L. 4. grüner C. H.

Thelygonum. *Hundskohl.*

1. Cynocrambe L. 4. gemeiner Fr.

Theobroma vid. *Bubroma.*

Theophrasta. *Theophraste.*

1. longifolia Jacq. 4. langblättrige w. H.

Thlaspi. Täschelkraut.

1. alliaceum L. ☉. knoblauchduftiges Fr.
2. alpestre L. 4. Alpen Fr.
3. Bursa pastoris L. ☉. gemeines Fr.
Capsella Bursa pastoris Dec.
4. Buxbaumii Fisch. ☉. buxbaumisches Fr.
5. hirtum L. ♂. haariges Fr.
6. montanum L. 4. Berg Fr.
7. saxatile L. ☉. Stein Fr.

Thrincia. Thrincie.

1. hispida Roth. ☉. steifberstige Fr.
Hyoseris taraxacoides Will.

Thuja. Lebensbaum.

1. australis Bosc. ♀. südlicher C. H.
2. cupressoides L. ♀. cypressenartiger C. H.
3. occidentalis L. ♀. gemeiner Fr.
4. orientalis L. ♀. chinesischer Fr.

Thunbergia. Thunbergie.

1. fragrans Roxb. ♀. wohlriechende w. H.

Thymbra. Thymbra.

1. ciliata Desf. ♀. gefranzte C. H.

Thymus. Thymian.

1. Acinos L. ☉. Acker Fr.
2. alpinus L. 4. Alpen Fr.
3. Calamintha W. En. 4. Berg Fr.
4. citriodorus Gmel. 4. citronenduftiger Fr.
5. filiformis Ait. 4. fadenförmiger C. H.
6. glabratus W. En. 4. glatter Fr.
7. grandiflorus W. En. 4. großblüthiger Fr.
8. graveolens M. B. 4. Garten Fr.
9. herba barona Desf. 4. C. H.
10. Mastichina L. ♀. Mastix-Thymian C. H.
11. melissoides Fisch. 4. melissenartiger Fr.
12. montanus W. et R. ♀. Berg Fr.
13. Nepeta Smith. 4. poleyartiger Fr.
Melissa Nepeta L.
14. nummularius M. B. 4. rundblättriger Fr.
15. patavinus Ait. ♂. melissenblättriger Fr.

Thymus. Thymian.

16. Serpyllum L. 4. Feld (Quendel) Fr.
17. — b. villosum 4. filziger. Fr.
18. vulgaris L. 5. gemeiner. Fr.
19. — b. foliis variegatis 5. mit bunten Blättern. Fr.
virginicus vid. Brachystemum.

Tiarella. Spitzhut.

1. cordifolia L. 4. herzblättriger. Fr.

Tigridia. Tigridie.

1. pavonia Pers. 4. pfauenartige. C. II.
Ferraria pavonia Thunb.

Tilia. Linde.

1. alba W. En. 5. weisse (Silberlinde) Fr.
T. rotundifolia Vent.
T. nivea Hortul.
2. glabra Vent. 5. glatte. Fr.
T. americana L.
3. grandifolia Hoffm. 5. großblättrige. Fr.
T. europaea W. En.
T. platyphyllos Scop.
4. parvifolia Hoffm. 5. kleinblättrige. Fr.
T. microphylla Vent.
T. cordata Mill.
5. pubescens Ait. 5. weichhaarige. Fr.
6. triflora Hornem. 5. dreyblüthige. Fr.
T. corallina Ait.

Tillandsia. Tillandsie.

1. amoena Lodd. 5. schöne. w. H.
2. lingulata L. 5. zungenblättrige. w. H.

Tithonia. Tithonie.

1. tagetiflora Desf. ☉. sammtblumenblüthige. Fr.

Tolpis. Tolpis.

1. altissima Pers. 4. höchste. Fr.
Crepis altissima Balb.
2. barbata Gaert. ☉. bartige. Fr.
Crepis barbata L.

Tofieldia. Tofieldie.

1. palustris W. En. 24. Sumpf. Fr.

Anthericum calyculatum L.

Hebelia allemanica Gmel. fl. bad.

Tofieldia alpina Smith.

Helonias borealis W. Spl. pl.

Tordylium. Zirmet. (Bettelläuse.)

1. apulum L. ☉. apulischer. Fr.

2. humile Desf. ☉. niedriger. Fr.

3. maximum L. ☉. größter. Fr.

Heracleum Tordylium Spr.

4. syriacum L. ☉. syrischer. Fr.

Torilis. Drehkraut. (Heckenkörfel)

1. Anthriscus Gmel. ♂. Wald. Fr.

Tordylium Anthriscus L.

Tormentilla. Tormentill.

1. erecta L. 24. aufrechte. Fr.

Potentilla Tormentilla Schrad.

2. repens L. 24. liegende. Fr.

Tournefortia. Tournefortie.

1. cymosa L. ♀. doldentraubige. w. H.

T. macrophylla Lam.

2. foetidissima L. ♀. stinkende. w. H.

3. hirsutissima L. ♀. haarige. w. H.

4. lucida Desf. ♀. glänzende. w. H.

5. mutabilis Vent. ♀. veränderliche. w. H.

6. volubilis L. ♀. rankende. w. H.

Trachelium. Halskraut.

1. coeruleum L. 24. blaues. C. H.

Tradescantia. Tradescantie.

1. crassifolia Cav. ♀. dickblättrige. w. H.

2. discolor Smith. 24. violettblättrige. w. H.

3. erecta Cav. ☉. aufrechte. Fr.

4. procumbens W. 24. niedergestreckte. w. H.

5. rosea Vent. 24. rosenfarbige. C. H.

6. virginica L. 24. virginische. Fr.

7. — b. fl. albo 24. mit weißer Blume. Fr.

8. Zanonía W. 24. scheidenblüthige. w. H.

Comelina Zanonía L.

Tragia. sibilis Trägie.

1. volubilis L. ♂. windende w. H.

Tragopogon. Bocksbart.

1. angustifolius Bell. ♂. schmalblättriger Fr.
 2. crocifolius L. ♂. safranblättriger Fr.
 Dalechampi vid. Arnopogon.
 3. dubius Hornem. ♂. zweifelhafter Fr.
 4. major Jacq. ♂. großer Fr.
 5. parviflorus Hornem. ♂. kleinblüthiger Fr.
 6. porrifolius L. ♂. haserwurzel Fr.
 7. undulatus Jacq. ⊙. wellenblättriger Fr.

Trevirana. Trevirane.

1. coccinea W. En. 4. scharlachrothe w. H.
Achimenes coccinea Pers.
Columnnea erecta Lam.
Cyrilla pulchella Herit.
Gesneria pulchella Sw.

Tribulus. Bürzeldorn.

1. terrestris L. ⊙. gemeiner Fr.

Trichera. Scabiosa.

Trichosanthes. Haarblume.

1. Anguina L. ⊙. schlangenfrüchtige w. H.

Trifolium. Klee.

1. alpestre L. 4. Wald Fr.
 2. angustifolium L. ⊙. schmalblättriger Fr.
 3. arvense L. ⊙. Acker Fr.
 4. conicum Savi. 4. kegelförmiger Fr.
 5. Cupani Tineo. 4. cupanischer Fr.
 6. diffusum W. et K. ♂. ausgebreiteter Fr.
 7. echinatum M. B. ⊙. stacheliger Fr.
 8. elegans M. B. ⊙. schöner Fr.
 9. flexuosum Jacq. 4. geknieteter Fr.
 10. fragiferum L. 4. Erdbeeren Fr.
 11. glomeratum L. ⊙. kugelblüthiger Fr.
 12. hispidum Desf. ⊙. scharfhaariger Fr.

Trifolium. Klec.

13. incarnatum L. ☉. schönrother Fr.
14. ligusticum Labill. ☉. ligurischer Fr.
15. Lupinaster W. 4. hopfenartiger Fr.
Pentaphyllum Lupinaster Pers.
16. maritimum Smith. 4. Meerstrands Fr.
17. Michellianum Savi 4. Michellischer Fr.
18. montanum L. 4. Berg Fr.
19. noricum Wulf. 4. Nurischer Fr.
20. ochroleucum Desf. 4. bleichgelber Fr.
21. pallidum W. et K. ♂. bleicher Fr.
22. pannonicum L. 4. ungarischer Fr.
23. parvislorum Ehrh. ☉. kleinblüthiger Fr.
24. pensylvanicum W. En. 4. pensylvanischer Fr.
25. pictum Roth. ☉. bunter Fr.
26. pratense L. 4. Futterklec Fr.
27. purpureum Lois. ☉. purpurrother Fr.
28. rubens L. 4. langähriger Fr.
29. spadiceum L. ☉. brauner Fr.
30. spumosum L. ☉. apulischer Fr.
31. squarrosus L. ☉. sparriger Fr.
32. stellatum L. ☉. sternförmiger Fr.
33. vesiculosum Savi. ☉. blasiger Fr.
T. recurvum W. et K.

Triglochin. Dreyzack.

1. maritimum L. 4. Meerstrands Fr.

Trigonella. K ü h h o r n k l e e.

1. cancellata Desf. ☉. gegitterter Fr.
2. corniculata L. ☉. gekrümmter Fr.
3. esculenta W. ☉. essbarer Fr.
4. flexuosa Poir. ☉. geknieter Fr.
5. foenum graecum L. ☉. gemeiner Fr.
6. gladiata Stev. ☉. schwertsamiger Fr.
7. hybrida Poir. 4. Bastard Fr.
8. monspeliaca L. ☉. französischer Fr.
9. pinnatifida Cav. ☉. tiefzahniger Fr.
10. polycerata L. ☉. vielhörniger Fr.
11. prostrata Dec. ☉. gestreckter Fr.
12. ruthenica L. 4. russischer Fr.
13. spinosa L. ☉. dorniger Fr.
14. striata L. fil. ☉. gestreifter Fr.
15. tomentosa Thunb. ☉. filziger Fr.

Trilix. Trilix.

1. lutea L. ♀. gelbe w. H.

Trinia vid. Pimpinella.

Triostemum. Dreystein. (Brechwurz)

1. perfoliatum Vahl. 4. breitblättriger Fr.

Triplaris. Dreyling.

1. americana L. ♀. amerikanischer w. H.

Tripsacum. Löchergras.

1. dactyloides L. 4. vielähriges Fr.
Coix angularis Mill.

Tristania. Tristanie.

1. conferta R. Br. ♀. gehäufte C. H.
2. laurina R. Br. ♀. lorbeerblättrige C. H.
3. nereifolia R. Br. ♀. oleanderblättrige C. H.
Melaleuca salicifolia Andr.

Tristegis. Tristegis.

1. glutinosa Hort. Berol. ♀. klebrige w. H.

Triticum. Weizen.

1. acutum Dec. 4. spitzer Fr.
2. aestivum L. ☉. Sommer Fr.
3. — b. rubrum ☉. rother Fr.
4. Bauhini Lagasc. ☉. Bauhinischer Fr.
5. caninum L. 4. queckenartiger Fr.
Elymus caninus L.
6. compositum L. ☉. Wunderweizen Fr.
Triticum turgidum L.
7. densiflorum W. 4. dichtblüthiger Fr.
8. durum Desf. ☉. steifer Fr.
9. hybernum L. ♂. Winterweizen Fr.
10. imbricatum M. B. 4. dachziegelförmiger Fr.
11. junceum L. 4. binsenförmiger Fr.
Bromus truncatus Scop.
12. littorale Host. 4. Meerstrands Fr.
13. loliaceum Smith. ☉. lolchartiger Fr.
T. unilaterale Host.

Triticum. Weizen.

14. monococcum L. ☉. einkörniger Fr.
15. patulum W. En. ☉. sparriger Fr.
T. squarrosum Roth.
16. pectinatum R. Br. 24. kammförmiger Fr.
17. polonicum L. ☉. pohlischer Fr.
18. repens L. 24. Quecken Fr.
19. rigidum Schrad. 24. steifer Fr.
20. sibiricum W. 24. sibirischer Fr.
21. spelta L. ☉. Dunkel-Weizen Fr.
22. — b. aristata ☉. mit Grannen Fr.
23. — c. mutica ☉. ohne Grannen Fr.
24. — d. nigra ☉. schwarzer Fr.
25. turgidum L. ☉. englischer Fr.

Tritonia vid. **Jxia.**

Triumfetta. Triumfette.

1. Lappula L. †. kelchlose w. H.
2. semitriloba L. †. halbdreylappige w. H.

Trollius. Trollblume.

1. americanus Mühlenb. 24. amerikanische Fr.
T. laxus Salisb.
2. asiaticus L. 24. asiatische Fr.
3. europaeus L. 24. europäische Fr.
4. napellifolius Roep. 24. eisenhutblättrige Fr.
5. — b. erectum Roep. 24. aufrechte Fr.
6. — c. medius Wender. 24. mittlere Fr.

Tropaeolum. Capuzinerkresse.

1. hybridum L. †. Bastard C. H.
2. majus L. ☉. indianische Fr.
3. — b. fl. plenis †. mit gefüllten Blumen C. H.
4. minus L. ☉. kleine Fr.

Tulipa. Tulpe.

1. Gesneriana L. 24. gemeine Fr.
2. — b. amplae varietates simplicis et plenis.
Mit vielen einfachen und gefüllten Blumen.
3. Oculis solis Dec. 24. Sonnenaug Fr.
4. suaveolens Roth. 24. wohlriechende (Duc. van Tol.) Fr.
5. sylvestris L. 24. wilde Fr.
6. turcica Roth. 24. türkische Fr.

Tupistra. Tupistre.

1. squalida Bot. Mag. 4. schmutzige w. H.

Turnera. Turnere.

1. cuneiformis Juss. h. keilblättrige w. H.
2. elegans Otto. h. schöne w. H.
3. racemosa Jacq. ☉. traubenblüthige w. H.
4. ulmifolia L. h. ulmenblättrige w. H.

Turritis. Thurmkraut.

1. glabra L. ♂. glattes Fr.
Arabis perfoliata Lam.
2. hirsuta L. ♂. rauhes Fr.
3. minor. Vill. 4. kleines Fr.

Tussilago. Huflattig.

1. alba L. 4. weißer Fr.
2. alpina L. 4. Alpen Fr.
3. Anandria L. 4. geschlossener Fr.
Perdicium Anandria R. Br.
4. discolor Jacq. 4. zweyfarbiger Fr.
5. Farfara L. 4. gemeiner Fr.
6. fragrans Vill. 4. wohlriechender Fr.
T. suaveolens Hortul.
7. nivea Hoppe. 4. dickfilziger Fr.
T. paradoxa Retz.
8. Petasites L. 4. großblättriger Fr.
9. spuria W. 4. gelappter Fr.
T. tomentosa Ehrh.

Typha. Rohrkolben.

1. angustifolia L. 4. schmalblättriger Fr.
2. latifolia L. 4. breitblättriger Fr.
3. minima Funke. 4. kleinster Fr.

U.

Ulex. Hecksame.

1. europaeus L. h. europäischer Fr.
aphyllus vid. *Stauracanthus*.
2. nanus W. h. niedriger Fr.

Ulmus.

Rüster. (Ulme)

1. americana L. ♀. amerikanischer Fr.
2. campestris L. ♀. gemeiner Fr.
3. — b. foliis variegatis ♀. mit bunten Blättern Fr.
4. — c. crispa ♀. mit krausen Blättern Fr.
5. — d. scabra ♀. mit rauhen Blättern Fr.
6. effusa W. ♀. langstieliger Fr.
U. ciliata Ehrh.
U. glabra Mill.
U. hollandica Duroi.
7. chinensis Desf. ♀. chineser C. H.
U. parvifolia Jacq.
8. fungosa Lodd. ♀. schwammiger Fr.
nemoralis vid. *Planera*.
9. stricta Lodd. ♀. aufrechter Fr.
10. suberosa Ehrh. ♀. Korkrüster Fr.

Uniola.

Spitzgras.

1. latifolia Mich. 4. breitblättriges Fr.

Urania.

Uranie.

1. speciosa W. ♀. prächtige w. H.
Ravenalia madagascariensis Juss.

Urena.

Urene.

1. lobata L. ♀. eckige w. H.
2. sinuata L. ♀. buchtige w. H.

Urtica.

Nessel.

1. aestuans L. ☉. surinamische w. H.
2. angustifolia Fisch. 4. schmalblättrige Fr.
arborea vid. *Boehmeria*.
3. baccifera L. ♀. beerentragende w. H.
4. balearica L. ☉. balearische Fr.
5. canadensis L. 4. canadische Fr.
6. cannabina L. 4. hanfblättrige Fr.
7. caracassana Jacq. ♀. caracassanische w. H.
8. crassifolia W. En. ♀. dickblättrige w. H.
9. dioica L. 4. gemeine Fr.
10. Dodartii L. ☉. Dodartische Fr.
11. membranacea Poir. 4. häutige Fr.
U. caudata Fahl.
12. nivea L. 4. schneeweiße C. H. et Fr.

Urtica.

Nessel.

13. pilulifera L. ☉. kugelblüthige Fr.
14. scabrella Roxb. ☿. rauhblättrige w. H.
15. urens L. ☉. Brennessel Fr.

Uvularia.

Zäpfchenkraut.

1. amplexifolia L. 24. stengelumfassendes Fr.
Streptopus amplexifolius Dec.
2. chinensis Ait. 24. chinesisches w. H.
3. grandiflora L. 24. großblumiges Fr.

V.

Vaccinium.

Heidelbeere.

1. amoenum Pursch. ☿. breitblättrige Fr.
V. disomorphum var. Mich.
2. Arctostaphylos L. ☿. orientalische Fr.
3. diffusum Ait. ☿. ausgebreitete Fr.
V. arboreum Mich.
4. dumosum Andr. ☿. markige Fr.
V. hirtellum Ait.
5. ligustrinum W. ☿. rainweidenblättrige Fr.
macrocarpum vid. Oxycoccus.
6. meridionalis Ait. ☿. westindische C. H.
7. Myrtillus L. ☿. gemeine Heidelbeere Fr.
8. myrtilloides Mich. ☿. waldbeerartige Fr.
V. angustifolium Ait.
9. nitidum Pursch. ☿. glänzende C. H.
Oxycoccus vid. Oxycoccus.
10. pensylvanicum Mich. ☿. pensylvanische Fr.
V. tenellum Ait.
11. resinosum Ait. ☿. harzige Fr.
V. parviflorum Andr.
12. stamineum W. ☿. langfädige Fr.
Arbutus myrtilloides Humb.
13. uliginosum L. ☿. Rausch-Heidelbeere Fr.
14. virgatum Ait. ☿. ruthenförmige Fr.
15. Vitis idaea L. ☿. Preuselbeere Fr.
V. punctatum Lam.

Valantia.

Valantie.

1. Aparine W. En. ☉. klebkrautartige Fr.
2. cruciata W. En. 4. gemeine Fr.

Valeriana.

Baldrian.

Calcitrapa vid. Centranthus.

1. dioica L. 4. kleiner Fr.
2. montana L. 4. Berg Fr.
- V. alpina* Adans.
3. officinalis L. 4. gemeiner Fr.
4. — b. angustifolia 4. mit schmalen Blättern Fr.
5. Phu L. 4. grosser Fr.
6. pyrenaica L. 4. pyrenäischer Fr.
- ruber vid. Centranthus.
7. sambucifolia Mikan. 4. hollunderblättriger Fr.
- sibirica vid. Patrinia.
8. tripteris L. 4. dreyblättriger Fr.

Valerianella vid. Fedia.

Vallisneria.

Vallisnerie.

1. spiralis L. 4. Mas. et Foem. spiralförmige w. H.

Vangueria.

Vanguerie.

1. edulis Vahl. 5. essbare w. H.

Vanilla.

Vanille.

1. aromatica W. 5. gewürzhafte w. H.
- Epidendron Vanilla* L.

Varronia.

Varronie.

1. alba Jacq. 5. weisse w. H.
2. bullata L. 5. aufgeblasene w. H.
3. curassavica Jacq. 5. curassavische w. H.

Vella.

Velle.

1. annua L. ☉. jährige Fr.
2. Pseudo-Cytisus L. 5. strauchartige C. H.

Veltheimia.

Veltheimie.

1. glauca Jacq. 4. graugrüne C. H.

Veltheimia. Veltheimie.

2. sarmentosa Andr. 24. wuchernde C. H.
Tritoma media Curt.
3. Uvaria W. 24. traubenblüthige C. H.
Aletris Uvaria L.
Tritoma Uvaria Curt.
4. viridifolia Jacq. 24. grünblättrige C. H.
Veltheimia capensis Desf.
Aletris capensis L.

Veratrum. Nießwurz.

1. album L. 24. weisse Fr.
2. Lobelianum Bernh. 24. Lobelianische Fr.
3. nigrum L. 24. schwarze Fr.

Verbascum. Königskerze.

1. austriacum Schott. ♂. österreichische Fr.
2. Blattaria L. ♂. veränderliche Fr.
3. condensatum Schrad. ♂. dichte Fr.
4. floccosum W. et K. ♂. flockige Fr.
5. Lychnitis L. ♂. lychnisartige Fr.
Myconi vid. *Ramondia*.
6. mixtum Dec. ♂. vermischte Fr.
7. montanum Schrad. ♂. Berg Fr.
8. nemorosum Schrad. ♂. Wald-Königskerze Fr.
9. nigrum L. 24. schwarze Fr.
10. orientale M. B. ♂. orientalische Fr.
11. phlomoides L. ♂. phlomisartige Fr.
12. phoeniceum L. ♂. violette Fr.
13. pulverulentum Vill. ♂. bestäubte Fr.
14. pyramidatum M. B. ♂. pyramidenförmige Fr.
15. sinuatum L. ♂. buchtigblättrige Fr.
16. speciosum Schrad. ♂. prächtige Fr.
17. Thapsus L. ♂. gemeine Fr.
18. undulatum Lam. ♂. wellenblättrige Fr.

Verbena. Eisenkraut.

1. Aubletia L. ♂. schönblühendes C. H.
V. grandiflora Mich.
2. bonariensis L. ♂. südamerikanisches C. H.
3. bracteata Cav. 24. blättriges C. H.
4. canescens H. et B. 24. graues Fr.
5. caroliniana L. 24. carolinisches C. H.

Verbena.

Eisenkraut.

6. erinoides Lam. ☉. vielspaltiges Fr.
7. hastata L. 4. spontonblättriges Fr.
8. officinalis L. ☉. gemeines Fr.
9. rugosa W. 4. runzliges Fr.
10. scabra Vahl. 4. rauhes Fr.
11. spuria L. ♂. unächttes Fr.
12. supina L. ☉. hohes Fr.
13. triphylla Herit. ♀. dreyblättriges C. H.
Aloysia citriodora Orteg.
14. urticaefolia L. 4. nesselblättriges Fr.

Verbesina.

Verbesine.

1. alata L. 4. geflügelte w. H.
2. dichotoma Murr. ☉. gabelförmige Fr.
3. gigantea Jacq. ♀. riesenartige w. H.
V. pinnatifida Sw.
4. serrata Cav. ♀. gesägte C. H.

Verea.

Verea.

1. crenata Andr. ♀. gekerbte C. H.
Calanchoe crenata Dec.
2. laciniata W. En. ♀. schlitzblättrige C. H.
Cotyledon laciniata L.

Vernicia.

Vernicie.

1. montana Lour. ♀. Berg w. H.
Dryandra Vernicia Correa.

Vernonia.

Vernonie.

1. noveboracensis W. 4. neuyorkische Fr.
Serratula noveboracensis L.
2. praealta W. 4. hohe Fr.
Serratula praealta L.

Veronica.

Ehrenpreis.

1. agrestis L. ☉. Acker Fr.
2. alpina L. 4. Alpen Fr.
3. Anagallis L. 4. Wasser Fr.
4. aphylla L. 4. blattloser Fr.
5. australis Schrad. 4. südlicher Fr.
6. austriaca L. 4. österreichischer Fr.

Veronica.

Ehrenpreis.

7. Beccabunga L. 4. Quellen (Bachungen) Fr.
8. Chamaedrys L. 4. Wald Fr.
9. complicata Hoffm. 4. zusammengefalteter Fr.
10. Cymbalaria Bertol. ☉. cymbelblättriger Fr.
11. decussata Ait. 5. buchsblättriger C. H.
12. elatior Ehrh. 4. hoher Fr.
13. foliosa W. et K. 4. blättriger Fr.
14. fruticulosa L. 5. Stauden-Ehrenpreis Fr.
15. gentianoides L. 4. enzianartiger Fr.

V. Buxbaumiana Pall.

16. glabra Schrad. 4. glatter Fr.
17. hederacfolia L. ☉. epheublättriger Fr.
18. incana L. 4. grauer Fr.
19. laciniata Ait. 4. eingeschnittener Fr.
20. latifolia L. 4. breitblättriger Fr.
21. longifolia L. 4. langblättriger Fr.
22. maritima L. 4. Meerstrands Fr.
23. media Schrad. 4. mittlerer Fr.
24. melissacfolia Poir. 4. melissenblättriger Fr.
25. mollis W. 4. weicher Fr.
26. montana L. 4. Berg Fr.
27. multifida L. 4. vielspaltiger Fr.
28. neglecta Vahl. 4. blafsgrauer Fr.
29. nitida Link. 4. glänzender Fr.
30. officinalis L. 4. ächter Fr.
31. orientalis Ait. 4. morgenländischer Fr.
32. peregrina L. ☉. fremder Fr.

V. romana L.

33. pilosa L. 4. haariger Fr.
34. pinnata L. 4. gefiederter Fr.
35. Ponae Gouan. 4. baldischer Fr.
36. pulchella Bernh. 4. schöner Fr.
37. ruthenica Hort. Vindeb. 4. russischer Fr.
38. Schmidtii Sch. et R. 4. Schmidtischer Fr.
39. serpillifolia L. 4. quendelblättriger Fr.
40. sibirica L. 4. sibirischer Fr.
41. spicata L. 4. ährenförmiger Fr.
42. — b. incarnata 4. fleischfarbener Fr.
43. spuria L. 4. unächter Fr.
44. Teucrium L. 4. Gamander Fr.
45. urticaefolia L. 4. nesselblättriger Fr.
46. villosa Schrad. 4. filziger Fr.
47. virginica L. 4. virginischer Fr.
48. Waldsteiniana Schott. 4. Waldsteinischer Fr.

Vestia vid. Cantua.

Viburnum.

Schneeball.

1. acerifolium L. h. ahornblättriger Fr.
2. cassinoides L. h. dickblättriger C. H. et Fr.
3. dentatum L. h. gezählter Fr.
4. edule Pursch. h. genießbarer Fr.
V. opulus edule Mich.
5. Lantana L. h. wolliger Fr.
6. — b. fol. variegatis h. mit bunten Blättern Fr.
7. lantanoides Mich. h. lantanenblättriger Fr.
V. Lantana grandifolium Ait.
8. laevigatum Ait. h. glatter C. H.
9. Lentago L. h. birnblättriger Fr.
10. nudum L. h. nacktblüthiger Fr.
11. odoratissimum Wendl. h. wohlriechender C. H.
V. chinense, laurifolium et nov. sp. Hortul.
12. Opulus L. h. Wasserholder Fr.
13. — b. roseum h. gefüllter Schneeballen Fr.
V. Opulus sterilis Poir.
14. Oxycoccos Pursch. h. preusselbeerartiger Fr.
V. Opulus Pimina Mich.
15. prunifolium L. h. pflaumenblättriger Fr.
16. pubescens Pursch. h. weichhaariger Fr.
V. dentatum pubescens Ait.
V. — tomentosum Mich.
17. punicifolium Desf. h. granatapfelblättriger C. H.
18. pyrifolium Desf. h. birnblättriger Fr.
19. Tinus L. h. lorbeerartiger C. H. et Fr.
20. — b. lucidum Ait. h. mit glänzenden Blättern C. H.
21. — c. foliis variegatis h. mit bunten Blättern C. H.
22. rugosum Pers. h. runzlicher C. H.
V. strictum Hortul.

Vicia.

Wicke.

1. amphicarpa Dorth. ☉. unterirdische Fr.
2. Bacla Moench. ☉. Bacla Fr.
3. benghalensis L. ☉. bengalische Fr.
4. calcarata Desf. ☉. gespornte Fr.
V. angustifolia Moench.
5. cordata Wulf. ☉. herzblättrige Fr.
6. Cracca L. 4. Vogel Fr.
7. dumetorum L. 4. Hecken Fr.
8. Faba L. ☉. Sau-Wicke Fr.
9. globosa Retz. ☉. rundfrüchtige Fr.

Vicia.

Wicke.

10. grandiflora Scop. ☉. großblumige Fr.
11. leucosperma M. B. ☉. weifsfrüchtige Fr.
12. lutea L. ☉. gelbe Fr.
13. megalosperma M. B. ☉. grofssaamige Fr.
14. Michauxii Spr. ☉. Michauxische Fr.
15. monantha Desf. ☉. einblumige Fr.
16. narbonensis L. ☉. französische Fr.
17. nissoliana L. ☉. orientalische Fr.
18. onobrychioides L. ☉. hahnenkopffartige Fr.
19. oroboides Wulf. ☉. breitblättrige Fr.
20. pilosa M. B. ☉. haarige Fr.
21. pisiformis L. 4. erbsenartige Fr.
22. platycarpus Roth. ☉. hökrlige Fr.
23. sativa L. ☉. Futter-Wicke Fr.
24. sordida W. et K. ☉. schmuzige Fr.
25. striata M. B. ☉. gestreifte Fr.
26. torulosa Desf. ☉. angeschwollenfrüchtige Fr.

Vieusseuxia.

Vieusseuxie.

1. fugax Dec. 4. vergängliche C. H.
Moraea fugax Jacq.

Villarsia.

Villarsie.

1. excelsa? H. Cels. 4. hohe C. H.
2. nymphoides Vent. 4. seeblumenartige Fr.
Menyanthes nymphoides L.
Schweykerta nymphoides Gmel. fl. bad.
3. ovata Vent. 4. eyrunde Fr.

Vinca.

Sinngrün.

1. herbacea W. et K. 4. krautartiges Fr.
2. major L. 5. grosses Fr.
3. minor L. 5. kleines Fr.
4. — b. fol. aur. et argent. variegat. mit gold- und silbergescheckten Blättern Fr.
5. — c. floribus albis, nigricantibus et plenis. mit weissen, schwärzlichen und gefüllten Blumen Fr.
6. rosea L. 5. rosenfarbenes w. H.
7. — b. flore albo 5. mit weisser Blume w. H.
8. — c. — — fauce luteo. 5. mit weisser Blume und gelbem Schlund w. H.

Viola.

Veilchen.

1. arborescens L. ♀. baumartiges C. II.
2. arenaria Dec. 4. Sand Fr.
3. bannatica W. et K. 4. banatisches Fr.
4. biflora L. 4. zweyblüthiges Fr.
5. calcarata L. 4. langgesporntes Fr.
6. canadensis L. 4. canadisches Fr.
7. canina L. 4. Hunde-Veilchen Fr.
8. chrysantha Schrad. 4. goldfarbenes Fr.
9. cornuta L. 4. gehörntes Fr.
10. cuculata Ait. 4. kappenblättriges Fr.
11. grandiflora L. 4. großblühendes Fr.
12. lactea Smith. ♂. milchweißes Fr.
V. lancifolia Thora.
13. lanceolata L. 4. lanzettblättriges Fr.
14. mirabilis L. 4. verschiedenblüthiges Fr.
15. montana L. 4. Berg Fr.
16. obliqua Ait. 4. schiefblühendes Fr.
17. odorata L. 4. wohlriechendes Fr.
plur. variet. mitmehrer. einfach. und gef. Abart. Fr.
18. palmata L. 4. handförmiges Fr.
19. palustris L. 4. Sumpf Fr.
20. pedata L. 4. fußförmiges Fr.
21. rothomagensis Pers. 4. normandisches Fr.
22. Ruppil All. 4. Ruppisches Fr.
23. sagittata Ait. 4. pfeilblättriges Fr.
24. tricolor L. ☉. dreyfarbiges Fr.
25. uliginosa Schrad. 4. feuchtigkeitliebendes Fr.
26. verticillata Orteg. 4. wirtelblättriges Fr.
Jonidium polygalaeifolium Vent.

Virgilia.

Virgilie.

1. aurea Ait. ♀. goldfarbige w. II.
Podalyria aurea W. En.
2. capensis Lam. ♀. capische C. H.
Podalyria capensis W.
Sophora capensis L.
3. intrusa R. Br. ♀. intrusische C. II.
4. lutea Mich. ♀. gelbe Fr.
5. secundiflora Cav. ♀. Seitenblüthige C. II.
Sophora secundiflora Poir.

Visnea.

Visnea.

1. Mocanera L. ♀. canarische C. II.

Vitex. Keuschbaum.

1. agnus-castus L. ꝑ. gemeiner C. H.
2. incisa Lam. ꝑ. schlitzblättriger C. H.
3. Negundo L. ꝑ. Eschenblättriger C. H.
V. paniculata Lam.
4. trifolia L. ꝑ. dreyblättriger C. H.
V. integerrima Mill.

Vitis. Wein.

1. alexandrina Fisch. ꝑ. alexandrischer C. H. et Fr.
2. arborea W. ꝑ. kleinblättriger C. H.
Ampelopsis bipinnata Mich.
3. hederacea W. ꝑ. wilder (Jungfernreben) C. H.
Hedera quinquefolia L.
Cissus hederacea Pers.
4. indivisa W. ꝑ. herzblättriger Fr.
Ampelopsis cordata Mich.
Cissus Ampelopsis Pers.
5. labrusca L. ꝑ. filziger Fr.
6. laciniosa L. ꝑ. petersilienblättriger Fr.
7. vinifera L. ꝑ. gemeiner Weinstock Fr.
Mit 84 Abarten.
8. vulpina L. ꝑ. Fuchs-Weinstock Fr.

Volkameria. Volkamerie.

1. aculeata L. ꝑ. stachlige w. H.
2. inermis L. ꝑ. unbewaffnete w. H.
japonica vid. Clerodendron.
3. ligustrina Jacq. ꝑ. ligusterartige w. H.
4. — b. angustifolia ꝑ. mit schmalen Blättern w. H.

W.

Wachendorfia. Wachendorfie.

1. hirsuta Thunb. ꝑ. haarige C. H.
2. thyrsiflora L. ꝑ. straufsblüthige C. H.

Wahlenbergia vid. Campanula.

Waldsteinia. Waldsteinie.

1. geoides W. ꝑ. geumartige Fr.

Waltheria. Waltherie.

1. americana L. †. amerikanische w. H.

Webera. Webere.

1. corymbosa W. †. doldenblüthige w. H.

Wedelia. Wedelic.

1. ovatifolia W. ☉. eyrundblättrige Fr.

2. perfoliata W. ☉. verwachsene Fr.

Alcina perfoliata Cav.

Wensea. Wense.

1. pyramidata Wendl. †. pyramidenförmige w. H.

Westringia. Westringie.

1. rosmarinifolia Smith. †. rosmarinblättrige C. H.

Woodwardia. Woodwardie.

1. radicans Sw. ‡. wurzelnde C. H.

Blechnum radicans L.

Wulfenia. Wulfenie.

1. carinthiaca Jacq. ‡. kärnthensche Fr.

X.

Xanthium. Spitzklette.

1. orientale L. ☉. morgenländische Fr.

X. macrocarpum Dec.

2. spinosum L. ☉. dornige Fr.

3. Strumarium L. ☉. gemeine Fr.

Xanthochymus. Xanthochymus.

1. pictorius Ait. †. gemahlter w. H.

Xeranthemum. Spreublume.

1. annuum L. ☉. gemeine Fr.

2. inapertum W. ☉. geschlossene Fr.

X. foetidum Moench.

variegatum vid. Elichrysum.

Xenopoma. Fremdlingstrank.

1. obovatum W. ♀. gewürzhafter C. H.

Xerotes. Xerotes.

1. longifolia R. Br. 4. langblättrige C. H.
Lomandra longifolia Labill.
2. rigida R. Br. 4. steife C. H.

Ximenesia. Ximenesie.

1. encelioides Cav. ☉. geöhrte Fr.

Xiphidium. Scheidenlilie.

1. album W. 4. weisse w. H.

Xylophylla vid. Phyllanthus.

Y.

Yucca. Yukke.

1. aloifolia L. ♀. aloebblättrige C. H.
Boscii vid. Littaea.
2. angustifolia Haw. ♀. schmalblättrige C. H.
3. Draconis L. ♀. drachenbaumartige w. H.
4. filamentosa L. ♀. fädige C. H. et Fr.
5. gloriosa L. ♀. prächtige C. H. et Fr.
6. recurva Haw. ♀. zurückgebogene C. H.

Z

Zamia. Keulpalme.

1. integrifolia Ait. ♀. ganzblättrige w. H.
Z. pumila L.
2. media Jacq. ♀. mittlere w. H.
3. spiralis W. ♀. spiralschaftige w. H.

Zanthorrhiza. Gelbwurz.

1. apiifolia L. ♀. sellerieblättrige Fr.

Zanthoxylum. **Zahnwechholz.**

1. fraxineum W. ♂. eschenblättriges Fr.
Z. Clava Herculis Duroi.
Z. ramiflorum Mich.

Zacintha. **Zacinthe.**

1. verrucosa W. ☉. warzige Fr.

Zapania. **Zapanie.**

1. nodiflora Pers. 4. kopfblüthige w. H.
Verbena nodiflora L.

Zea. **Mays. (Welschkorn)**

1. Mays L. ☉. gemeiner Fr.
2. — b. minor ☉. kleinfrüchtiger Fr.

Zieria. **Zierie.**

1. Smithii Andr. ♂. dreyblättrige C. H.
Z. trifoliata Bonpl.

Zinnia. **Zinnie.**

1. elegans Jacq. ☉. schöne Fr.
Z. violacea Cav.
2. grandiflora . . . ☉. großblumige Fr.
3. multiflora L. ☉. vielblühende Fr.
4. pauciflora L. ☉. wenigblühende Fr.
5. tenuiflora Jacq. ☉. schmalblüthige Fr.
Z. revoluta Cav.
6. verticillata L. ☉. wirtelblättrige Fr.
Z. hybrida Desf.

Ziziphora. **Zizikraut.**

1. capitata L. ☉. kopfförmiges Fr.
2. dasyantha M. B. ♂. wollblüthiges Fr.
3. hispanica L. ☉. spanisches Fr.
5. taurica M. B. ☉. taurisches Fr.
Thymbra spicata Pall.
6. tenuior L. ☉. lanzettblättriges Fr.

Zizyphus. **Judendorn.**

1. jujuba W. ♂. Jujuba w. H.
Rhamnus jujuba L.

Zizyphus.

Judendorn.

2. Paliurus W. ḥ. geflügelter C. H. et Fr.
Rhamnus Paliurus L.
3. sinensis W. ḥ. chinesischer C. H.
Rhamnus sinensis Pers.
4. spina Christi W. ḥ. Christkronen C. H.
Rhamnus spina Christi L.
5. volubilis W. ḥ. windender C. H. et Fr.
Rhamnus volubilis L.

Zygophyllum.

Doppelblatt.

1. Fabago L. 4. gemeines Fr.
 2. foetidum W. ḥ. stinkendes C. H.
 3. Morgsana L. ḥ. kurzgestieltes C. H.
 4. sessilifolium L. ḥ. ungestieltes C. H.
-

1894-1895

at 10:00 AM
at 11:00 AM
at 12:00 PM
at 1:00 PM
at 2:00 PM
at 3:00 PM
at 4:00 PM
at 5:00 PM
at 6:00 PM
at 7:00 PM
at 8:00 PM
at 9:00 PM
at 10:00 PM
at 11:00 PM
at 12:00 AM

1896-1897

at 10:00 AM
at 11:00 AM
at 12:00 PM
at 1:00 PM
at 2:00 PM
at 3:00 PM
at 4:00 PM
at 5:00 PM
at 6:00 PM
at 7:00 PM
at 8:00 PM
at 9:00 PM
at 10:00 PM
at 11:00 PM
at 12:00 AM

at 10:00 AM
at 11:00 AM
at 12:00 PM
at 1:00 PM
at 2:00 PM
at 3:00 PM
at 4:00 PM
at 5:00 PM
at 6:00 PM
at 7:00 PM
at 8:00 PM
at 9:00 PM
at 10:00 PM
at 11:00 PM
at 12:00 AM

at 10:00 AM
at 11:00 AM
at 12:00 PM
at 1:00 PM
at 2:00 PM
at 3:00 PM
at 4:00 PM
at 5:00 PM
at 6:00 PM
at 7:00 PM
at 8:00 PM
at 9:00 PM
at 10:00 PM
at 11:00 PM
at 12:00 AM

at 10:00 AM
at 11:00 AM
at 12:00 PM
at 1:00 PM
at 2:00 PM
at 3:00 PM
at 4:00 PM
at 5:00 PM
at 6:00 PM
at 7:00 PM
at 8:00 PM
at 9:00 PM
at 10:00 PM
at 11:00 PM
at 12:00 AM

N a c h t r a g.

Acacia.

Acacie.

1. dealbata Link. ♀. weifsblättrige. C. H.
2. discolor W. En. ♀. verschiedenfarbige. C. H.
Mimosa discolor Andr.
3. genistifolia Link. ♀. ginsterblättrige. C. H.
4. pubescens Ait. ♀. haarige. C. H.
Mimosa pubescens Vent.

Acrostichum.

Staubfarn.

1. fimbriatum Cav. 2. gesäumter. w. H.

Adiantum.

Krullfarn.

1. tenerum Sw. 2. zärtlicher. w. H.

Agathosma.

Agathosme.

1. foetens Otto. ♀. stinkende. C. H.

Agave.

Agave.

1. karatto Haw. 2. wilde. w. H.
2. spicata Dec. 2. ährenförmige. w. H.

Amaryllis.

Amaryllis.

1. blanda Gawl. 2. angenehme. w. H.
2. ornata Ait. 2. zierliche. w. H.

Crinum Zeylanicum L.

Ammyrsine.

Sandmyrte.

1. buxifolia Pursch. ♀. buxblättrige. Fr.
Ledum buxifolium Berg.
L. thymifolium Encycl. meth.

Andromeda.

Andromede.

1. mariana W. En. ♀. maryländische. Fr.

Araucaria.

Andentanne.

1. excelsa Ait. ♀. hohe. C. H.

Dombeya excelsa Lamb.

- Arbutus.** Sandbeere.
 1. alpina L. ♀. Alpen. Fr.
- Areca.** Areca-Palme.
 1. oleracea L. ♀. Kohlpalme. w. H.
- Aristolochia.** Osterluzey.
 1. grandiflora Sw. ♀. großblumige. w. H.
- Arum.** Aron. (Zehrwurz)
 1. bulbiferum Bot. Mag. 24. knollentrager. w. H.
 2. haematostichum 24. blutgestreifter. w. H.
 3. polyphyllum Link. 24. vielblättriger. w. H.
- Aspidium.** Wurmfarren.
 1. Serra W. Sp. pl. 24. sägenförmiger. w. H.
- Astragalus.** Traganth.
 1. montanus L. 24. Berg. Fr.
- Avena.** Hafer.
 1. nuda W. En. ☉. nackter. Fr.
- Azalea.** Azalea.
 1. pontica b. florib. alb. ♀. pontische mit weis. Blum. Fr.
 2. procumbens L. ♀. liegende. Fr.
Chamaeledon procumbens Link.
Loiseleuria procumbens Desf.
- Banisteria.** Banisterie.
 1. fulgens L. ♀. schimmernde. w. H.
 2. speciosa H. Cels. ♀. prächtige. w. H.
- Banksia.** Banksie.
 1. cuneifolia ? . . . ♀. keilblättrige. C. H.
 2. reticulata ? . . . ♀. netzförmige. C. H.
 3. rubra Donn. ♀. rothe. C. H.
 4. verticillata R. Br. ♀. wirtelblättrige. C. H.
- Berberis.** Berberitze.
 1. Aquifolium Pursch. ♀. hülsenblättrige. Fr.
- Brassia.** Brassie.
 1. maculata Ait. 24. gefleckte. w. H.
- Bursera.** Bursere.
 1. gummifera L. ♀. gumigebende. w. H.
- Caesalpinia.** Caesalpinie.
 1. pulcherrima Sw. ♀. schönste. w. H.
Poinciana pulcherrima L.
- Campanula.** Glockenblume.
 1. lanuginosa W. En. ♂. haarstielige. Fr.
- Cassia.** Cassie.
 1. ligustrina L. ♀. rainweidenartige. C. H.

- Castanea.** Maronenbaum.
 1. vesca b. americana Pers. h. amerikanischer. Fr.
- Ceanothus.** Säkelbaum.
 1. globulosus Labil. h. kopfförmiger. C. H.
- Cineraria.** Aschenpflanze.
 1. linifolia L. h. linienblättrige. C. H.
- Cliffortia.** Cliffortie.
 1. ruscifolia L. h. mausedornblättrige. C. H.
- Cocos.** Cocospalme.
 1. butyracea L. h. butterbringende. w. H.
- Combretum.** Langfaden.
 1. purpureum Vahl. h. purpurrother. w. H.
C. coccineum Lam.
- Convallaria.** Mayblume.
 1. verticillata L. 4. wirtelblättrige. Fr.
Polygonatum verticillatum Desf.
- Convolvulus.** Winde.
 1. brasiliensis Mill. 4. brasilische. w. H.
- Cunonia.** Cunonie.
 1. capensis L. h. capische. C. H.
- Cupressus.** Cypresse.
 1. sinensis Nois. h. chinesische. C. H.
- Curculigo.** Rüssellilie.
 1. sumatrensis H. Cels. 4. sumatraische. w. H.
- Cypripedium.** Frauenschuh.
 1. spectabile Sw. 4. prächtiger. Fr.
C. canadense Mich.
- Dimocarpus.** Zwillingspflaume.
 1. Litchi Lour h. essbare. w. H.
Euphoria punicea Lam.
Sapindus edulis Ait.
- Dischidia.** Dischidie.
 1. bengalensis R. Br. h. bengalische. w. H.
- Dracaena.** Drachenbaum.
 1. emarginata H. Cels. h. rothgerandete. w. H.
- Elephantopus.** Elefantenfuss.
 1. carolinianus W. En. 4. carolinischer. w. H.
- Eucalyptus.** Schönmütze.
 1. cordata. Loddig. h. herzblättrige C. H.
 2. diversifolia Bonpl. h. verschiedenblättrige. C. H.

- Eustrephus.** Eustrephus.
 1. angustifolius R. Br. ♀. schmalblättrige. C. H.
Luzuriaga angustifolia Poir.
- Evonymus.** Spindelbaum.
 1. angustifolius Pursch. ♀. schmalblättriger. Fr.
- Genipa.** Genipe.
 1. americana L. ♀. americanische w. H.
Gardenia Genipa Sw.
- Globularia.** Kugelblume.
 1. bisnagarica L. 4. bisnagarische C. H.
G. linifolia Lam.
- Gloxinia.** Gloxinie.
 1. Schottii Mikan. 4. schottische. w. H.
- Gmelina.** Gmeline.
 1. parviflora Roxb. ♀. kleinblumige. w. H.
- Gnaphalium.** Ruhrkraut.
 1. flaccidum Weinm. ♀. schlaffblüthiges. C. H.
- Gompholobium.** Gompholobium.
 1. Celsianum H. Cels. ♀. Celsisches. C. H.
- Goodenia.** Goodenie.
 1. bellidifolia Smith. ♀. masliebenblättrige. C. H.
- Goodia.** Goodie.
 1. retusa H. Cels. ♀. eingedrückte. C. H.
- Haemanthus.** Blutblume.
 1. tigrinus Jacq. 4. getiegerte. w. H.
- Hakea.** Hakea.
 1. cinerea R. Br. ♀. grape. C. H.
- Helicteres.** Schraubenbaum.
 1. hirsuta. Lour. ♀. rauher. w. H.
- Helleborus.** Christwurz.
 1. Corsicus W. En. Supl. 4. Corsische. Fr.
- Hemerocallis.** Tagblume.
 1. liliastrum W. En. lilienartige. Fr.
Anthericum liliastrum L.
- Hemionitis.** Netzfarn.
 1. rufa Sw. 4. brauner. w. H.
Acrostichum rufum L.
Pteris rufa L.
- Kaulfussia.** Kaulfussie.
 1. amelloides Nees. ☉. amellenartige. Fr.
- Laurophyllus.** Lorbeerling.
 1. capensis Thunb. ♀. capischer. C. H.

- Laurus.** Lorbeer.
 1. Diospyroides. Mich. h. Persimonenartiger. C. H.
L. Diospyrus. Pers.
L. melissaefolia Walt.
 2. Persea L. h. Advagto. w. H.
- Ledum thymifolium** vid. Ammyrsine.
- Liparia.** Liparie.
 1. sericea L. h. seidenartige. C. H.
- Lonicera.** Lonicere.
 1. flexuosa Thunb. h. gekniete. Fr.
- Maclora.** Maclora.
 1. aurantiaca H. Cels. h. oranggelbe. Fr.
- Magnolia.** Bieberbaum.
 1. maxima H. Cels. h. größter.
- Melastoma.** Schwarzschlund.
 1. coerulea H. Cels. h. blauer. w. H.
- Mesembryanthemum.** Zaserblume.
 1. aloides. Haw. h. aloeartige. C. H.
 2. bidentatum. Haw. h. doppeltgezahnte. C. H.
 3. blandum Haw. h. angenehme. C. H.
 4. crassuloides H. Dyck. h. dickblättrige. C. H.
 5. formosum. Haw. h. schöne. C. H.
 6. incomtum Haw. h. ungeschmückte. C. H.
 7. magnipunctatum Haw. h. grofspunctirte. C. H.
 8. obtusum. Haw. h. stumpfblättrige. C. H.
 9. variabile Haw. h. veränderliche. C. H.
- Mespilus.** Mispel.
 1. spathulata H. Cels. h. spatelblättrige. Fr.
- Nicotiana.** Tabak.
 1. vincaeflora Lagasc. ☉. sinngrünblüthige. Fr.
- Noesia.** Noesie.
 1. saligna H. Cels. h. weidenblättrige. C. H.
- Ornithogalum.** Vogelmilch.
 1. arabicum L. 4. arabische. C. H.
- Othonna.** Othonne.
 1. Tagetes L. ☉. sammetblumenartige. Fr.
- Paeonia.** Gichterrose.
 1. edulis Salisb. 4. efsbare. Fr.
 2. Moutan c. papaveracea Andr. h. mohnartige C. H. et Fr.
- Pelargonium.** Kranischschnabel.
 alneum, candidum, concavum,
 deltoideum, macranthum, pulchrum,
 Tankervilliae, triumphans, und
 mehrere andere Abarten. C. H.

- Philadelphus.** Pfeifenstrauch.
 1. coronarius d. pubescens h. haariger. Fr.
- Pinus.** Fichte.
 1. longifolia Lambert. h. längblättrige. C. H.
- Piper.** Pfeffer.
 1. colubrinum Link. h. schlangen. w. H.
- Pittosporum.** Klebsaame.
 1. arbutifolium H. Berol. h. sandbeerblättriger. C. H.
- Planera.** Planere.
 1. aquatica Gmelin. h. Wasser. Fr.
P. Gmelini Mich.
Anonymus aquaticus Walt.
- Plumeria.** Plumerie.
 1. longifolia Lam. h. langblättrige. w. H.
- Podaliria.** Podalirie.
 1. genistoides W. h. ginsterblättrige. C. H.
Sophora genistoides L.
Cyclopia genistoides R. Br.
- Pomaderris.** Pomaderris.
 1. elliptica Labill. h. elliptische. C. H.
- Psoralea.** Psoralea.
 1. aculeata L. h. stachliche. C. H.
- Pteris.** Saumfarn.
 1. caudata W. 4. geschwänzter. w. H.
 2. grandifolia W. 4. großblättriger. w. H.
Pt. vittata Schk.
- Quercus.** Eiche.
 1. Robur d. laciniata Lam. h. mit zerschlitzten Blät. Fr.
 2. sericea W. h. seidenartige. C. H.
Q. Phellos pumila Mich.
Q. pumila Walt.
- Rhexia.** Rhexie.
 1. virginica L. 4. virginische. C. H.
- Robinia.** Robinie.
 1. mollis M. B. h. weichblättrige. Fr.
- Senecio.** Kreuzkraut.
 1. lilacinus Schrad. h. lilafarbiges. C. H.
 2. Pseudo-China L. 4. dickwurzliches. C. H.
- Spondias.** Mombinpflaume.
 1. dulcis Forst. h. süsse. w. H.
Sp. cytherea Lam.
 2. Mombin L. h. flachstielige. w. H.
Sp. Myrobalanus Jacq.

Styphelia.

Styphelic.

1. tubiflora Smith. h. röhrenförmige. C. H.

Theophrasta.

Theophraste.

1. americana L. h. americanische. w. H.

Trichodium.

Grannengras.

1. alpinum W. En. 4. Alpen. Fr.

Agrostis alpina W. Sp. pl.

2. caninum W. En. 4. hundsgrasartiges. Fr.

3. decumbens W. En. 4. niedergestrecktes. Fr.

Agrostis anomala W. Sp. pl.

Cornucopiae perennans Walt.

Veltheimia.

Veltheimie.

1. pumila W. En. h. niedrige. w. H.

Aletris pumila Bot. Mag.

Tritomanthe pumila Link.

Veronica.

Ehrenpreis.

1. perfoliata R. Br. h. durchwachsener. C. H.

Viminaria.

Flechtruthe.

1. denudata Smith. h. glatte. C. H.

Sophora juncea Schrad.

Pultenaea juncea W.

Daviesia juncea Pers.

Vittaria.


Vittarie.

1. pyriformis H. Cels. h. birnförmige. w. H.

Schreib- und Druckfehler.


- Pag. XXV. in der Note 6te Zeile lies Mehrere statt Viele.
 Pag. XXXIV. in der letzten Linie lies Kalmien statt halmien.
 Pag. Nro.
- 8. 1. lies bey Adenandra Syn Diosma speciosa Sims. statt umbellata.
 - 23. 7. — $\frac{1}{2}$ statt $\frac{1}{4}$.
 - 23. 18. — bestaeubte Fr.
 - 28. 9. — W. En. statt Desl.
 - 29. 5. — bey Aralia $\frac{1}{2}$. statt $\frac{1}{4}$.
 - 41. 8. — bey Avena geringer statt nakender.
 - 48. 17. — Stans statt salns.
 - 54. 1. — aloides statt alaides.
 - 54. — — Bulbocodium statt Bulbocadium.
 - 65. 2. 4. 5. 25. lies Segge statt segge.
 - 75. 2. — Link statt
 - 79. 2. — bey Claytonia $\frac{1}{4}$. statt $\frac{1}{2}$.
 - 81. 3. lies bey C. ambiguus Desl.
 - 81. 4. — — Cnicus W. statt L.
 - 90. 11. — — rubra L. ☉. rothe Fr. statt vid. Tolpis.
 - 93. — — Cunninghamia sinensis deleatur.
 - 109. — — Hakea statt Hackea.
 - 126. 1. — Dahlia statt Dahlea.
 - 137. — — Helminthia statt Helmintha.
 - 138. — — bey Helonias borealis Tosfieldia statt Anthericum.
 - 141. 12. — bey Syn. pumilum Jacq. statt humile Host.
 - 156. 2 et 3. — bey Kyliingia C. H. statt Fr.
 - 172. 2. — — Malpighia, linearis Jacq. statt illicifolia.
 - 190. 14. — Zuzygium statt Zyzygeum et Calyptranthes statt Calyptranthus.
 - 202. 2. — integrifolium statt integrifolia.
 - 208. — — Persoonia statt Personia.
 - 214. 10. — Belis statt Pelis.
 - 218. 1. — bey Podaliria $\frac{1}{4}$. statt $\frac{1}{2}$.
 - 219. 6. — myrtillifolia statt myrtifolia und heidelbeerblättrige statt myrtenblättrige.
 - 220. 1. — bey Polygala Fr. statt C. H.
 - 236. 10. — unbehaarter statt unbekahrter.
 - 236. 15. — krauser statt grauser.
 - 256. 1. — bey Scolopendrium officinarum Syn Asplenium Scolopendrium L.
 - 259. 11. — bey sempervivum Smidtii statt Schmidtii.
 - 299. 3. — — Vitis Fr. statt C. H.
-

SITUATIONS - PLAN
des Großherzogl. botanischen Gartens zu Karlsruhe
nebst dem Grundriß, Aufriss u. Durchschnitt sämtlicher Gewächshäuser.



Erklärung der Buchstaben.

[illegible]







Tamus Elephantipes.

Die hiesige Pflanze hat 3 Fuss in der Peripherie.